

1 / 45

异方差性产生的原因


- 某一因素或某些因素随着自变量观察值得变化而对因变量产生不同的影响。

例 (4.1)

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- y_i : 消费、 x_i : 收入
- 由于各户的收入、消费观念和习惯不同
- 低收入家庭购买的差异比较小, 大多数购买生活必需品
- 高收入家庭的购买行为差异比较大: 房子、汽车和股票等

低收入的家庭购买差异性比较小, 高收入的家庭购买行为差异就很大。导致消费模型的随机项 ε_i 具有不同的方差。



R

```

1 > rm(list=ls())
2 > library(quantreg)
3 > data(engel)
4 > head(engel)
5   income  foodexp
6 1 420.1577 255.8394
7 2 541.4117 310.9587
8 > attach(engel)
9 > plot(income, foodexp, xlab="Household Income",
10        ylab="Food Expenditure", cex=.5)

```

模拟R代码

```
1 > rm(list=ls())
2 > library(MASS)
3 > p <- 3; n <- 50
4 > mu <- rep(0, p)
5 > sigmu <- diag(rep(1, p))
6 > x <- MASS::mvrnorm(n=n, mu=mu, Sigma = sigmu)
7 > sigma <- rep(1:10, length=n)
8 > e <- rnorm(n=n, mean=0, sd=sigma)
9 > beta0 <- c(1.5, 2, 1.5)
10 > y <- x %*% beta0 + x[, 1]* e
11 > plot(x[, 1], y)
12 > fit <- lm(y~x-1)
13 > summary(fit)
14 Coefficients:
15      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
16 x1    -0.2041      0.8627  -0.237   0.8140
17 x2     1.8931      1.0092   1.876   0.0669 .
18 x3     1.0701      0.9453   1.132   0.2634
19 Residual standard error: 6.405 on 47 degrees of freedom
20 Multiple R-squared:  0.08127, Adjusted R-squared:  0.02262
21 F-statistic: 1.386 on 3 and 47 DF,  p-value: 0.2587
```


异方差性的检验

● 等级相关系数法

等级相关系数检验法又称斯皮尔曼(Spearman) 检验, 是一种应用较广泛的方法。这种检验方法既可用于大样本, 也可用于小样本。进行等级相关系数检验通常有三个步骤。

第(1)步 作 y 关于 x 的普通最小二乘回归, 求出 ϵ_i 的估计值, 即 e_i 的值。

第(2)步 取 e_i 的绝对值, 分别把 x_i 和 $|e_i|$ 按递增(或递减)的次序分成等级, 按下式计算出等级相关系数

$$r_s = 1 - \frac{6}{n(n^2 - 1)} \sum_{i=1}^n d_i^2$$

式中 n 为样本量; d_i 为对应于 x_i 和 $|e_i|$ 的等级差数。

例4.3 R代码

```
1 > rm(list=ls())
2 > ex43 <- read.table("ex43.txt", head=TRUE, fileEncoding="utf8")
3 > attach(ex43)
4 > head(ex43)
5       y       x
6 1 5081 25669
7 2 2724 17885
8 > fit43 <- lm(y~x)
9 > summary(fit43)
10
11               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
12 (Intercept) 1.274e+02  2.744e+02   0.464    0.646
13 x           1.068e-01  8.573e-03  12.454 3.66e-13 ***
14
15 > cor.test(x=x, y =abs(fit43$residuals), method = "spearman")
16 S = 2100, p-value = 0.0008485
17 alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
18 sample estimates:
19       rho
20 0.5766129
```

模拟R代码

```
1 rm(list=ls())
2 library(MASS)
3 p <- 3; n <- 50
4 mu <- rep(0, p)
5 sigma <- diag(rep(1, p))
6 x <- MASS::mvrnorm(n=n, mu=mu, Sigma = sigma)
7 sigma <- rep(1:10, length=n)
8 e <- rnorm(n=n, mean=0, sd=sigma)
9 beta0 <- c(1.5, 2, 1.5)
10 y <- x %*% beta0 + x[, 1]* e
11 plot(x[, 1], y)
12 fit <- lm(y~x-1)
13 summary(fit)
14 plot(fit$residuals)
15 cor.test(x=x[, 1], y =abs(fit$residuals), method = "spearman")
16 cor.test(x=x[, 2], y =abs(fit$residuals), method = "spearman")
17 cor.test(x=x[, 3], y =abs(fit$residuals), method = "spearman")
```


一元加权最小二乘估计

一元线性回归普通最小二乘法的残差平方和为：

$$Q(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - E(y_i))^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

一元线性回归的加权最小二乘的离差平方和为：

$$Q(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n \omega_i (y_i - E(y_i))^2 = \sum_{i=1}^n \omega_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

加权最小二乘估计为

$$\begin{cases} \hat{\beta}_{0\omega} = \bar{y}_\omega - \hat{\beta}_{1\omega} \bar{x}_\omega \\ \hat{\beta}_{1\omega} = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i (x_i - \bar{x}_\omega)(y_i - \bar{y}_\omega)}{\sum_{i=1}^n \omega_i (x_i - \bar{x}_\omega)^2} \end{cases}$$

其中 $\bar{x}_\omega = \frac{1}{\sum \omega_i} \omega_i x_i$ 为自变量的加权平均， $\bar{y}_\omega = \frac{1}{\sum \omega_i} \omega_i y_i$ 为自变量的加权平均。

多元加权最小二乘法

当误差项 ϵ_i 存在异方差性时，对于一般的多元线性回归模型，加权离差平方和为

$$Q_{\omega} = \sum_{i=1}^n \omega_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_{i1} - \beta_2 x_{i2} - \cdots - \beta_p x_{ip})^2$$

记

$$W = \begin{pmatrix} \omega_1 & & & \vdots \\ & \omega_2 & & \\ & & \ddots & \\ \vdots & & & \omega_n \end{pmatrix}$$

加权最小二乘估计的矩阵表达式为

$$\hat{\beta}_{\omega} = (X'WX)^{-1}X'W\mathbf{y}$$

多元加权最小二乘法：权函数的确定方法

通常取权函数 \mathbf{W} 为某个自变量 $x_j, j = 1, 2, \dots, p$ 的幂函数，即 $\mathbf{W} = x_j^m$

★ 在 x_1, x_2, \dots, x_p 这 p 个自变量中取哪一个？

这只需计算每个自变量 x_j 与普通残差的等级相关系数，选取等级相关系数最大的自变量构造权函数。例4.4

自相关性产生的背景和原因

如果一个回归模型的随机误差项 $cov(\epsilon_i, \epsilon_j) \neq 0$ 则称随机误差项之间存在着自相关现象。

这里的自相关现象不是指两个或两个以上的变量之间的相关,而指的是一个变量前后期数值之间存在的相关关系。

自相关性产生的背景和原因

- (1) 遗漏关键变量时会产生序列的自相关性。
- (2) 经济变量的滞后性会给序列带来自相关性。
- (3) 采用错误的回归函数形式也可能引起自相关性。
- (4) 蛛网现象(Cobweb phenomenon) 可能带来序列的自相关性。
- (5) 因对数据加工整理而导致误差项之间产生自相关性。


自相关性带来的问题

- (1) 参数的估计值不再具有最小方差线性无偏性。
- (2) 均方误差MSE 可能严重低估误差项的方差。
- (3) 容易导致对t 值评价过高,常用的F 检验和t 检验失效。如果忽视这一点,可能导致得出回归参数统计检验为显著,但实际上并不显著的严重错误结论。
- (4) 当存在序列相关时,仍然是 β 的无偏估计量,但在任一特定的样本中,可能严重歪曲 β 的真实情况,即最小二乘估计量对抽样波动变得非常敏感
- (5) 如果不加处理地运用普通最小二乘法估计模型参数,用此模型进行预测和结构分析将会带来较大的方差甚至错误的解释。

自相关性的诊断

● 图示检验法



(1) 绘制 (e_t, e_{t-1}) 的散点图。



自相关性的诊断

- 图示检验法

(2) 按照时间顺序绘制回归残差项 e_t 的图形



自相关性的诊断

- 自相关系数法

误差序列 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 的自相关系数定义为:

$$\rho = \frac{\sum_{t=2}^n \epsilon_t \epsilon_{t-1}}{\sqrt{\sum_{t=2}^n \epsilon_t^2} \sqrt{\sum_{t=2}^n \epsilon_{t-1}^2}}$$

ρ 的取值范围是 $[-1, 1]$, 当 ρ 接近1 时, 表明序列误差存在正相关, 当 ρ 接近 -1 时, 表示序列误差存在负相关。

在实际应用中, 误差序列 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 的值是未知的, 需要用其估计值 e_i 代替, 得到自相关系数的估计值为

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sqrt{\sum_{t=2}^n e_t^2} \sqrt{\sum_{t=2}^n e_{t-1}^2}}$$

自相关性的诊断

- DW 检验

DW检验是J.Durbin 和G.S.Watson 于1951 年提出的一种适用于小样本的一种检验方法。

DW检验只能用于检验随机扰动项具有一阶自回归形式的序列相关问题。这种检验方法是建立计量经济学模型中最常用的方法,一般的计算机软件都可自动产生出D.W 值。

随机误差项的一阶自回归形式为

$$\epsilon_t = \rho\epsilon_{t-1} + \mu_t$$

为了检验序列的相关性, 构造的假设是

$$H_0 : \quad \rho = 0$$

自相关性的诊断

• DW 检验

定义DW统计量为:

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n e_t^2}$$

如果认为 $\sum_{t=2}^n e_t^2$ 与 $\sum_{t=2}^n e_{t-1}^2$ 近似相等

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n e_t^2 + \sum_{t=2}^n e_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=2}^n e_t^2} \approx 2 \left[1 - \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=2}^n e_t^2} \right]$$

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sqrt{\sum_{t=2}^n e_t^2} \sqrt{\sum_{t=2}^n e_{t-1}^2}} \approx \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=2}^n e_t^2}$$

因此

$$DW \approx 2(1 - \hat{\rho})$$

DW 检验

Figure: DW 值与 $\hat{\rho}$ 对应关系


$\hat{\rho}$	D. W	误差项的自相关性
-1	4	完全负自相关
$(-1, 0)$	$(2, 4)$	负自相关
0	2	无自相关
$(0, 1)$	$(0, 2)$	正自相关
1	0	完全正自相关

DW 检验

根据样本容量 n 和解释变量的数目 k (这里包括常数项),查DW 分布表,得临界值 d_L 和 d_U , 然后依下列准则考察计算得到的DW值,以决定模型的自相关状态:

$0 \leq D.W \leq d_L$,	误差项 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 间存在正相关;
$d_L < D.W \leq d_U$,	不能判定是否有自相关;
$d_U < D.W < 4 - d_U$,	误差项 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 间无自相关;
$4 - d_U \leq D.W < 4 - d_L$,	不能判定是否有自相关;
$4 - d_L \leq D.W \leq 4$,	误差项 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 间存在负相关。

DW 检验



DW 检验

D.W检验尽管有着广泛的应用,但也有明显的缺点和局限性。

- DW 检验有一个不能确定的区域,一旦DW 值落在这个区域,就无法判断。这时,只有增大样本容量或选取其他方法。
- DW 统计量的上、下界表要求 $n > 15$, 这是因为样本如果再小,利用残差就很难对自相关的存在性作出比较正确的诊断。
- DW 检验不适应随机项具有高阶序列相关的检验。

自相关问题的处理方法

- 迭代法

以一元线性回归模型为例，设一元线性回归模型的误差项存在一阶自相关

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \epsilon_t$$

$$\epsilon_t = \rho \epsilon_{t-1} + \mu_t$$

$$\begin{cases} E(\mu_t) = 0, & t = 1, 2, \dots, n \\ \text{cov}(\mu_t, \mu_s) = \begin{cases} \sigma^2, & t = s \\ 0, & t \neq s \end{cases} & t, s = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

根据一元线性回归模型 $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \epsilon_t$ ，有

$$y_{t-1} = \beta_0 + \beta_1 x_{t-1} + \epsilon_{t-1}$$

迭代法

变形后有

$$(y_t - \rho y_{t-1}) = (\beta_0 - \rho \beta_0) + \beta_1(x_t - \rho x_{t-1}) + (\epsilon_t - \epsilon_{t-1})$$

令：

$$y'_t = y_t - \rho y_{t-1}$$

$$x'_t = x_t - \rho x_{t-1}$$

$$\beta'_0 = \beta_0(1 - \rho)$$

$$\beta'_1 = \beta_1$$

得到有随机独立误差项，满足线性回归基本假设的

$$y'_t = \beta'_0 + \beta'_1 x'_t + \mu_t \quad (*)$$

迭代法

其中自相关系数 ρ 用公式 $\hat{\rho} \approx 1 - \frac{1}{2}DW$ 估计。

用变换因变量与变换自变量作普通最小二乘回归。如果误差项确实是一阶自相关，通过以上变换，回归模型已经消除自相关。

实际问题中，有时误差项并不是简单的一阶自相关，而是更复杂的自相关形式，(*) 式的误差项 u_t 可能仍然存在自相关，这就需要进一步对(*) 式的误差项 u_t 做DW 检验，以判断 u_t 是否存在自相关，如果检验表明误差项 u_t 不存在自相关，迭代法到此结束。如果检验表明误差项 u_t 存在自相关，那末对回归模型(*) 式重复用迭代法，这个过程可能要重复几次，直至最终消除误差项自相关。这种迭代消除自相关的过程正是迭代法名称的由来。

自相关问题的处理方法

● 差分法

一阶差分法通常适用于原模型存在较高程度的一阶自相关的情况。在迭代法中，当 ρ

$$(y_t - \rho y_{t-1}) = (\beta_0 - \rho\beta_0) + \beta_1(x_t - \rho x_{t-1}) + (\epsilon_t - \epsilon_{t-1})$$

为：

$$(y_t - \rho y_{t-1}) = \beta_1(x_t - x_{t-1}) + (\epsilon_t - \epsilon_{t-1})$$

以 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ ， $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$ ，得到

$$\Delta y_t = \beta_1 \Delta x_t + \mu_t$$

上式是不带有常数项的回归方程

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{t=2}^n \Delta y_t \Delta x_t}{\sum_{t=2}^n \Delta x_t^2}$$

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{y^\lambda - 1}{\lambda}, \lambda \neq 0 \\ \ln y, \lambda = 0 \end{cases}$$
$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{(y+a)^\lambda - 1}{\lambda}, \lambda \neq 0 \\ \ln(y+a), \lambda = 0 \end{cases}$$

35 / 45

BOX-COX 变换

寻找合适的 λ ，使得变换后

$$\mathbf{y}^{(\lambda)} = \begin{pmatrix} y_1^{(\lambda)} \\ y_2^{(\lambda)} \\ \vdots \\ y_n^{(\lambda)} \end{pmatrix} \sim N_n(\mathbf{X}\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 \mathbf{I})$$

从而符合线性回归模型的各项假设：**误差分量等方差、不相关等**。

事实上，BOX-COX 变换不仅可以处理异方差性问题，还能处理自相关、误差非正态、回归函数非线性等情况。

BOX-COX 变换

经过计算可得 λ 的最大似然估计（参见参考文献[2]）

$$L_{max}(\lambda) = (2\pi e \hat{\sigma}_{\lambda}^2)^{-\frac{n}{2}} |\mathbf{J}|$$

式中， $\hat{\sigma}_{\lambda}^2 = \frac{1}{n} SSE(\lambda, y^{(\lambda)})$ ， $|\mathbf{J}| = \prod_{i=1}^n \left| \frac{dy_i^{(\lambda)}}{dy_i} \right| = \prod_{i=1}^n y_i^{(\lambda-1)}$

令 $z^{(\lambda)} = \frac{y^{(\lambda)}}{|\mathbf{J}|}$ ，对 L_{max} 取对数并略去与 λ 无关的常数项，可得

$$\ln L_{max}(\lambda) = -\frac{n}{2} \ln SSE(\lambda, z^{(\lambda)})$$

为找出 λ ，使得 $\ln L_{max}(\lambda)$ 达到最大，只需使 $SSE(\lambda, z^{(\lambda)})$ 达到最小即可。它的解析解比较难找，通常是给出一系列 λ 的值，计算对应的 $SSE(\lambda, z^{(\lambda)})$ ，取使得 $SSE(\lambda, z^{(\lambda)})$ 达到最小的 λ 即可。

关于因变量 y 的异常值

在残差分析中，认为超过 $\pm 3\hat{\sigma}$ 的残差为异常值。标准化残差

$$ZRE_i = \frac{e_i}{\hat{\sigma}}$$

学生化残差

$$SRE_i = \frac{e_i}{\hat{\sigma}\sqrt{1-h_{ii}}}$$

h_{ii} 为 $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ 的主对角线元素。

当观测数据中存在关于 y 的异常观测值时，普通残差、标准化残差、学生化残差这三种残差都不再适用。这是由于异常值把回归线拉向自身，使异常值本身的残差减小，而其余观测值的残差增大，这时回归标准差 $\hat{\sigma}$ 也会增大，因而用传统的“ 3σ ”准则不能正确分辨出异常值。解决这个问题的方法是改用删除残差。

关于因变量 y 的异常值

删除残差的构造思想是：在计算第 i 个观测值的残差时，用删除掉的第 i 个观测值的其余 $n - 1$ 个观测值拟合回归方程，计算出第 i 个观测值的删除拟合值 $\hat{y}_{(i)}$ ，这个删除拟合值与第 i 个值无关，不受第 i 个值是否为异常值的影响，由此定义第 i 个观测值的删除残差为

$$e_{(i)} = y_i - \hat{y}_{(i)}$$

可以证明

$$e_{(i)} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}$$

进一步，可以给出第 i 个观测值的删除学生残差，记为 $ser_{(i)}$ 。

$$SRE_{(i)} = SRE_i \left(\frac{n - p - 2}{n - p - 1 - SRE_i^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$|SRE_{(i)}| > 3$ 的观测值即判定为异常值。

关于自变量 x 的异常值对回归的影响

- 虽然强影响点并不总是 y 的异常值点，不能单纯根据杠杆值 h_{ii} 的大小判断强影响点是否异常，但是我们对强影响点应该有足够的重视。
- 为此引入库克距离，用来判断强影响点是否为 y 的异常值点。库克距离的计算公式为：

$$D_i = \frac{e_i^2}{(p+1)\hat{\sigma}^2} \cdot \frac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}$$

- 库克距离反映了杠杆值 h_{ii} 与残差 e_i 的综合效应。对于库克距离，判断其大小的方法比较复杂，一个粗略的标准是：
 - 当 $D_i < 0.5$ 时，认为不是异常值点，
 - 当 $D_i > 1$ 时，认为是异常值点。

异常值产生的原因和消除方法

异常值原因	异常值消除方法
1. 数据登记误差，存在抄写或录入的错误	重新核实数据
2. 数据测量误差	重新测量数据
3. 数据随机误差	删除或重新观测异常值数据
4. 缺少重要自变量	增加必要的自变量
5. 缺少观测数据	增加观测数据，适当扩大自变量取值范围
6. 存在异方差	采用加权线性回归
7. 模型选用错误，线性模型不适用	改用非线性回归模型

作业

- p.124 4.4
- p.124 4.9
- p.124 4.14