Matrius i Vectors Tardor 2020

1.1 Es considera el conjunt dels parells de nombres reals  $(a_1, a_2)$  amb la suma habitual,

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$

i el producte per escalars

$$b(a_1, a_2) = (ba_1, 0).$$

Determineu quines de les condicions de la definició d'espai vectorial es satisfan i quines no.

**1.2** Es considera el conjunt dels parells de nombres reals  $(a_1, a_2)$  amb la suma habitual,

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2),$$

i el producte per escalars

$$b(a_1, a_2) = (|b|a_1, |b|a_2),$$

on |b| indica el valor absolut del nombre real b. Determineu quines de les condicions de la definició d'espai vectorial es satisfan i quines no.

1.3 Resoleu, si són compatibles, els sistemes d'equacions lineals següents

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 6 \\ 2x + y - 5z = -4 \\ 2x - 13y + 13z = 28 \end{cases} \begin{cases} x - 3y + 2z = 6 \\ 2x + y - 5z = -4 \\ 2x - 13y + 13z = 14 \end{cases} \begin{cases} x - 3y + 2z = 1 \\ 2x + y - 5z = 1 \\ 2x - 13y + 2z = 1. \end{cases}$$

1.4 Discutiu en funció de a la compatibilitat del sistema

$$\begin{cases} x - 2y + z = -1 \\ x + y + 3z = 4 \\ 5x - y + az = 10 \end{cases}$$

i resoleu-lo per als valors de a per als quals tingui solució.

1.5 Es considera el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

Determineu-ne la compatibilitat i els graus de llibertat en funció del paràmetre a, i resoleu-lo en els casos en que sigui compatible

1.6 Considerem el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} x + z = a \\ y + t = b \\ x + 2y + 3z + 4t = c \\ 2x + y + 4z + 3t = d \end{cases}.$$

Determineu-ne la compatibilitat i els graus de llibertat en funció dels paràmetres i resoleu-lo en el cas que sigui compatible.

Matrius i Vectors Tardor 2020

1.7 Per a cada un dels sistemes d'equacions lineals que segueixen, trobeu quines condicions han de complir els paràmetres  $a, b, c \in \mathbb{R}$  per tal que siguin compatibles i, en aquest cas, trobeu-ne la solució.

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = a \\ 5x + 3y + 3z = b \\ x + y - z = c \end{cases} \begin{cases} 3x + 2y + z = a \\ 5x + 3y + 4z = b \\ x + y - z = c \end{cases} \begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = a \\ x - 2z + 3t = a \\ -x + 4y + 12z - t = b \\ 3x - 2y - 11z + 8t = c. \end{cases}$$

1.8 Discutiu i resoleu, en els casos compatibles, els sistemes d'equacions lineals següents

$$(i) \begin{cases} ax + y + z = a \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a \end{cases}$$

$$(ii) \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x + my + z = 3 \\ 3x + y - mz = 4 \end{cases}$$

$$(iii) \begin{cases} 2x - ay = 1 \\ -x + 2y - az = 1 \\ -y + 2z = 1 \end{cases}$$

$$(iv) \begin{cases} x + 3y = 2a \\ x + y = 5 \\ 2ax + 6y = a + 3 \end{cases}$$

$$(vi) \begin{cases} x + y - z = 2 \\ ax + y + z = 1 \\ x - y + 3z = -3 \\ 4x + 2y = a. \end{cases}$$

**1.9** Determineu per a quins valors dels paràmetres  $a, b \in \mathbb{R}$  és incompatible el sistema d'equacions lineals següent:

$$\begin{cases} ax + (a-3)y + z = 2 \\ bx + (2b+5)y + 2z = 3 \end{cases}.$$

- 1.10 D'un sistema de tres equacions lineals amb tres incògnites sabem que
- (i) la matriu del sistema és no nula;
- (ii) (1,2,2) i (0,1,1) són solucions;
- (iii) (0, a, b) només és solució si a = b = 1.

Trobeu les solucions del sistema.

**1.11** Determineu un polinomi de tercer grau  $p(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + p_3 x^3$  tal que

$$p(1) = 5,$$
  $p(-1) = 3,$   $p(2) = 9,$   $p(-2) = 16.$ 

**1.12** Considerem els nombres complexos  $z_1 = 3 - i, z_2 = 2 + 5i, z_3 = 1 + 2i$ . Calculeu

$$z_1 + z_2$$
,  $z_1 z_3$ ,  $z_2^2$ ,  $z_1^{-1}$ ,  $\overline{z_2}$ ,  $z_1/z_2$ ,  $z_3/z_1$ ,  $\operatorname{Re}(z_1 + z_2)$ ,  $\operatorname{Re}(z_1 z_3)$ ,  $\operatorname{Im}(z_3/z_1)$ .

1.13 Considerem els nombres complexos  $z_1=2-3i, z_2=3+i, z_3=4-5i$ . Calculeu

$$z_1 + z_2 + z_3$$
,  $z_1 z_3 / z_2$ ,  $z_2^{-1}$ ,  $\overline{z_1 z_2}$ ,  $z_1 / z_3$ ,  $\operatorname{Re}(z_1 + z_2)$ ,  $\operatorname{Re}(z_1 z_3)$ ,  $\operatorname{Im}(z_2 z_3)$ ,  $\operatorname{Im}(z_3 / z_2)$ .