

Taller and Higher

源于生活, 高于生活.

回顾

上次我们介绍了最基本的数学语言, 并亲自上手完成了一些命题或定理的证明。通过证明的过程我们感受到了来自数学世界的秩序, 已经来到了高山的山脚下。这座高山深入云巅, 奇幻莫测, 美丽至极, 在开始正式登山之前, 我们会在本节准备一些登山工具 —— 常用的数学工具。

多少年来, 数学家们不断创造、维护甚至不断打破数学世界的秩序, 如此的反反复复这也才造就了如今如此辉煌的数学世界 —— 尽管她还不够完善, 但她一直在成长。

Lesson 2 Tools —— 常用数学工具

数学世界如此之大, 自然少不了用于构筑这些世界的数学工具, 本节我们介绍如下的一些数学工具：集合、函数、序列（数列）、归纳原理、递归定义。这些数学工具的理论基础为《集合论》，即集合论公理系统保证了这些数学工具的存在和正确性, 虽然我们目前并不直接接触集合论公理系统, 但是着并不影响我们介绍和使用这些数学工具。

其中, 函数将在初一第一次接触；集合和数列会在高一第一次接触；归纳原理和递归定义会在竞赛和大学之后的课程反复使用。不同于课本教材, 本文更注重这些数学概念本身和其作用, 而不是解题技巧。所以请不要担心, 本文会从无到有, 一点点将这些数学工具建立起来。

2.1 形式化的开端——命题逻辑和谓词逻辑

数学家们为了更加精确、统一地描述和研究问题,创造了纯粹由数学符号描述的逻辑语言也叫形式化语言。与日常生活中的自然语言不同,形式化语言是严谨的、精确的、毫不含糊的,数学家们希望使用这一门语言实现把推理变为演算的想法。

我们即将接触到的,是逻辑语言中最基础的:命题逻辑和谓词逻辑,也称命题演算和谓词演算。除此之外,逻辑语言还包括描述能力更强的高阶逻辑,与之相对地,命题逻辑也称零阶逻辑,谓词逻辑也称一阶逻辑。

一阶逻辑是数学基础中很重要的一部分,许多公理系统都将一阶逻辑系统作为自己的公理之一。但由于普遍使用的一阶逻辑公理本身较为抽象不易理解,为了方便理解,我们将以更加形象的 *自然演绎系统* 的11条演绎规则作为公理,并以此代替原有的3条模式公理和一条推理规则来介绍一阶逻辑系统。

2.1.1 命题逻辑

在上一节中,我们已经接触过了基本的命题、证明等数学概念,现在我们将进一步将命题“符号化”,证明“运算化”。即从现在起,一个变量 x 不再仅代表一个未知数或者数字的变量,她可以代表一个命题;一个计算过程不仅仅是数字间的运算,她还可以代表一个证明的推理过程。

2.1.1.1 命题的再认识

上一节中我们已经接触过命题了,命题指的是**具有真假意义的陈述句**。如:

命题2.1 如果现在是下雨天,那么现在天上有乌云。

命题2.2 现在是下雨天。

命题2.3 现在天上有乌云。

值得注意的是,上述的三个命题具有一定的关系:**命题2.2**和**命题2.3**都是**命题2.1**的一部分,这叫命题之间的复合关系。如果**命题2.1**和**命题2.2**同时为真,那么我可以得到**命题2.3**为真的结论,这叫命题间的因果关系。

直观上来理解因果关系,如果没有**命题2.1**为真的前提条件,仅仅从**命题2.2**为真出发,我们无法得到**命题2.3**为真的结论。但是如果**命题2.1**是真的,那么当命题**命题2.2**为真时就能自然而然的推导出**命题2.3**为真了。

在命题逻辑中,我们更关注“证明”本身,即“推理”,我们会将命题间的推理抽象成一种演算,从而在一定程度上忽略一个命题原本自身的意义。我们重新考虑上述命题:

命题2.1 $P \rightarrow Q$

命题2.2 P

命题2.3 Q

无论 P 和 Q 换成其他什么命题,在因果关系 $P \rightarrow Q$ 为真的情况下,只要 P 为真,那么 Q 就是真命题。在习惯上,我们会使用一个大写的英文字母来表示命题,例如:用 B 表示命题“北京是中国的首都”、

用 R 表示“雪是黑色的”等。在这里由于我们只重点关注命题间的关系（各种各样的复合和因果），而尽量忽略命题本身，于是上面三条命题中的 P, Q 可以换成任何命题，你可以将一个真命题放到 P 中，也可以将一个假命题放到 P 中，也就是说，在这里 P 和 Q 仅仅只是一个变量，就如同解方程中的 x 一般，不过每一个命题变量只能取值True或者False意味着真或者假，别无其它。

2.1.1.2 命题的运算 —— 联结词

上面我们已经简单的接触到命题之间的复合结构了，在这里我们将更加详尽的研究命题之间的因果关系。

给出公理之前，我们定义公理中将使用的一些符号。对于这些符号的含义，我们将使用**真值表**来进一步解释，真值表的左边**穷举**了所有可能出现的情况，右边是某些我们关注的式子在**对应情况**下的取值。

定义2.1(否定, 非): 设 P 是一个命题，“ P 的否定”是一个命题，记作 $\neg P$ ，这两个命题总是真假相反。 $\neg P$ 常读作“非 P ”。

P 与 $\neg P$ 的因果关系可以用如下真值表进行表述：

P	$\neg P$
False	True
True	False

表格的左边是 P 的所有可能出现情况，表格的右边是 $\neg P$ 对于 P 所有可能出现情况的因果关系。

例如：**命题2.2**中， P 表示“现在是下雨天”，那么 $\neg P$ 就表示“现在不是下雨天”。

定义2.2(析取, 或): 设 P, Q 为两个命题，“ P, Q 的析取”是一个命题，记作 $P \vee Q$ 。如果 P 和 Q 中至少有一个命题是真的，那么 $P \vee Q$ 就是真的；反过来也一样，如果 $P \vee Q$ 是真的，那么 P 和 Q 中至少有一个命题是真的。 $P \vee Q$ 常读作“ P 或 Q ”。

P, Q 与 $P \vee Q$ 的因果关系可以用如下真值表进行表述：

P	Q	$P \vee Q$
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

表格的左边两列是 P 和 Q 的所有可能出现情况的组合，表格的右边是 $P \vee Q$ 对于 P 和 Q 的所有可能出现情况的因果关系。

例如：用 P 表示“现在是下雨天”，用 Q 表示“现在是大风天”，那么 $P \vee Q$ 就表示“现在是下雨天或刮风天”，其为真命题时现在可以只下雨，可以只刮风，也可以既刮风又下雨。

定义2.3(合取, 且): 设 P, Q 为两个命题, “ P, Q 的合取”是一个命题, 记作 $P \wedge Q$ 。如果 P 和 Q 都是真的, 那么 $P \wedge Q$ 就是真的; 反过来也一样, 如果 $P \wedge Q$ 是真的, 那么 P 和 Q 都是真的。 $P \wedge Q$ 常读作“ P 且 Q ”。

P, Q 与 $P \wedge Q$ 的因果关系可以用如下真值表进行表述：

P	Q	$P \wedge Q$
False	False	False
Flase	True	False
True	False	False
True	True	True

例如：用 P 表示“现在是下雨天”，用 Q 表示“现在是大风天”，那么 $P \wedge Q$ 就表示“现在是下雨天同时也是刮风天”，其为真命题时现在既刮风又下雨。

定义2.4(蕴涵, 推出): 设 P, Q 为两个命题, “ P 蕴涵 Q ”是一个命题, 记作 $P \rightarrow Q$ 。如果 P 为真时 Q 一定为真(P 为假时对 Q 没有任何限制), $P \rightarrow Q$ 为真; 反过来, 如果 $P \rightarrow Q$ 为真, 那么 P 为真时 Q 一定为真(P 为假时对 Q 没有任何限制)。 $P \rightarrow Q$ 常读作“如果 P 则 Q ”。

P, Q 与 $P \rightarrow Q$ 的因果关系可以用如下真值表进行表述：

P	Q	$P \rightarrow Q$
False	False	True
Flase	True	True
True	False	False
True	True	True

从真值表中可以看出, $P \rightarrow Q$ 为真而 P 为假时, Q 可真可假。这里可能有些抽象，我们结合之前的例子来帮助理解。

继续考虑**命题2.1**、**命题2.2**、**命题2.3**。当**命题2.1**为真时，下雨一定有乌云(P 为真时 Q 一定为真)，不下雨时可能有乌云也可能没有乌云(P 为假时对 Q 没有任何限制)，也就是不下雨时有没有乌云并不影响我们要表述的因果关系。

定义2.5(等价, 当且仅当): 设 P, Q 为两个命题, “ P 等价于 Q ”是一个命题, 记作 $P \leftrightarrow Q$ 。如果 P 和 Q 总是真假相同, 那么 $P \leftrightarrow Q$ 为真; 反过来也一样, 如果 $P \leftrightarrow Q$ 为真, 那么 P 和 Q 总是真假相同。 $P \leftrightarrow Q$ 常读

作“ P 当且仅当 Q ”，也常直接读“ P 等价于 Q ”。

P, Q 与 $P \leftrightarrow Q$ 的因果关系可以用如下真值表进行表述：

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
False	False	True
Flase	True	False
True	False	False
True	True	True

例如：用 P 表示“现在是下雨天”，用 Q 表示“现在是大风天”，那么 $P \leftrightarrow Q$ 就表示“现在是下雨天当且仅当现在也是刮风天”，其为真命题时，要么现在既刮风又下雨，要么两者都不。

2.1.1.3 更复杂的命题 —— 复合, 命题公式

我们已经知道, 两个命题可以通过联结词构成一个新的命题, 这就意味着我们可以从一些初始命题出发, 不断使用联结词反复套娃, 以此构建更多复杂的命题。

定义2.6(命题公式)我们采用递归定义：

- True和False是命题公式。
- 命题变量是命题公式。如： P, Q 等。
- 如果 A, B 是命题公式, 那么 $(\neg A)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \wedge B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \leftrightarrow B)$ 都是命题公式。
- 任何命题公式都由上述有限次复合得到。

于是我们的系统逐渐复杂起来：

$$\begin{aligned} &(((P \vee Q) \rightarrow W) \leftrightarrow (\neg X \wedge (Q \rightarrow P))) \\ &(((A_0 \vee A_1) \vee A_2) \vee A_3) \vee A_4 \\ &(B_0 \rightarrow (B_1 \rightarrow (B_2 \rightarrow (B_3 \rightarrow B_4)))) \\ &((\text{True} \vee \text{False}) \leftrightarrow \text{True}) \end{aligned}$$

这些都是命题公式, 每一条都是由若干命题复合成的命题, 当然它们可能是真命题也可能是假命题。

在实际使用时, 为了方便的书写, 我们引入以下约定来减少括号的数量, 其目的仅仅为了书写方便, 在容易引起歧义的地方我们还是要勤用括号。

- 最外层的括号可以省略。
- 对逻辑联结词规定优先级, 就像乘法优先级比加法高那样, 我们约定逻辑联结词按优先级从高到低的顺序依次排列维为：

$$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \rightarrow \quad \leftrightarrow$$

当遇到同一种联结词, 通常情况下从左往右运算即可, 其理论基础为**结合律**, 但是注意联结词 \rightarrow 并不满足结合律, 所以连续的 \rightarrow 括号不可以轻易删除。关于结合律我们会在稍后讨论。

按照这样的书写逻辑我们可以把上面的命题公式稍微减少一些括号：

$$\begin{aligned} P \vee Q \rightarrow W &\leftrightarrow \neg X \wedge (Q \rightarrow P) \\ A_0 \vee A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee A_4 \\ B_0 \rightarrow (B_1 \rightarrow (B_2 \rightarrow (B_3 \rightarrow B_4))) \\ \text{True} \vee \text{False} &\leftrightarrow \text{True} \end{aligned}$$

再次提醒, 减少括号目的仅仅为了书写方便, 在容易引起歧义的地方我们还是要勤用括号。在不确定的时候删除括号有可能导致命题的改变, 就如同 $5 \times 3 + 2$ 不能写成 $5 \times (3 + 2)$ 一样。

2.1.1.4 自然演绎系统

2.1.1.5 常用等价公式

2.1.2 谓词逻辑

2.2 集合

2.2.1 集合的基本概念及其表示方法

2.2.2 集合的运算

2.3 函数

2.3.1 函数的基本概念

2.3.2 函数的复合

2.3.3 函数举例（奇奇怪怪的函数, 包括不限于基本初等函数, \max , \min , 各种取整）

2.4 序列

2.4.1 序列的定义

2.4.2 数列

2.6 递归定义

2.6.1 递归定义

2.6.2 举例（定义 a_0 和 递推式子）

2.5 归纳原理

2.5.1 归纳原理

2.5.2 举例

本节回顾

思考习题

习题1.1：证明命题：53是奇数。

习题1.2：证明：有理数满足乘法结合律。

习题1.3：根据欧几里得公理系统提供的公设和公理, 证明《几何原本》的第一条命题：

《几何原本》第一卷 几何基础

命题I.1： 已知一条线段, 可以作一个等边三角形。（等边三角形的三条边长度相同。）

参考资料

1. 习题参考答案

习题1.1：证明命题：53是奇数。

证明:

$$\begin{aligned}\because 53 &= 26 \times 2 + 1 \\ \therefore 53 \div 2 &= 26 \cdots \cdots 1 \neq 0\end{aligned}$$

根据定义1.2, 53是奇数。



2. 阅读材料 —— 矩阵与矩阵乘法

3. 本节内容相关资料

[1] 有关几何的部分：《几何原本》

[2] 有关矩阵的部分：《线性代数》

[3] 有关命题, 证明的论证逻辑部分：《数理逻辑》

[4] 有关数字本身的定义：《集合论》

[5] 有关运算性质的部分, 如交换律、结合律、分配律等：《代数系统》

[6] 有关整数性质的部分：《数论》

版权声明 © Copyright 2024 Boyer.