

Variables aléatoires

1^{ère} STMG


Table des matières

1	Variable aléatoire et loi de probabilité	2
1.1	Définition : Variable aléatoire	2
1.2	Définition : Loi de probabilité	3
1.3	Méthode : Déterminer une loi de probabilité	4
2	Espérance	5
2.1	Définition : Espérance mathématique	5
2.2	Méthode : Calculer l'espérance d'une loi de probabilité	5

1 Variable aléatoire et loi de probabilité

1.1 Définition : Variable aléatoire

Une variable aléatoire X associe un nombre réel à chaque issue de l'univers Ω .



Exemple

Soit l'expérience aléatoire : "On lance un dé à six faces et on regarde le résultat."

L'ensemble de toutes les issues possibles $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ s'appelle l'univers des possibles.

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est **pair**, on gagne 2€.
- Si le résultat est **1**, on gagne 3€.
- Si le résultat est **3** ou **5**, on perd 4€.

On peut définir ainsi une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ qui peut prendre les valeurs **2**, **3** ou **-4**.

- Pour les issues 2, 4 ou 6, on a : $X=2$
- Pour l'issue 1, on a : $X=3$
- Pour les issues 3 et 5, on a : $X=-4$




FIGURE 1 – Variable aléatoire X


1.2 Définition : Loi de probabilité

La loi de probabilité de X est donnée par toutes les probabilités $P(X = x_i)$.

x_i	x_1	x_2	\dots	x_N
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	\dots	p_N

Exemple

On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.



Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$.

La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur **2** est égale à $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.

On note : $P(X = 2) = \frac{1}{2}$.

De même : $P(X = 3) = \frac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Remarques :


- $P(X = x_i)$ peut se noter p_i .
- $p_1 + p_2 + \dots + p_N = 1$

Exemple

Dans l'exemple traité plus haut : $p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1$.

1.3 Méthode : Déterminer une loi de probabilité

Soit l'expérience aléatoire : "On tire une carte dans un jeu de 32 cartes."



On considère le jeu suivant :

- Si on tire un coeur, on gagne 2€.
- Si on tire un roi, on gagne 5€.
- Si on tire une autre carte, on perd 1€.

On appelle X la variable aléatoire qui, à une carte tirée, associe un gain ou une perte.

- a) Déterminer la loi de probabilité de X .
- b) Calculer $P(X \geq 5)$ et interpréter le résultat.

-
- (a) La variable aléatoire X peut prendre les valeurs **2**, **5**, **-1** mais aussi **7**. En effet, si on tire le roi de coeur, on gagne 5€ pour le roi et 2€ pour le coeur = 7€.

- Si la carte tirée est un coeur (autre que le roi de coeur), $X = 2$.

$$P(X = 2) = \frac{7}{32}$$

- Si la carte tirée est un roi (autre que le roi de coeur), $X = 5$.

$$P(X = 5) = \frac{3}{32}$$

- Si la carte tirée est le roi de coeur, $X = 7$.

$$P(X = 7) = \frac{1}{32}$$

- Si la carte tirée n'est ni un coeur, ni un roi, $X = -1$.

$$P(X = -1) = \frac{21}{32}$$

La loi de probabilité de X est :

x_i	-1	2	5	7
p_i	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

On constate que : $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = \frac{21}{32} + \frac{7}{32} + \frac{3}{32} + \frac{1}{32} = 1$

- (b) $P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 7) = \frac{3}{32} + \frac{1}{32} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$. La probabilité de gagner plus de 5€ est égale à $\frac{1}{8}$.

2 Espérance

2.1 Définition : Espérance mathématique

L'espérance mathématique de la loi de probabilité de X est :

$$E(x) = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + \dots + p_n \times x_n$$

2.2 Méthode : Calculer l'espérance d'une loi de probabilité

On considère le jeu du paragraphe précédent dont la loi de probabilité de X est la suivante.

x_i	-1	2	5	7
p_i	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

a) Calculer l'espérance de la loi de probabilité de X et interpréter le résultat.

$$(a) \quad E(X) = \left(\frac{21}{32} \times (-1)\right) + \left(\frac{7}{32} \times 2\right) + \left(\frac{3}{32} \times 5\right) + \left(\frac{1}{32} \times 7\right) = \frac{15}{32}$$

L'espérance est égale à $\frac{15}{32} \approx 0,5$ signifie qu'en jouant, on peut espérer gagner environ 0,50€.

Remarque

L'espérance est donc la **moyenne** que l'on peut *espérer* si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.