---○---○---

德学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

---○---○---

中南大学考试试卷参考答案及评分标准

2007 ~2008 学年下学期人体寄生虫学课程　时间 60 分钟

40 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、 名词解释并举例说明：（15 分）

1、 兼性寄生虫：主要在外界营自由生活（1 分），但在某种情况下可侵入宿主过寄生生活（1 分）的寄生虫，如粪类圆线虫（1 分）。

2、 转蓄宿主：幼虫进入非正常宿主，能存活但不能继续发育为成虫，长期保持幼虫状态（1 分），但对正常的终宿主有感染性并可发育为成虫（1 分），非正常宿主叫转蓄宿主。例如:野猪是卫氏并殖吸虫的转蓄宿主（1 分）。

3、 组织学隔离：

（1）寄生于组织、腔道和细胞中，特殊的生理屏障使之与宿主免疫系统隔离，如寄生于眼部、脑部的囊尾蚴；（1 分）

（2）寄生虫自身形成保护层如囊壁（棘球蚴）或包囊；（1 分）

（3）原虫在宿主细胞内生长、分裂并形成纳虫泡（0.5 分）。如：利什曼、弓形虫。（0.5 分）

4、再燃：疟疾初发停止后，在无再感染的情况下（1 分），由于体内未被完全消灭的少量残存红内期疟原虫重新大量繁殖又引起的疟疾发作的现象（1 分）。如四种疟原虫均有再燃（1 分）。

5、异位寄生：有些寄生虫在常见的寄生部位以外的组织、器官内寄生的现象（2 分）。如蛔虫寄生于胆道所引起的胆道蛔虫病（1 分）

得 分	
评卷人	

二、 是非题：（10 分）

1、 地理和自然因素是寄生虫病流行的主要因素之一，但对于保虫宿主的影响不大。(X)

3、 阿米巴痢疾是一种寄生虫病，因此，抗菌治疗是无效的。（√）

4、 阴道毛滴虫的生活使相对较为简单，它仅有滋养体一个阶段。（√）

5、 弓形虫的生活史中阶段繁多，有速殖子、缓殖子、包囊、假包囊、裂殖体、配殖体、卵囊等 7 个阶段。（√）

6、 肝吸虫的典型特点是芝麻状，有卵盖和肩峰，但无小疣。（X）

7、 猪带绦虫主要是孕节对人体造成感染，而虫卵并不直接感染人。（X）

8、 广州管圆线虫也跟吸虫一样，其生活史过程需要中间宿主螺类。（√）

9、 由于蛔虫的感染阶段为虫卵，因此，养成便后马上洗手是预防蛔虫病的最有效措施。（X）

10、蚊子之所以种群庞大，主要是因为其生活史各阶段对外界因素抵抗力强、产卵率大、容易获取食物、交配次数多等原因。（X）

得 分	
评卷人	

三、 填空题：（30 分）

1、 生物种群的共同生活方式一般可分为（共栖），（互利共生）和（寄生）三种类型。

2、 寄生虫逃避宿主的免疫效应的机制主要包括（分子模拟和伪装），（抗原变异），（免疫抑制）和（组织学隔离）。

3、 切断寄生虫病的传播途径的主要措施包括（控制和消灭中间宿主或媒介节肢动物），（粪便管理）以及（食品卫生监督）三个方面。

4、 寄生原虫的主要致病机制包括（增殖作用），（播散作用）和（机会致病）。

5、 我国黑热病的特殊临床表现是（皮肤型黑热病）和（淋巴结型黑热病）。

6、 AIDS 病人的死亡原因往往是因为继发性的机会致病寄生虫病所导致。这些寄生虫主要包括（弓形虫），（卡氏肺孢子虫），（隐孢子虫）和（蓝氏贾第鞭毛虫）等。

7、 根据血吸虫病流行的地理环境、钉螺分布和流行病学特点可将流行区分为（湖沼型），（山区丘陵型）和（平原水网型）三类。

8、 牛带绦虫的唯一终宿主是（人），适宜的中间宿主有（猪），（牛）等。

9、 蠕型住肠线虫的致病机制是（夜间爬到肛周产卵，刺激肛门），其主要症状为（肛门瘙痒）。

10、判断媒介节肢动物的标准是（生物学依据），（流行病学依据）和（实验室依据）。

大学资料共享

得 分	
评卷人	

大学答案帮手

四、 单选题：（10 分）

1、关于钩虫下列哪项是错误的?（A）

A.钩虫卵为中等大小,淡黄色,椭圆形,壳薄而透明;

B.十二指肠钩虫交合伞的背腹肋共分六小支;

C.我国南方以美洲钩虫为主;

D.雄虫的生殖系统为单管型;

E.钩虫吸血时其头腺可分泌抗疑血素故伤口不易疑血。

2、关于血吸虫下列哪项是正确的是（D）

A.成虫是雌雄同体

B.成虫的形态为背腹扁平,两侧对称,呈长舌形

C.虫体睾丸呈分枝状,前后排列于虫体的后端

D.虫卵中等大小,无盖,有小棘,内有一毛蚴

E.虫卵体小,有盖,有小棘,内有一毛蚴

3、常见人体寄生蠕虫卵中,下列哪一种虫卵体积最小?（E）

A.钩虫卵　　B.鞭虫卵

C.蛲虫卵　　D.姜片虫卵

E.肝吸虫卵

4、中华按蚊的形态,下列哪一条是错误的:（D）

A.体分头、胸、腹,一双窄长翅,三对细长足,一根尖长喙

B.停息时体与喙成一直线,与停落面成一角度

C.翅脉上有黑白斑

D.触须上有三个白环

E.中胸盾片有 5 条浅色条纹

5、关于宿主,下列哪一项是错误的:（D）

A.鲤科鱼是肝吸虫的第二中间宿主

B.人既是猪带绦虫的终宿主又是猪带绦虫的中间宿主

C.人既即旋毛虫的中间宿主也是终宿主

D.人是疟原虫的终宿主

E.牛是血吸虫的保虫宿主

6、血吸虫病人可能对血吸虫产生:（C）

A.完全免疫　　B.带虫免疫

C.伴随免疫　　D.终身免疫

E.以上都不是

大学吧考试帮手

7、粪类圆线虫的感染阶段是（D）

A.外界发育后的感染期虫卵　　B. 新鲜粪便中的虫卵

C.杆状蚴　　D. 丝状蚴

E.雷蚴

8、疟疾复发的原因不包括（A）

A. 与红内期原虫数量有关　　B. 与机体免疫力有关

C. 与抗疟药物有关　　D. 与休眠体有关

E. 与裂殖子数量有关

9、查尿液有可能查到：（A）

A.微丝蚴.阴道滴虫

B.微丝蚴.蛔虫卵

C.钩虫的杆状蚴.微丝蚴

D.阴道滴虫.钩虫的杆状蚴

E.钩虫卵.阴道滴虫

10、诊断肺吸虫病不能用下列哪种方法：（C）

A.直接涂片法

B.自然沉淀法

C.饱和盐水浮集法

D.痰液检查法

E.皮下包块活检

得　分	
评卷人	

五、 多选题：（10 分）

1、有关十二指肠钩虫和美洲钩虫的鉴别下列哪些是错误的：（A、C）

A.十二指肠钩虫的成虫体形为"S"形,美洲钩虫为"C"形

B.十二指肠钩虫成虫大于美洲钩虫成虫

C.美洲钩虫交合伞略为圆形

D.美洲钩虫的口囊腹侧缘有板齿一对

2、带虫免疫和伴随免疫的不同之处在于：（D）

A.是否为保护性免疫

B.是否为非消除性免疫

C.对再感染的虫子的免疫力的大小

D.对初次感染的虫子有无杀灭作用

大学答案帮手

3、组织学检查可用于：（A、B、C、D）

A.血吸虫病的诊断

B.猪囊虫病的诊断

C.肠阿米巴病的诊断

D.肺吸虫病的诊断

4、肛门试子法适于诊断：（B、D）

A.姜片虫病

B.带绦虫病

C.肝吸虫病

D.蛲虫病

5、从痰液中可查到病原体的寄生虫有：（A、B、C）

A.阿米巴

B.肺吸虫

C.钩虫幼虫

D.鞭虫幼虫

得 分	
评卷人	

六、 问答题：

1、 疟原虫引起的贫血的机制如何？（10 分）（检验专业：8 分）

答：直接破坏（2.5 分），脾功能亢进（2.5 分），红细胞生成障碍（2.5 分），免疫病理反应（2.5 分）。

2、 作为一名派去汶川灾区的医疗队员，你考虑的必须防范的寄生虫病有哪些？各应采取什么样的措施？（15 分）（检验专业：7 分）

答：（1）应考虑引起腹泻的寄生虫病 7 分：如阿米巴痢疾；旅游者腹泻；粪类圆线虫；结肠小袋纤毛虫等（答对 3 个即给全分）；（2）应考虑引起发热的寄生虫病 8 分：如疟疾；阿米巴肝脓肿，蚊虫叮咬；蝇蛆病等（答对 4 个即给全分）。

3、 怎样以血吸虫的生活史的知识来解释血吸虫的致病机制、诊断和疗效考核？（检验专业：10 分）

答：（1）：尾蚴所致损害（1.5 分）：血吸虫尾蚴侵入宿主皮肤后数小时可引起 I 型和 IV 型变态反应导致血管扩张、通透性增加、炎性细胞渗出，引起局部炎症反应。（2）：童虫所致的损害（1.5 分）：童虫移行经过肺脏时，可起肺组织点状出血及白细胞浸润这种一过性浸润性血管炎性病变是由童虫毒素、代谢产物或死亡后分解的蛋白所致的变态反应。（3）：成虫所致损害（1.5 分）：成虫在门静脉和肠系膜静脉内寄居及其代谢产物可引起轻微静脉内膜炎，死亡的虫体可引起栓塞性静脉炎及静脉周围炎。（4）：虫卵所致的损害（1.5 分）：虫卵中成熟的毛蚴不断分泌并释放出可溶性虫卵抗原激活 Th 细胞产生多种淋巴因子，继而吸引巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、成纤维细胞及中性粒细胞等聚集到虫卵周围，形成以虫卵为中心的肉芽肿。

大学资源库

诊断和疗效考核：(1)：病原学检查：A：粪便检查（1 分）：从粪便中查找血吸虫虫卵或虫卵孵出毛蚴，是主要的确诊依据和考核疗效方法，常用的方法为尼龙绢集卵镜检法或孵化法。直接涂片法可用于重度感染地区或急性血吸虫病人的黏液血便检查；而改良加藤厚涂片法适宜检测常见蠕虫的感染度、患病率和开展对日本血吸虫病人粪便计数，在流行病学调查和防治效果考核中具有实用价值。B：肠黏膜活体组织检查（1 分）：对临床上怀疑为血吸虫病，而多次粪检阴性，免疫诊断又不能确定的疑似病例，可考虑采用此法，可提高虫卵检出率。(2)：免疫学检查（1 分）：A：皮内实验：通常用于综合查病中对无血吸虫病史人群和检测地区低年龄组人群的过筛。B：环卵沉淀试验；C：间接血凝试验；D：ELISA；E：乳胶凝集试验；等等。(3)：超声波检查（1 分）：能准确直接发现肝脏血吸虫病的病理改变，可评估病情的严重程度。适用于在现场短期内检查大量人群。可用于血吸虫病的流行病学调查、疗效考核、判断预后及筛选病人，可发现粪检阴性与免疫学检查阴性的血吸虫病肝纤维化患者。

大学答案帮手