---o---o---

学　　院

专业班级

学　　号

姓　　名

---o---o---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

中南大学考试试卷、参考答案及评分细则

2009-2010 学年 上 学期人体寄生虫学课程　时间 60 分钟

2006 级临床八年制和 2007 级口腔七年制

2 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %　2009 年 12 月 22 日

题　号	一	二	三	四	五	合　计
满　分	20	20	20	10	30	100
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、名词解释并举例说明(本题 20 分，每小题 4 分)

1、obligatory parasite：专性寄生虫（1 分），是指生活史各个时期或某个发育阶段营寄生生活（1 分），否则就不能生存的寄生虫（1 分）。如（1 分）疟原虫各个发育阶段都必须在人体或蚊体内寄生，否则其生活史将无法完成。

2、definitive host：终宿主（1 分），指寄生虫成虫（1 分）或有性阶段寄生（1 分）的宿主。如（1 分）人是血吸虫的终宿主。

3、larva migrans：幼虫移行症（1 分）：是指一些蠕虫幼虫侵入非正常宿主后（0.5 分），不能发育为成虫（0.5 分），但这些幼虫可在体内长期存活并移行，引起局部或全身性病变（1 分）。举例（1 分）：如犬弓首线虫幼虫、广州管圆线虫幼虫等寄生人体。

4、nymph：若虫（1 分），营陆生生活（1 分）的不完全变态昆虫的幼体（1 分）。如（1 分）虱属于不完全变态昆虫，其生活史过程中无蛹的阶段，但经历若虫阶段。

5、non-sterilizing immunity：非消除性免疫（1 分），寄生虫感染诱导宿主产生的一种对再感染具有一定抵抗力的特异性免疫（1 分），但不能清除体内已有的虫体，维持底虫荷水平，免疫力随虫体的消失而消失（1 分）。如（1 分）疟原虫诱导的“带虫免疫”和血吸虫诱导的“伴随免疫”。

得 分	
评卷人	

二、填空：（20 分）

2、原虫细胞质中运动细胞器的有无及类型是其分类的重要依据。

3、Hydatid 对人体的危害以机械性损害为主，其寄生部位最常见的是肝。

4、*Paragonimus Westermani* 的第二中间宿主是淡水蟹和蝲蛄。

5、钩虫病的首选诊断方法是饱和盐水浮聚法。

6、 Mosquito 主要传播的疾病有疟疾、丝虫病、乙型脑炎、登革热。

7、 寄生虫病流行的因素主要有自然因素、社会因素、生物因素。

8、 *Enterobius vermicularis* 感染的主要方式是肛门—手—口的方式。

9、疟疾引起贫血的原因是红细胞被破坏，脾功能亢进，免疫病理， 骨髓造血功能抑制。

10、俗称"粪毒"的是指钩蚴性皮炎。

得 分	
评卷人	

三、选择题：（20 分）

1、 各种疟疾的潜伏期长短不一,其中最主要原因是（ E ）

A. 红细胞外期发育时间不同　　B. 红细胞内期发育的原虫数不同　　C. 人体免疫力的差异

D. 患者服抗疟药的结果　　E. 疟原虫的种类和虫株不同

2、 急性阿米巴病最常见的病原诊断方法是（ B ）

A. 生理盐水涂片找粪内活动的大滋养体　　B.生理盐水涂片找粪内包囊　　C.血清学检查

D. 组织切片检查　　E.乙状结肠镜检查

3、Medical arthropods 对人体的主要危害是（ D ）

A．寄生　　B．毒害　　C．骚扰　　D．传播疾病　　E．吸血

4、 *Trichomonas vaginalis* 广泛流行,主要由于（ B ）

A. 包囊的抵抗力强　　B. 滋养体抵抗力强　　C. 卵囊的抵抗力强　　D.生活史复杂

E. 需中间宿主

大作业答案

5、 血检间日疟原虫患者,采血时间宜于（ B ）

A. 发作后一周 B. 发作后数小时至 10 余小时

C. 发作期间 D. 发作后 72 小时 E. 发作后 48 小时

6、 引起全身性贫血的原虫是（ B ）

A. *Entamoeba histolytica* B. *Leishmania donovani* C. *Plasmodium vivax*

D. *Giardia lamblia* E. *Ancylostoma duodenale*

7、人体弓形虫病的首要传染源来自（ B ）

A.病人 B.病畜 C.隐性感染者 D.急性弓形虫病者 E.艾滋病者

8、疟疾再燃的原因是（ D ）

A. 迟发型子孢子 B.速发型子孢子 C.残存的红外期原虫 D.残存的红内期原虫

E. 新近再感染

9、哪种绦虫生活史过程中需要两个中间宿主(E)

A. *Taenia solium* B. *Taenia saginata* C. *Echinococcus granulosus*

D. *Echinococcus multilocularis* E. *Spironetra mansoni*

10、人患囊尾蚴病的原因是误食（ C ）

A. 裂头蚴 B. 猪带绦虫虫卵 C. 猪带绦虫囊尾蚴 D. 牛带绦虫虫卵

E. 牛带绦虫囊尾蚴

11、*Taenia solium* 对人体的危害比 *Taenia saginata* 大的主要原因是（ B ）

A. 头节具顶突和小钩 B. 常伴有囊虫病 C. 虫体大 D. 寄生的虫数多

E. 成虫的毒素作用强

12、感染肺吸虫是由于(C)

A.食入未煮熟的淡水鱼 B.生食水红菱，荸荠(马蹄）等水生植物 C.生食或食入未煮熟的溪蟹

D. 食入未煮熟的淡水螺 E.吸入感染性虫卵

13、猪带绦虫驱虫治疗后，淘粪检查，哪项最适合于确定疗效。（ C ）

A、egg B、strobilus C、scolex D、mature proglottid E、gravid proglottid

14、某人接触疫水两周，疑为血吸虫感染，可用的诊断方法有（ E ）

A. 粪便直接涂片法查虫卵 B. 粪便沉淀法查虫卵 C. 毛蚴孵化法

D. 肠粘膜活体组织检查 E. 先用免疫学诊断方法进行筛选

15、在粪便中不经培育或孵化即可检出幼虫的寄生虫是（ D ）

A. *Ascaris lunbricoides* B. *Necator americanus* C. *Enterobius vermicularis*

D. *Trichinella spiralis* E. *Trichuris trichiura*

大学资料部

16、关于 *Sarcoptes scabiei* 哪一项是错误的（ D ）

A． 寄生于人体皮肤表皮层内　　B． 多寄生于人体的薄嫩皮肤

C． 其生活史有卵、幼虫、两期若虫和成虫等五期

D． 许多哺乳动物体上的 itch mite 经常感染人体

E． Scabies 的症状常在夜间加剧

17、*Ascaris lunbricoides* 对人的严重危害在于（ C ）

A． 成虫排卵量大　　B． 成虫夺取营养　　C． 成虫引起并发症

D． 幼虫经肺移行　　E． 虫体代谢产物或崩解产物的刺激

18、钩虫在人体的营养来源主要是（ C ）

A． 肠内半消化食物　　B． 组织液及体液

C． 血液　　D． 肠内容物及肠粘膜　　E． 血液、组织液及肠粘膜

19、既能引起 relapse 又可引起 recrudescence 的 *plasmodium* 虫种包括（ D ）

A．P.v 和 P.f　　B．P.m 和 P.v

C．P.f 和 P.m　　D．P.v 和 P.o　　E．P.o 和 P.f

20、生活史中有世代交替现象的寄生虫有（ B ）

A． *Toxoplasma gondii*　　B． *Plasmodium falciparum*　　C． *Ascaris lumbricoides*

D． *Entamoeba histolytica*　　E． *Schistosoma japonicum*

得 分	
评卷人	

四、是非题：（10 分）

1、日本血吸虫卵的一侧有侧刺，成熟卵内有毛蚴，并且其卵盖很明显。（ × ）

2、肝吸虫的主要致病阶段是成虫。（ × ）

3、*Toxoplasma gondii* 是一种机会致病寄生虫，主要的致病阶段是速殖子，其终宿主是猫科动物。（ √ ）

4、我国血吸虫病的流行区分为湖沼型、平原水网型和山区丘陵型，其中湖南的流行区主要属于平原水网型。（ × ）

5、美洲钩虫雄成虫尾端交合伞的背腹肋由基部分 2 支，每只又分 2 小支。（ × ）

6、蛔虫的生活史类型属于间接发育型，其感染阶段是感染期蛔虫卵。（ √ ）

7、绦虫无口和消化道，成虫寄生于宿主的含有半消化食物的肠道中，靠体壁吸收营养，主要靠糖代谢获

大学资料帮手

得能量。（ √ ）

8、Echinococcosis 是一种人兽共患寄生虫病，在我国主要流行于西北的广大农牧区。（ √ ）

9、恶性疟患者的外周血中一般可以看到大滋养体和裂殖体。（ × ）

10、多数蚊类的触角具有两性特征的差异，即雌蚊的轮毛短而稀，雄蚊的轮毛长而密。（ √ ）

得 分	
评卷人	

五、问答题：（30 分）

1、什么叫疟疾典型性发作？其机理是什么？

答：红内期原虫的裂体增殖所引起的周期性寒热发作（3 分）。

机理：疟原虫裂殖子、代谢产物以及宿主的红细胞碎片（2 分）被巨噬细胞、中性粒细胞吞噬（1 分），刺激这类细胞产生内源性热原质（1 分），它与外源性热原质——疟原虫代谢产物（2 分）一起作用于宿主的下丘脑体温调节中枢（1 分），引起周期性的寒热发作。

2、用图解法表示日本血吸虫的生活史，并指出其成虫寄生部位、中间宿主、感染阶段、感染途径和离体阶段，并简述虫卵是如何离开人体的？

答：寄生于终宿主肠系膜下静脉的日本血吸虫成虫产出大量的虫卵（1 分）→成熟的活虫卵在外界水体中孵化出毛蚴（1 分）→毛蚴主动钻入中间宿主钉螺体内（1 分）经无性繁殖产生大量尾蚴（1 分）→尾蚴是日本血吸虫的感染阶段（1 分），当遇到终宿主即经皮肤主动侵入而致宿主感染（1 分）→童虫随血循环最终在肠系膜下静脉发育为成虫（1 分），开始雌雄合抱并产卵（1 分）→虫卵中毛蚴所分泌的可溶性抗原刺激血管壁发生溃破（1 分），虫卵在肠蠕动及腹内压力的作用下从血管溃破处落入肠腔再随粪便排出体外（1 分）。

3、在我国寄生虫病流行区，发现肝、脾肿大的患者，主要可能是由哪些种寄生虫引起的？其致病机理有何不同？

答： A、杜氏利什曼原虫无鞭毛体（0.5 分）：杜氏利什曼原虫无鞭毛体在巨噬细胞内繁殖（0.5 分），致使大量巨噬细胞遭到破坏(0.5 分)，肝脏、脾脏等器官大量生成巨噬细胞(0.5 分)，从而导致肝脏、脾脏组织增生(0.5 分)，进而引起肝、脾肿大(0.5 分)等临床表现；

B、刚地弓形虫速殖子（0.5 分）：刚地弓形虫速殖子可寄生于中间宿主包括人在内的几乎所有的有核细胞中（0.5 分），并迅速增殖，从而造成大量的单核巨噬细胞等有核细胞受到破坏（0.5 分），逸出的速殖子又可侵犯邻近的细胞（0.5 分），如此反复破坏进而引起组织器官的增生、水肿、及有核细胞的浸润（0.5 分），从而导致肝脾肿大；

C、日本血吸虫（0.5 分）：日本血吸虫产卵量大，在宿主组织内多成束聚集，肉芽肿的急性期易液化而出现嗜酸性脓肿（0.5 分），虫卵周围出现许多浆细胞伴以抗原抗体复合物沉着，即何博礼现象（0.5 分）。当卵内毛蚴死亡后，逐渐停止释放抗原（0.5 分），肉芽种直径开始减小，虫卵逐渐消失（0.5 分），代之以纤维化（0.5 分）。在肝脏，虫卵肉芽肿位于门脉分支的终端，重度感染时门脉周围出现广泛的纤维

化，导致门脉高压，引起肝脾肿大（0.5 分）；

D、疟原虫红细胞内期裂体增殖阶段（0.5 分）：疟原虫红细胞内期裂体增殖引起脾脏充血以及单核吞噬细胞增生，进而导致脾脏代偿性增生，出现肝、脾肿大。反复感染引起纤维组织增生，组织高度纤维化，肝、脾肿大更加加剧（0.5 分）。

大学答案帮手