---○---○---

学　　院	
专业班级	
学　　号	
姓　　名	

---○---○---

评卷密封线…………密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理…………评卷密封线

中南大学考试试卷

2010-2011 学年 上 学期人体寄生虫学课程　时间 60 分钟

2007 级临床八年制

2 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %　2010 年 12 月 22 日

题　号	一	二	三	四	五	合　计
满　分	20	15	25	10	30	100
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、名词解释并举例说明(本题 20 分，每小题 4 分)

1、ectopic parasitism

异位寄生（1 分）。指有些寄生虫在常见寄生部位以外的器官或者组织内寄生的现象（2 分）。举例（1 分）

2、intermediate host

中间宿主（1 分）。寄生虫的幼虫和无性生殖阶段所寄生的宿主（2 分）。举例（1 分）

3、premunition

带虫免疫（1 分）。(1) 获得的非消除型免疫，可杀灭体内大部分原虫，使虫数维持在抵水平（1 分）；(2) 对再感染的童虫有部分抵抗力，虫体消失免疫力逐渐消失（1 分）。举例（1 分）

4、opportunistic protozoa

机会致病原虫（1 分）。有些寄生原虫，在宿主免疫力正常的时候不致病（1 分），但是当宿主免疫力低下或者受损的时候，则可大量繁殖并引起严重的后果（1 分）。举例（1 分）

5、molecular mimicry

分子模拟（1 分）。某些寄生虫体表能表达与宿主组织抗原相似的成分，称为分子模拟（2 分）。举例（1 分）

大学联考帮中

得 分	
评卷人	

二、填空：（15 分）

1．蛲虫的生活史特点有__生活史简单____、___周期短______。

2．直接寄生人体引起病变的医学节肢动物有__蠕形螨____、__疥螨__、__蝇蛆___等。

3．蛔虫引起的外科并发症中最常见的是__胆道蛔虫病__________。

4．根据血吸虫病流行区的地理环境、钉螺分布和流行病学特点可将流行区分为三种类型___湖沼型_________、___山区丘陵型________、__平原水网型__________。

5．医学原虫的致病特点有_增殖作用_____、___播散__ 和机会致病。

6．临床上带绦虫病通过_子宫的形态特征__确定虫种。

7．寄生虫病流行特点有_地方性_______、___季节性____、___自然疫源性___。

得 分	
评卷人	

三、选择题（至少有一个正确答案）：（25 分）

1、extra-intestinal amoebiasis 最常见的类型是（ A ）

A、amoebic liver abscess B、amoebic lung abscess C、amoebic brain abscess

D、cutaneous amebiasis E、amoebic peritonitis

2、既能引起复发又可引起再燃的疟原虫虫种包括（ D ）

A、P.v 和 P.f B、P.m 和 P.v C、P.f 和 P.m D、P.v 和 P.o E、P.o 和 P.f

3、日本血吸虫的感染阶段是（ C ）

A、miracidium B、sporocyst C、cercaria D、ovum E、encysted metacercaria

4、间日疟原虫的离体阶段是（ C D ）

A、sporozoite B、ookinete C、microgametocyte 和 macrogametocyte

D、female gamete 和 male gamete E、zygote

5、联合国开发计划总署等倡议的热带病特别规划要求防治的 6 类主要热带病中，有 5 类是寄生虫病，它们是（ D ）

A、schistosomiasis, hookworm disease, filariasis, malaria, ascariasis

B、leishmaniasis, hookworm disease, schistosomiasis, filariasis, malaria

C、trypanosomiasis, leishmaniasis, schistosomiasis,amoebic dysentery, toxoplasmosis

D、malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, filariasis, trypanosomiasis

E、malaria, leishmaniasis, toxoplasmosis, schistosomiasis, hookworm disease

6、下列哪类节肢动物不寄生于人体内（包括组织内及器官内）（ E ）

A、蝇蛆 B、虱 C、疥螨 D、蠕形螨 E、蚤

7、俗称“粪毒”的是指（ C ）

A、尾蚴性皮炎 B、丝虫引起的“流火” C、钩蚴性皮炎 D、昆虫性皮炎

E、丹毒性皮炎

8、经接触疫土而感染的寄生虫有（ C ）

A、疟原虫 B、致倦库蚊 C、钩虫 D、血吸虫 E、日本血吸虫

9、肝吸虫的感染方式是（ E ）

大学资料帮

A、接触疫水　B、喝生水　C、经昆虫叮咬　D、吃未煮熟的猪肉
E、吃生的或未煮熟的淡水鱼肉

10、猪带绦虫驱虫治疗后，淘粪检查，哪项最适合于确定疗效。（ C　）
A、虫卵　B、链体　C、头节　D、成虫　E、孕节

11、蛔虫对人的严重危害在于（B C　）
A、成虫的产卵量大　B、成虫夺取营养　C、成虫引起并发症　D、幼虫经肺移行
E、幼虫经心脏移行

12、溶组织内阿米巴的感染阶段是（ D　）
A、小滋养体　B、单核包囊　C、大滋养体　D、四核包囊　E、包囊和滋养体均可

13、出现游走性皮下包块的绦虫病是（　A CE　）
A、囊尾蚴病　B、棘球蚴病　C、裂头蚴病　D、牛囊尾蚴病　E、猪囊尾蚴病

14、生活史中必须经过肺部的线虫有（　E　）
A、鞭虫　B、蛲虫　C、丝虫　D、旋毛虫　E、钩虫

15、病媒昆虫生物性传播病原是（B　）
A、病原体由某种昆虫携带而传播
B、病原体在某种昆虫体内经一定的发育或增值后而传播
C、病原体进入昆虫体内，立即有感染力
D、病原体在某种昆虫体内不经一定的发育或增值而排出体外后再进行传播
E、病原体在某种昆虫体内产生毒素而传播

16、hookworm disease 的症状可有（A BCD）
A、皮炎　B、贫血　C、消化道症状　D、异食症　E、噬酸性粒细胞增多症

17、输血可引起感染的有（ AB ）
A、*Toxoplasma gondii*　B、*Plasmodium vivax*　C、*Leishmania donovani*
D、*Schistosoma japonicum*　E、*Wuchereria bancrofti*

18、生活史中有世代交替现象的寄生虫有（ABE　）
A、*Toxoplasma gondii*　B、*Plasmodium falciparum*　C、*Ascaris lumbricoides*
D、*Entamoeba histolytica*　E、*Schistosoma japonicum*

19、人体裂头蚴病的感染方式有（　ABCDE　）
A、生青蛙肉敷贴伤口　B、食入生蛇肉　C、经口误食含原尾蚴的剑水蚤
D、生食猪肉　E、食入生鱼肉

20、血吸虫卵能进入肠腔并随粪便排除体外，其原因是（ ACD　）
A、卵内毛蚴分泌物破坏血管壁并发生坏死　B、粗糙食物刺激、消化腺分泌液的作用
C、血管内压的作用　D、肠的蠕动、腹内压增加　E、虫卵的重力作用

21、斯氏狸殖吸虫与卫氏并殖吸虫的主要不同点是（ACDE　）
A、终宿主为果子狸、猫、犬等　B、人是正常宿主　C、侵入人体内的虫体多数停留在幼虫状态　D、以兽为主的致病虫种　E、成虫虫窄长，前宽后窄，两端较尖

22、引起疟疾不典型发作的原因是（ABCDE　）
A、疟疾初发　B、同时感染几种疟原虫　C、儿童及无免疫力的人群
D、药物治疗不彻底　E、体内有几批密度差不多的疟原虫

23、蛲虫成虫的形态特点是（ ABCDE　）

大学资料帮

A、细小，乳白色　　B、头端具有角质口囊　　C、雌虫尾部长而尖细　　D、雄虫尾端具有交合伞　　E、角皮具有横纹，体前端有膨大的头翼

24、下列说法正确的是（　C　）

A、人吃了猪带绦虫的卵即可感染猪带绦虫　B、猪带绦虫的保虫宿主是猪　C、人吃了“米猪肉”可感染猪带绦虫　　D、猪带绦虫的成节卵巢仅分为2叶

E、牛带绦虫的成虫和幼虫可寄生在人体内

25、蝇与其传病有关的形态及习性是（AB　　）

A、全身被有细毛　B、爪垫分泌粘液　C、边吃边排泄边呕吐　D、有昼伏夜出的习性　E、对气候有严格的选择性

得 分	
评卷人	

四、是非题：（10分）

1. 钩虫幼虫在人体肺部移行时所引起的病变，属于幼虫移行症（　√　）
2. 阴道毛滴虫只寄生在女性阴道内（　X　）
3. 疟原虫的生活史中离开人体的阶段是子孢子（　X　）
4. 生食荸荠、菱角等水生植物有可能感染布氏姜片吸虫（√　）
5. 寄生于消化道的寄生虫并非都是经口感染（√　）
6. 人可作为猪、牛带绦虫的中间宿主（X　　）
7. 所有吸虫均为雌雄同体（　X　）
8. 异嗜症是钩虫病最主要的临床表现（　X　）
9. 透明胶纸粘贴法可用于蛲虫及牛肉绦虫病的诊断（√　）
10. 急性阿米巴痢疾患者传染性最强（　X　　）

得 分	
评卷人	

五、问答题：（30分）

1. 什么叫疟疾典型性发作？其机理是什么？

疟疾发作时包括寒战、高热和出汗各连续阶段，这种周期性的发作称为疟疾的典型发作。5分

机理：与红内期原虫的增殖周期相一致。5分

2. 当发现病人外周血液中嗜酸性粒细胞增多时，应考虑到哪些寄生虫病?

肺吸虫病，广州管圆线虫病，裂头蚴病，血吸虫病，肝吸虫病各2分

3. 简述血吸虫虫卵肉芽肿的形成对机体的利弊关系?

虫卵肉芽肿的形成 4 分：虫卵中的成熟毛蚴---SEA-----巨噬细胞吞噬-----呈递给 Th---分泌 IL-1----分泌大量的淋巴细胞因子---吸引巨噬细胞，嗜酸性粒细胞，成纤维细胞，中性粒细胞等聚集，形成以虫卵为中心的肉芽肿。

有利之处 3 分：通过肉芽肿形成，将虫卵破坏清除，并隔离和清除了虫卵释放的 SEA，减少其进入血液循环，从而减少抗原抗体复合物的全身损害。

不利之处 3 分：虫卵肉芽肿破坏宿主正常的组织，虫卵肉芽肿纤维化后形成相互连接的瘢痕，导致干线型的肝硬化。

大学答案帮手