中南大学考试试卷（A 卷）

2010-2011 学年 二 学期人体寄生虫学课程　时间 70 分钟

2009 级五年制临床、麻醉、预防、精卫、国标班、基改班、检验、护理和口腔七年制

2 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %　2011 年 5 月 24 日

题　号	一	二	三	四	五	合　计
满　分	15	45	10	15	15	100
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、名词解释并举例说明（每题 3 分，共 15 分）

1、寄生虫生活史

指寄生虫完成一代生长（1 分）、发育繁殖（1 分）的全过程。

如血吸虫在钉螺体内和人体内的两个过程。（1 分）

2、人兽共患寄生虫病

指有的人体寄生虫可以在脊椎动物（1 分）和人之间自然的传播（1 分）。

如血吸虫病（1 分）

3、专性寄生虫

指至少一个（1 分）发育阶段营寄生生活（1 分）的寄生虫。

如肝吸虫（1 分）

4、何博礼现象

指血吸虫虫卵释放的可溶性虫卵抗原（1 分）能刺激 B 细胞产生相应的抗体，并可形成抗原抗体复合物（1 分），从而在虫卵周围形成嗜酸性的放射状棒状体（1 分）。

5、蝇蛆病

蝇类幼虫（1 分）寄生于人或动物的组织（1 分），器官所致的一类疾病，称为蝇蛆病。如蝇幼虫寄生在眼、口腔、皮肤、胃肠道、泌尿生殖道等（1 分）

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

大连医科大学

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每道试题下有 A、B、C、D、E 5 个备选答案，从中选出 1 个最佳答案填在答题表格内，填在表格外一律无效，每题：1 分，共 45 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	E	C	A	B	C	B	C	A	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	E	C	D	B	B	A	C	B	E
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	E	B	E	D	E	E	D	C	B
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	A	A	C	E	A	A	C	A	A	D
题号	41	42	43	44	45					
答案	A	D	D	C	A					

1、寄生虫幼虫或无性生殖阶段所寄生的宿主称为（　　）
A. 终宿主　　B. 中间宿主
C. 保虫宿主　　D. 转续宿主　　E. 带虫者

2、原虫分类的主要依据（　　）
A．细胞的大小　　B．细胞核的数目与大小
C．细胞内含物的性质和形状　　D．细胞核内染色质的形态学特点
E．运动细胞器

3、下列不属于虫媒病的是（　　）
A. 丝虫病　　B．疟疾　　C．疥疮　　D．登革热　　E．鼠疫

4、成虫阶段不寄生人体的是（　　）
A．斯氏狸殖吸虫　　B．布氏姜片虫　　C．日本血吸虫
D．卫氏并殖吸虫　　E．猪带绦虫

5、机会致病寄生虫是（　　）
A．偶然感染的寄生虫　　B．免疫功能低下时致病的寄生虫
C．暂时寄生的寄生虫　　D．免疫功能正常时致病的寄生虫
E．　随机感染的寄生虫

6、吸虫生活史的中间宿主必须有（　　）
A．食肉类哺乳动物　　B．食草类哺乳动物
C．淡水螺　　D．水生植物　　E．淡水鱼、虾

7、人误食新鲜粪便污染了的食物可能感染（　　）

大学资料库

A．蛔虫　　B．溶组织内阿米巴
C．日本血吸虫　　D．美洲钩虫　　E．鞭虫

8、以下何种方法只能用于华支睾吸虫的辅助诊断而不能确诊？（　　）
A．加藤法　　B．粪便水洗沉淀法
C．间接血凝法　　D．乙醚盐酸粪便离心法　　E．十二指肠引流法

9、蛲虫病的主要症状是（　　）
A．肛周及会阴部瘙痒　　B．腹泻、腹痛
C．异位寄生　　D．异食症　　E．贫血

10、卫氏并殖吸虫生活史中，犬、虎、狼为（　　）
A．第一中间宿主　　B．第二中间宿主
C．保虫宿主　　D．转续宿主　　E．中间宿主

11、溶组织内阿米巴的感染阶段是（　　）
A．卵囊　　B．滋养体　　C．二核包囊　　D．四核包囊　　E．八核包囊

12、链状带绦虫对人体的主要危害是（　　）
A．虫体吸收大量的营养　　B．头节的小钩和吸盘对肠壁的刺激
C．六钩蚴穿过组织时的破坏作用　　D．大量代谢产物毒素作用
E．囊尾蚴寄生组织器官所造成的损害

13、日本血吸虫对人的危害主要是由于虫卵（　　）
A．机械性阻塞血管
B．作为异物，刺激周围组织发生炎症
C．分泌的可溶性虫卵抗原导致虫卵肉芽肿
D．沉积在组织、器官中压迫周围组织
E．死亡后造成周围组织的变态反应

14、日本血吸虫卵在人体最常见的沉积部位是（　　）
A．脾、肾　　B．脑、肾
C．肺、皮肤　　D．肝、结肠　　E．脑、肺

15、绦虫成虫具有生长能力的是（　　）
A．头节　　B．颈部
C．幼节　　D．成节　　E．孕节

16、脑型疟主要由哪种疟原虫感染所致（　　）
A．间日疟原虫　　B．恶性疟原虫
C．三日疟原虫　　D．卵形疟原虫　　E．伯氏疟原虫

17、人既可作为中间宿主，又可作为终宿主的寄生虫是（　　）
A．链状带绦虫　　B．肥胖带绦虫
C．华支睾吸虫　　D．布氏姜片吸虫　　E．日本血吸虫

18、刚地弓形虫寄生在人体的（　　）
A．红细胞　　B．淋巴液
C．有核细胞　　D．血清　　E．脑脊液

19、急性刚地弓形虫病的主要致病阶段为（　　）
A．缓殖子　　B．速殖子　　C．裂殖体　　D．子孢子　　E．卵囊

20、吡喹酮可用于治疗（　　）
A．猪带绦虫病　　B．囊虫病
C．牛带绦虫病　　D．华支睾吸虫病　　E．　以上均可

21、实验室诊断疥疮的常用操作方法是（　　）
A．以消毒针头挑破局部皮肤检查　　B．留取患者粪便直接涂片法
C．采外周血薄血片检查　　D．刮取局部标本培养　　E．采外周血用 ELISA 法检查

22、棘球蚴病的最后确诊取决于哪项结果？（　　）
A. 询问病史，了解病人有无与羊、犬等动物的接触史
B. CT、同位素扫描　　C. X线、超声波检查
D. 免疫学检查　　E. 手术取出棘球蚴
23、毛蚴孵化法可用于诊断（　　）
A. 猪带绦虫病　　B. 血吸虫病
C. 细粒棘球绦虫病　　D. 丝虫病　　E. 曼氏迭宫绦虫病
24、似蚓蛔线虫对人最严重的危害是（　　）
A. 幼虫引起肺部损伤　　B. 成虫引起消化道症状
C. 成虫吸取营养导致机体营养不良　　D. 幼虫引起血管炎
E. 成虫寄生导致并发症
25、哪种寄生虫的生活史不需要中间宿主？（　　）
A. 血吸虫　　B. 疟原虫
C. 曼氏迭宫绦虫　　D. 毛首鞭线形虫　　E. 肝吸虫
26、导致蛔虫病广泛流行的因素很多，但除（　　）外
A. 蛔虫生活史简单，卵在外界环境中直接发育为感染期虫卵
B. 虫卵对外界环境的抵抗力强
C. 蛔虫产卵量大，每天每条雌虫产卵约24万个
D. 粪便管理不当，不良的个人卫生和饮食卫生习惯
E. 感染期虫卵可经多种途径进入人体
27、肉眼鉴别美洲钩虫和十二指肠成虫的主要依据是（　　）
A. 交合伞　B. 虫体大小　C. 口囊　D. 阴门位置　E. 体态
28、恶性疟原虫感染者的外周血中能查到（　　）
A.环状体和滋养体　　B.滋养体和裂殖体
C.裂殖体和配子体　　D.环状体和配子体　　E.环状体和裂殖体
29、肝吸虫成虫寄生于人体的（　　）
A. 肝细胞内　　B. 肠系膜静脉
C. 次级肝胆管内　　D. 腹腔　　E. 肺
30、在粪便中可查到幼虫的寄生虫是（　　）
A. 旋毛虫　　B. 粪类圆线虫
C. 钩虫　　D. 蛔虫　　E. 蛲虫
31、确诊钩虫病最常用、阳性率高的方法是（　　）
A. 饱和盐水浮聚法　　B. 直接涂片法
C. 自然沉淀法　　D. 肛门拭子法　　E. 肠粘膜活组织检查
32、口囊内有两对比较尖锐的钩齿的寄生虫为（　　）
A. 十二指肠钩口线虫　　B. 美洲板口线虫
C. 似蚓蛔线虫　　D. 蠕形住肠线虫　　E. 毛首鞭形线虫
33、节肢动物对人类危害最严重的为（　　）
A. 叮刺吸血　　B. 直接寄生人体内
C. 传病媒介　　D. 毒害　　E. 作为过敏源
34、血吸虫的保虫宿主主要是（　　）
A. 钉螺　　B. 鸡、鸭等禽类
C. 淡水鱼虾　　D. 青蛙　　E. 牛、羊、兔等哺乳动物
35、在阴道毛滴虫生活史中（　　）
A. 只有滋养体时期　　B. 既有滋养体时期，又有包囊时期
C. 既有前鞭毛体时期，又有无鞭毛体时期

D. 既有滋养体时期，又有包囊、假包囊时期
E. 只有包囊时期

36、人感染蓝氏贾第鞭毛虫多数表现为（　　）
A. 腹疼、腹泻　　B. 胃肠道功能紊乱
C. 贾第虫病　　D. 无症状排包囊者　　E. 胆囊炎、胆管炎

37、常用蠕形螨检查方法是（　　）
A. 活组织检查法　　B. 粪便直接涂片法
C. 透明胶纸黏贴法或挤压涂片法　　D. 厚涂片法　　E. ELISA 等免疫学方法

38、人疟原虫生活史发育过程中所经过的地方顺序是（　　）
A. 蚊唾腺—人肝细胞一人红细胞一蚊胃一蚊唾腺
B. 蚊唾腺—蚊胃—人肝细胞—人红细胞—蚊唾腺
C. 人肝细胞—蚊胃—蚊唾腺—人红细胞—蚊唾腺
D. 人红细胞—人肝细胞—蚊唾腺一蚊胃—蚊唾腺
E. 人肝细胞—人红细胞—蚊唾腺—蚊胃—蚊唾腺

39、不能引起复发的疟原虫有（　　）
A. 三日疟原虫、恶性疟原虫　　B. 间日疟原虫、恶性疟原虫
C. 卵形疟原虫、三日疟原虫　　D. 卵形疟原虫、恶性疟原虫
E. 间日疟原虫、卵形疟原虫

40、骨髓穿刺主要用于诊断（　　）
A. 恶性疟　　B. 丝虫病　　C. 血吸虫病　　D. 黑热病　　E. 钩虫病

41、刚地弓形虫的终宿主是（　　）
A. 猫科动物　　B. 食草动物
C. 啮齿类动物　　D. 人　　E. 爬行动物

42、幼虫期不侵犯人肺部的寄生虫是（　　）
A. 钩虫　　B. 肺吸虫
C. 蛔虫　　D. 姜片虫　　E. 血吸虫

43、医学昆虫不完全变态的特点是（　　）
A. 若虫与幼虫形态相似　　B. 发育过程为卵、幼虫、蛹、成虫
C. 成虫与幼虫形态相似　　D. 成虫与若虫形态相似
E. 成虫与若虫截然不同

44、家蝇的口器为（　　）
A. 咀嚼式　　B. 刺吸式　　C. 舐吸式
D. 刺吸式和舐吸式　　E. 咀嚼式和刺吸式

45、棘球蚴最常寄生于人体的（　　）
A. 肝脏　　B. 肺脏　　C. 脑　　D. 脾脏　　E. 皮肤

得 分	
评卷人	

三、多项选择题（在 A.B.C.D.E 5 个备选答案中，选出 2 个以上（包括 2 个）正确的答案，并填在答题表格内，填在表格外一律无效，多选、少选、错选，均不得分。每题 2 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	ABC	AD	ABCD	ABCD	ABE

1、肠外阿米巴病常见于（　　）
A．肝脏　　B．肺脏　　C．脑　　D．脾脏　　E．肾脏
2、能引起幼虫移行症的有（　　）
A．斯氏狸殖吸虫　　B．蛔虫
C．血吸虫　　D．犬弓首线虫　　E．旋毛虫
3、日本血吸虫卵能进入肠腔并能随粪便排出体外的主要原因是（　　）
A．肠蠕动增强　　B．卵内毛蚴分泌物破坏肠壁
C．腹内压增高　　D．血管内压增高　　E．毒素破坏肠壁
4、采用活组织检查法诊断的寄生虫病有：（　　）
A．血吸虫病　　B．猪囊尾蚴病
C．溶组织内阿米巴病　　D．旋毛虫病　　E．华支睾吸虫病
5、囊虫病的感染方式有（　　）
A．自体外感染　　B．自体内感染
C．经胎盘感染　　D．媒介昆虫传播　　E．异体感染

得 分	
评卷人	

四、填空题(每空 1 分，共 15 分)

1、寄生虫病流行的主要特点(　地方性　)、(　季节性　)和（自然疫源性）。
2、人体消化道常见寄生虫卵中最大的是（布氏姜片虫卵）。
3、溶组织内阿米巴滋养体侵入粘膜的机制和 3 种重要的因子有关，它们分别是半乳糖/乙酰氨基半乳糖凝集素、（阿米巴穿孔蛋白）和（半胱氨酸蛋白酶）。
4、含有（日本血吸虫尾蚴）的水称为疫水。
5、在血吸虫感染的的宿主血液中，可检出 3 种循环抗原，即（肠相关抗原）其也可能为血吸虫循环抗原的主要成分，（膜相关抗原）和（可溶性虫卵抗原）。
6、医学原虫的致病特点有（增殖作用）、（播散致病）和机会性致病。
7、蛔虫引起的外科并发症中最常见的是（胆道蛔虫病）。
8、根据血吸虫病流行区的地理环境、钉螺分布和流行病学特点可将流行区分为三种类型山区丘陵型、（平原水网型）和（湖沼型）。

得 分	
评卷人	

五、简答题：（共 15 分）

1、简述钩虫引起人体贫血的机理（7 分）。
钩虫引起人体贫血的机理为：
(1)钩虫有口囊，咬附肠粘膜吸血，吸血时分泌抗凝素，使血液不易凝固。（2 分）
(2)钩虫引起慢性失血。原因为：
①钩虫利用口囊吸血及血液迅速自消化道排出（边吸血边排血）；（2 分）
②咬附部位粘膜伤口渗血；（1 分）
③钩虫经常更换咬附部位，造成新旧伤口的失血。（1 分）
(3)钩虫寄生造成肠粘膜出血点、溃疡，导致营养吸收功能障碍，导致造血障碍。（1 分）

2、简述间日疟发作的原因及其周期性的特点（8 分）。
（1）发作原因：红细胞内期成熟裂殖体胀破被寄生的红细胞，其中裂殖子、疟原虫代谢产物、

红细胞碎片和变性的血红蛋白等进入血流，被巨噬细胞和多形核白细胞吞噬，刺激这些细胞产生内源性致热原，与疟原虫代谢产物一并作用于下丘脑体温调节中枢，引起体温调节紊乱而发热。体温升高数小时，血流中的致病物质已被吞噬或降解，内源性致热原不再产生，刺激体温调节紊乱的因素消失了，体温调节机能恢复正常，机体通过大量出汗，体温恢复正常。（4分）

（2）发作的周期性　红细胞内期成熟裂殖体胀破被寄生的红细胞，裂殖子逸出，迅速进入新的红细胞，在红细胞内继续进行裂体增殖，经环状体、滋养体和裂殖体；再胀破被寄生的红细胞，再次引起发热，如此循环，形成典型的周期性发作。（3分）

（3）疟原虫发作周期与红细胞内裂体增殖周期所需时间一致。间日疟原虫红细胞内裂体增殖周期为48小时，故隔天发作一次。（1分）

大学答案帮手