中南大学考试试卷、参考答案及评分细则

2008~2009 学年 下 学期 医学寄生虫学 课程 时间 60 分钟(检验专业 90 分钟)

40 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 2009 年 6 月 29 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
满　分											100
得　分											
评卷人											
复查人											

得 分	
评卷人	

一、名词解释并举例(本题 20 分，每小题 4 分)

1、寄生：两种生物生活在一起（1 分），其中一方从中获利，而另一方受到损害（2 分），这种关系称为寄生。（举例 1 分）

2、疟疾复发：疟疾初发停止后，红内期的原虫已全部杀灭(1’)，经过一个较长的潜隐期后，由于红外期的原虫再次进入血流(1’)，大量繁殖所致(1’)的临床发作称复发。举例（1 分）

3、机会致病原虫：某些寄生虫原虫感染人体后呈隐性感染状态，并不表现临床症状（1 分），当人体免疫力下降时或免疫力受损时（1 分），这些寄生虫大量繁殖，引起严重的临床表现（1 分），称为机会致病寄生虫。举例（1 分）

4、幼虫移行症：是指一些寄生虫蠕虫幼虫侵入非正常宿主（1 分）（人或动物）后，不能发育为成虫，这些幼虫在体内长期移行（1 分）造成局部或全身性的病变。如（1 分）斯氏狸殖吸虫寄生于人体引起的皮下游走性结节。举例（1 分）

5.生物性传播：病原体在节肢动物体内经历发育或/和繁殖的阶段才能传播到新的宿主(2)，包括发育式、繁殖式、发育繁殖式和经卵传代式（1），举例（1）

得 分	
评卷人	

二、是非题（本题 10 分，每小题 1 分）

1. 猪带绦虫的储蓄宿主是猪。（ × ）

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

本资料来自网络

3. 斯氏肺吸虫病主要在人类中传播，亦可在野生动物中传播。（ × ）

4. 日本血吸虫病起源于日本，以后传入中国和东南亚。我国的流行区为长江以南各省、市、自治区。（ × ）

5. 近年的研究证明，过去称为溶组织内阿米巴的寄生虫，实际上包括两个不同的种，即致病的 Entamoeba histolytica 和非致病的 E.dispar。（ √ ）

6. 阿米巴肝脓疡边缘能查见溶组织内阿米巴大滋养体及小滋养体。（ × ）

7. 带虫者虽无明显的临床症状和体征，但可传播病原体，常为寄生虫病重要的传染源。（ √ ）

8. 寄生虫病的流行特点为季节性、地方性和易感性。（ × ）

9. 疟疾的传播与蚊叮人吸血有关，因此，除输血传播者外，在早春季节不可能有疟疾病人。（ × ）

10. 人体受血吸虫感染后产生获得性免疫，主要是直接作用于再次侵入的尾蚴。（ √ ）

得 分	
评卷人	

三、填空题（本题 25 分，每空 1 分）

1. 寄生虫病流行的基本条件包括传染源、传播途径和易感人群。

2. 我国人体寄生丝虫有两种，即班氏丝虫及马来丝虫。

3. 疟疾的贫血与下列因素有关直接破坏、红细胞生成障碍、脾亢和免疫病理。

4. 可损害肠壁，又可损害肝脏、肺甚至脑的寄生虫 溶组织内阿米巴和血吸虫。

5. 医学节肢动物中可寄生于人体组织中的有蝇蛆、潜蚤、尘螨、蠕形螨及 疥螨。

6. 我国的五大寄生虫病是血吸虫病、 疟疾、钩虫病、丝虫病及利什曼病。

7. 溶组织内阿米巴感染阶段是四核包囊，感染途径是经口。

8. 蚊虫的孳生地是指幼虫阶段生活的场所；栖息地是指成虫阶段生活的场所。

大学答案帮手

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、选择题（本题 25 分，每小题 1 分）

（一）单选题

1．关于宿主，下列哪一项是**错误**的：（ D ）

A. 鲤科鱼是肝吸虫的第二中间宿主　　B. 人既是猪带绦虫的终宿主又是中间宿主

C. 人既是旋毛虫的中间宿主也是终宿主　　D. 人是疟原虫的终宿主

E. 牛是血吸虫的保虫宿主

2. 人患肺吸虫病是由于：（ D ）

A. 生食或半生食牛肉　　B. 生食或半生食猪肉　　C. 生食或半生食淡水鱼

D. 生食或半生食溪蟹　　E. 生食或半生食蛙肉

3. 人体感染旋毛虫的方式是：（ C ）

A. 生食或半生食蔬菜　　B. 生食或半生食淡水鱼　　C. 生食或半生食猪肉、野猪肉

D. 生食或半生食溪蟹　　E. 生食水生植物

4. 人是美洲钩虫的：（ C ）

A. 中间宿主　　B. 保虫宿主　　C. 终宿主　　D. 转续宿主　　E. 以上都不是

5. 日本血吸虫卵的致病主要在于（ D ）

A 大量虫卵阻塞血管，使组织发生局灶性坏死　　B. 虫卵的压迫和破坏作用

C、卵内毛蚴分泌毒素使组织溶解　　D. 卵内毛蚴分泌物引起超敏反应及肉芽肿形成

E. 卵壳的抗原刺激引起炎症反应

6. 获得性弓形虫病的临床表现有多种类型，其中最常见的是（ C ）

A、中枢神经系统受累　　B、弓形虫眼病　　C、淋巴结肿大

D、长期低热　　E、肝脓肿

7. 在原虫生活史类型中属于虫媒传播型的是（ C ）

A、弓形虫　　B、溶组织内阿米巴　　C、杜氏利什曼原虫

D、蓝氏贾第虫　　E、结肠小袋纤毛虫

8. 丝虫的感染阶段是：（ C ）

A. 虫卵　　B. 含第二期幼虫的虫卵　　C. 丝状蚴　　D. 微丝蚴　　E. 成虫

大学资料帮手

大学答案帮手

9. 华支睾吸虫最常寄生于：（ D ）

A.十二指肠 B.小肠上段 C.结肠 D.肝内胆管 E.以上都不是

10. 下列哪种虫卵误食后,可能导致人体感染寄生虫病：（ A ）

A.猪带绦虫卵 B.肺吸虫卵 C.华支睾吸虫卵 D.血吸虫卵 E.钩虫卵

11. 我国传播流行性乙型脑炎的重要媒介是（ E ）

A、硬蜱 B、软蜱 C、疥螨 D、臭虫 E、库蚊

12 可引起幼虫移行症的寄生虫是（ E ）

A、蛔虫 B、蛲虫 C、旋毛虫 D、猪囊虫 E、斯氏狸殖吸虫

13. 包虫在人体最常见的寄生部位是（ C ）

A、胸腔和肺 B、腹腔 C、肝 D、脑 E、骨骼

14. 日本血吸虫雌虫产卵于（C ）

A、肠壁 B、肝内小静脉 C、肠系膜小静脉末梢 D、肠腔 E、以上都不是

15. 诊断慢性血吸虫病的病原学方法最好的是：（A ）

A.尼龙筛集卵法加毛蚴孵化法 B.饱和盐水浮聚法 C.生理盐水直接涂片法

D.自然沉淀法 E.肛门试子法

16. 人兽共患寄生虫可使家畜或野生动物受感染，在流行病学上，这些动物是该人体寄生虫的（ D ）

A、终宿主 B、中间宿主 C、转续宿主 D、储蓄宿主 E.以上都不是

17. 寄生原虫的胞膜具有重要的生理功能，其中最主要的是（ E ）

A、使虫体保持一定形状 B、保护虫体 C、吸收营养

D、排泄废物 E、保持虫体的自身稳定并参与宿主的相互作用

18. 在我国感染率最高的人体寄生虫是（ E ）

A、疟原虫 B、血吸虫 C、钩虫 D、丝虫 E、蛔虫

19. 华支睾吸虫对人体的主要危害是（ D ）

A、十二指肠发生溃疡 B、胰腺发生炎症 C、引起贫血

D、胆管及肝脏受累 E 腹壁发生肿块

20. 成虫和幼虫均可寄生在人体的寄生虫是：（ A ）

A.猪带绦虫和旋毛虫 B.钩虫和蛲虫 C.猪带绦虫和蛲虫 D.牛带绦虫和蛲虫 E.丝虫和布氏姜片虫

大学医学考试

大学答案帮手

（二）多选题

21. 能引起皮下结节或包块的寄生虫有:（ BC ）

A. 血吸虫　　B. 猪囊虫　　C. 曼氏裂头蚴　　D. 旋毛虫

22. 肺吸虫病诊断的重要依据有:（ ACD ）

A. 血中嗜酸性粒细胞增高　　B. 血中白细胞总数降低

C. 生吃溪蟹史　　D. 游走性皮下包块

23. 可通过接触感染的寄生虫有（ ABD ）

A. 阴道毛滴虫　　B. 疥螨　　C. 疟原虫　　D. 蠕形螨

24. 常用肛门拭子法进行诊断的寄生虫病包括:（ ACD ）

A. 蛲虫病　　B. 猪囊虫病　　C. 猪带绦虫病　　D. 牛带绦虫病

25. 属于肠道线虫的有:（ AD ）

A. 钩虫　　B. 丝虫　　C. 布氏姜片虫　　D. 鞭虫

得 分	
评卷人	

五、问答题(本题 20 分，每小题 10 分，检验专业：1 题 7 分，2 题 6 分，3 题 7 分)（检验专业答 1，2，3 题，其它专业答 1，2 题）

1. 根据日本血吸虫的流行环节提出它的防治原则。

(1)查：1 分，解释 1 分；（2）治：1 分，解释 1 分；　（3）灭：1 分，解释 1 分；（4）管：1 分，解释 1 分；（5）防：1 分，解释 1 分。检验每点 0.7 分

2. 钩虫病引起人体贫血的机理是什么？

1. 吸血 2 分；　2. 边吸边排 1 分；　3. 更换咬附部位 1 分；　4. 释放抗凝血酶 1 分；5. 渗血 2 分；6. 缺铁性贫血 2 分；7. 偶尔肠段大出血 1 分。

检验系每点 1. 分，答对其中 6 点即给全分。

3. 人体寄生虫常用的粪检方法有哪些?各适用于哪些寄生虫感染的诊断?

生理盐水直接图片法 0.5 分，诊断 0.5 分

饱和盐水浮聚法 0.5 分，诊断 0.5 分

沉淀法 0.5 分，诊断 0.5 分

肛门拭子法 0.5 分，诊断 0.5 分

透明胶纸法 0.5 分，诊断 0.5 分

尼龙绢筛集卵法 0.5 分，诊断 0.5 分

改良加藤法 0.5 分，诊断 0.5 分

大学答案帮手