中南大学考试试卷、参考答案及评分细则

2011-2012 学年 下 学期医学寄生虫学课程 时间 60 分钟

2010 级临床医学、口腔、麻醉、检验、预防、精卫专业；2009 级口腔七年制

2 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 % 2012 年 5 月 25 日

题 号	一	二	三	四	五	合 计
满 分	20	20	25	10	25	100
得 分						
评卷人						
复查人						

得 分	
评卷人	

一、名词解释并举例说明(每小题 4 分，共 20 分)

1. 间接发育型生活史：有些寄生虫完成生活史需要在中间宿主（1 分）或吸血昆虫（1 分）体内发育至感染阶段后（1 分）才能感染人体，如（1 分）血吸虫、旋毛虫和丝虫等蠕虫的生活史。

2. 中间宿主：寄生虫的幼虫或无性生殖（3 分）阶段寄生的宿主称为中间宿主。举例（1 分）如血吸虫寄生于钉螺。

3. 幼虫移行症：是指一些寄生虫蠕虫幼虫（1 分）侵入非正常宿主（人或动物）后，不能发育为成虫（1 分），这些幼虫在体内长期移行造成局部或全身性的病变（1 分）。如（1 分）斯氏狸殖吸虫寄生于人体引起的皮下游走性结节。

4. 蝇蛆病：是由蝇的幼虫-蛆（1 分）的直接寄生对人和脊椎动物的侵害（1 分）。如（2 分）蝇蛆在人体所引起的眼、皮肤、胃肠道、耳鼻咽和口腔、泌尿生殖道、创伤口等处所引起的蝇蛆病。

5.何博礼现象（Hoeppli phenomenon）：日本血吸虫产卵量大，在宿主体内多成簇聚集（1 分），肉芽肿的急性期易液化而出现嗜酸性脓肿（1 分），虫卵周围出现许多浆细胞（1 分）伴以抗原-抗体复合物沉者（1 分），称为何博礼现象。

得 分	
评卷人	

二、填空：（每空 1 分，共 20 分）

---○---○---

学 院
专业班级
学 号
姓 名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

大学教务部

2. 寄生虫对宿主的损害主要有：掠夺营养；机械性损伤；毒性反应；免疫病理。

3.与溶组织内阿米巴滋养体侵入肠黏膜的机制相关的 3 种因子是：半乳糖/乙酰氨基半乳糖凝集素；阿米巴穿孔素；半胱氨酸蛋白酶。

4. 根据疟原虫在人体的生活史，疟疾疫苗分为 4 种，分别是：子孢子疫苗、肝期疫苗、无性血液期疫苗和有性期疫苗。

5. 蚊传播的疾病主要有：_黑热病_；_疟疾_；_乙脑_和登革热。

6. 寄生虫病流行的因素主要有：_自然因素_；_环境因素_；_社会因素_。

得 分	
评卷人	

三、选择题（1-15 题为单项选择题，16-25 题至少有一个正确答案，所有答案必须填在下面的答题格内，填在别处不计分）：（每小题 1 分，共 25 分）

（一）单选题：

1 、幼虫期可侵犯人体肺脏的寄生虫有：（ B ）

A、钩虫、蛔虫、姜片虫和丝虫

B、蛔虫、钩虫、血吸虫和肺吸虫

C、蛔虫、钩虫、肺吸虫和肝吸虫

D、猪带绦虫、蛲虫、旋毛虫和姜片虫

E、血吸虫、丝虫、鞭虫和钩虫

2. 对可疑的急性阿米巴痢疾病人作粪便检查时，首选方法是：（ C ）

A、自然沉淀法

B、硫酸锌浮集法

C、生理盐水直接涂片法

D、汞醛浓集法

E、饱和盐水浮聚法

3. 有关肺吸虫的形态特征，下列哪一条是错误的：（ D ）

A、成虫呈半粒黄豆大小，腹面扁平，背面隆起

B、睾丸七个，成串排列

C、睾丸分枝，左右对称

D、卵巢分叶并与子宫并列

E、虫卵中等偏大，椭圆形，卵盖大，卵壳厚薄不均

4. 关于人疥螨哪一项是错误的：（ E ）

A、寄生于人体皮肤表皮层内

大学答案帮手

B、多寄生于人体的薄嫩皮肤
C、疥疮的症状在夜间加剧
D. 其生活史有卵、幼虫、两期若虫和成虫
E、许多哺乳动物体上的疥螨经常感染人
5、关于宿主,下列哪一项是错误的：（ D ）
A、鲤科鱼是肝吸虫的第二中间宿主
B、人既是猪带绦虫的终宿主又是猪带绦虫的中间宿主
C、人既是旋毛虫的中间宿主也是终宿主
D、人是疟原虫的终宿主
E、牛是血吸虫的保虫宿主

6、关于寄生虫下列哪一项是正确的：（ C ）
A、寄生环境条件适宜时,寄生虫生存时间长,繁殖慢
B、寄生生活的历史愈短,适应能力愈强,依赖性愈大
C、组织内或血液内寄生虫的致病作用比腔道内寄生虫的要强
D、寄生原虫为单细胞动物,其生殖方式仅为无性生殖
E、带虫免疫是一种消除性免疫

7、血吸虫病人可能对血吸虫产生：（C）
A.完全免疫　　B.带虫免疫　　C.伴随免疫　　D.终身免疫　　E.以上都不是

8、人体感染旋毛虫的方式是：（ C ）
A、生食或半生食疏菜
B、生食或半生食淡水鱼
C、生食或半生食猪肉、野猪肉
D、生食或半生食溪蟹
E、生食水生植物

9、在肝吸虫病的诊断方法中检出率最高的是：（ B ）
A、大便直接涂片法
B、十二指肠液引流检查法
C、饱和盐水浮聚法
D、自然沉淀法
E、厚血膜消化法

10、人感染曼氏迭宫绦虫裂头蚴是由于：（ E ）
A、生食或半生食牛肉
B、生食或半生食猪肉
C、生食或半生食溪蟹
D、生食或半生淡水鱼

大学答案帮手

E、用生蛙肉敷贴伤口或眼

11、关于寄生虫的致病，下列哪项是正确的：（T）
A、血吸虫的主要致病阶段是成虫
B、疟疾的发作与红外期裂体增殖时间一致
C、弓形虫的致病主要是由虫株的毒力决定，与宿主的免疫力关系不大
D、班氏丝虫多侵犯上、下肢浅表淋巴系统
E、棘阿米巴可致原发性阿米巴脑炎

12、钩虫对人体的危害主要是：（D）
A、钩蚴性肺炎
B、消化道功能紊乱
C、消瘦
D、贫血
E、“异嗜症”

13、丝虫不能引起下列哪种症状：（ D ）
A、上下肢橡皮肿　　B. 乳糜尿　　C. 发热　　D. “异嗜症”　　E. 淋巴管炎、淋巴结炎

14、血吸虫病的肝肠病变的主要原因是：（C）
A、成虫的毒素及其代谢产物的刺激
B、虫卵阻塞小血管
C、虫卵肉芽肿的形成
D、童虫和成虫的共同作用
E、死亡虫体阻塞血管后，引起周围组织发生慢性炎症致组织坏死

15、医学节肢动物中对人的危害最重要的是：（C）
A. 寄生　　B. 吸血　　C. 传病　　D. 搔扰　　E. 毒害

（二）多选题：
1. 尿液检查可找到病原体的寄生虫病有：（BD）
A. 钩虫病　　B. 丝虫病　　C. 血吸虫病　　D. 阴道滴虫

2. 能引起皮下结节或包块的寄生虫有：（BD）
A. 血吸虫　　B. 猪囊虫　　C. 曼氏血吸虫　　D. 旋毛虫

3. 生食或半生食肉类可感染：（ABC）
A. 猪带绦虫　　B. 旋毛虫　　C. 猪囊虫　　D. 钩虫

4. 下列哪些寄生虫可致皮炎：（AC）

大学答案帮手

A. 血吸虫　　B. 肺吸虫　　C. 钩虫　　D. 猪带绦虫

5. 肺吸虫病诊断的重要依据包括：（ACD）

A. 血中嗜酸性粒细胞增高　　B. 血中 WBC 降低　　C. 生吃溪蟹史　　D. 游走性皮下包块

6. 人与人之间相互接触可传播的寄生虫有：（BCD）

A. 钩虫　　B. 阴道毛滴虫　　C. 耻阴虱　　D, 疥螨

7. 能引起人拉痢疾样大便的寄生虫病有：（BCD）

A. 血吸虫病　　B. 蓝氏贾第鞭毛虫病　　C. 结肠小袋纤毛虫病　　D. 肠阿米巴病

8. 疟疾的贫血与下列哪些因素有关：（ABD）

A. 脾亢与疟原虫直接破坏红细胞　　B. 免疫病理的作用

C. 发热使红细胞衰老加快　　D. 红细胞生成障碍

9. 下列哪些寄生虫可引起患者常出现淋巴结肿大：（BCD）

A. 肺吸虫　　B. 弓形虫　　C. 丝虫　　D. 利什曼原虫

得　分	
评卷人	

四、是非题：（每小题 1 分，共 10 分）

1. 间日疟原虫，恶性疟原虫，三日疟原虫和卵形疟原虫的子孢子在遗传上都有速发型和迟发型两种类型（　F　）。

2. 溶组织内阿米巴损害人体最常见的部位是肝脏，其次是肠壁和肺（　F　）。

3. 经输血有可能感染丝虫病、钩虫病、疟原虫、弓形虫病（　F　）。

4. 阴道毛滴虫的传播主要是由包囊的直接传播造成的（　F　）。

5. 肝吸虫卵必须入水在水中孵出毛蚴后才能钻入适宜的第一中间宿主（　F　）。

6. 寄生虫病具有地方性和季节性的特点，其原因完全是由自然因素所决定的（ F ）。

7. 蛔虫的幼虫在人体内移行时需经过肺脏，所以能引起肺部损害（　T　）。

8. 人由于误食猪带绦虫卵和牛带绦虫卵而患猪带绦虫病和牛带绦虫病（　F　）。

9. 我国血吸虫病的流行区分为湖沼型、平原水网型和山区丘陵型，其中湖南的流行区主要属于平原水网型。（ F　）

大学资料库

10. 蛲虫的主要感染方式是肛门—手—口途径，发病率城市高于农村。（ T ）

得 分	
评卷人	

五、问答题：（共 25 分）

1. 寄生在人体消化道的寄生虫主要有哪些？它们引起的疾病分别是什么？（原虫，线虫，吸虫，绦虫及昆虫至少各列出 1 种） （10 分）

答：溶组织内阿米巴，引起阿米巴痢疾（2 分）；蛔虫，引起蛔虫病（2 分）；布氏姜片吸虫，引起姜片虫病（2 分）；肥胖带绦虫，引起牛带绦虫病（2 分）；蝇幼虫-蛆，引起胃肠道蝇蛆病（2 分）。

2. 在寄生虫病的病原学诊断方法中，涉及粪便检查的方法有哪些，试举例说明（任意答对 4 个即给满分）。（8 分）

答：（1）直接涂片法：可用于检查蠕虫卵、原虫的包囊和滋养体等，如生理盐水直接涂片法可用于检查蠕虫卵和滋养体，碘液染色法可用于检测包囊，金胺-酚染色可用于检测隐孢子虫卵囊；

（2）厚涂片法（改良加藤法）：可用于检测血吸虫；

（3）浓缩法：如沉淀法可用于检查比重大的原虫包囊和蠕虫卵，浮聚法可用于检查比重较轻的钩虫卵；

（4）毛蚴孵化法：可用于检查血吸虫；

（5）肛门试子法或透明胶纸法：可用于检查蛲虫卵；

（6）钩蚴培养法：可用于检查钩虫。

3. 什么是疟疾的复发与再燃，它们的机理分别是什么？（7 分）

答：疟疾的复发：指疟疾初发后，患者红内期疟原虫被完全消灭（1 分），在未经蚊媒传播的情况下（1 分），红外期疟原虫进入血液大量繁殖所引起的疟疾发作（1 分）。其机理估计是患者肝细胞内的休眠子进入红细胞繁殖引起的疟疾发作（1 分）。

再燃：疟疾初发停止后，在无再感染的情况下（1 分），由于体内未被完全消灭的少量残存红内期疟原虫重新大量繁殖又引起的疟疾发作的现象（1 分）。四种疟原虫均有再燃，恶性疟和三日疟无复发（1 分）。