评卷密封线 ……… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……… 评卷密封线

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

中南大学考试试卷

2012-2013 学年 上 学期医学寄生虫学课程　时间 70 分钟

2009 级 医学八年制　时间 70 分钟

2 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %　2012 年 11 月 27 日

题　号	一	二	三	四	五	合　计
满　分	20	20	25	10	25	100
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、名词解释并举例说明(每小题 4 分，共 20 分)

1、 Reservoir host:保虫宿主 1 分。有些寄生虫是人兽共患寄生虫，除可寄生于人体外，还可寄生于其它脊椎动物 1 分，并在一定条件下可传播给人 1 分，在流行病学上称这些动物为保虫宿主。举例 1 分。

2、 Relapse:复发 1 分。疟疾初发后，红内期原虫因人体免疫力或抗疟药物的作用而被彻底清除 1 分，但由于肝细胞中的休眠子在某种因素下结束休眠状态而开始裂体增殖，产生大量的裂殖子释放入血，引起疟疾发作，称为复发 1 分。举例 1 分。

3、Opportunistic protozoa:机会致病原虫 1 分。有些寄生原虫在宿主免疫力正常的时候处于阴性感染状态 1 分，但当宿主免疫力低下时可出现异常增殖且致病力增强，称为机会致病原虫 1 分。举例 1 分。

4、 Immune evasion:免疫逃避 1 分。在寄生虫与宿主的相互适应过程中 1 分，有些寄生虫能逃避宿主的免疫效应 1 分，这种现象称为免疫逃避 1 分。举例 1 分。

5、Complete metamorphosis:全变态 1 分。发育过程中经历蛹期阶段称为全变态 2 分。举例 1 分。

得 分	
评卷人	

二、填空：（每空 1 分，共 20 分）

1. 寄生虫对宿主的作用包括 夺取营养 、机械性损伤 、 毒素作用、 免疫病理 。

2. 人体寄生虫中，排出人体的阶段即为感染阶段的虫种有 阴道滴虫 、 蛲虫、 带绦虫 、 鞭虫 及 溶组织内阿米巴 。

3.寄生虫免疫逃避的机制主要有： 分子模拟和伪装 、 抗原变异、 免疫抑制 、 组织学隔离 。

4. 蚊传播的疾病主要有：疟疾、丝虫病、流行性乙脑和登革热 等。

5. 原虫的运动细胞器按性状分，有三种 鞭毛、 纤毛 、 伪足 。

得 分	
评卷人	

三、选择题（1-15 题为单项选择题，16-25 题至少有一个正确答案，所有答案必须填在下面的答题格内，填在别处不计分）:（每小题 1 分，共 25 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
答案	B	D	E	A	D	E	B	C	D	C	C	C	E
题号	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
答案	D	C	BC	BCD	BCD	AC	ACD	B	CD	ACD	ABCD	ACD	

（一）单选题：

1、能在人体内寄生的医学昆虫有：

A. Mosquito　B. Fly　C. Bedbug　D. Louse　E. Cockroach

2、细胞内寄生的寄生虫是：

A. *Filaria*　B. *Paragonimus*　C. *Schistosome*　D. *Trichinella*　E. *Entamoeba histolytica*

3、蚊媒传播疟原虫,其感染人体的阶段是：

A. zygote　B. schizont　C. trophozoite　D. gametocyte　E. sporozoite

4、血吸虫的主要致病阶段是：

A. cercaria　B. cysticercus　C.schistosomula　D. adult　E. egg

5、对中间宿主选择极不严格的寄生虫是：

A. *Taenia saginata*　B. *Leishmania*　C. *Plasmodium*　D. *Toxoplasmagondii*　E. *Filaria*

6. 下列哪一种寄生虫是人兽共患寄生虫：

A、*Trichomonas vaginalis*　B、Tapeworm　C、*Plasmodium vivax*　D、*Ascaris lumbricoides*

E、*Trichinella spiralis*

7. 虫卵在第一中间宿主消化道内孵出毛蚴的是：

A. *Fasciolopsis buski*　B. *Clonorchis sinensis*　C. *Paragonimus westermani*

大学资料帮

D. *Pagumogonimus skrjabini*　　E. *Schistosoma japonicum*

8. 钩虫的感染阶段是：

A、Egg　B、Rhabditiform larva　C、Filariform larva　D、Microfilaria　E、Cercaria

9. 下列哪种寄生虫属于土源性蠕虫：

A. Filariae　B. *Taenia solium*　C.*Schistosoma japonicum*

D.Pinworm　E. *Fasciolopsis buski*

10. 医学节肢动物中对人的危害最重要的是：

A.parasite　B. suck blood　C. spread disease　D. scratch interference　E.poison

11. 人体感染旋毛虫的方式是：

A.生食或半生食疏菜　B.生食或半生食淡水鱼　C.生食或半生食猪肉,野猪肉

D.生食或半生食溪蟹　E.生食水生植物

12. 对病原学诊断方法的选择上，哪项是正确的：

A、钩虫病用自然沉淀法集卵　B、蛲虫病用生理盐水涂片法

C、血吸虫病用尼龙绢网集卵加毛蚴孵化法　D、姜片虫卵用饱和盐水集卵法

E、牛带绦虫病用六钩蚴孵化法

13. 关于寄生虫的致病,下列哪项是正确的：

A.血吸虫的主要致病阶段是成虫　B.疟疾的发作与红外期裂体增殖时间一致

C.黑热病是由杜氏利什曼原虫的前鞭毛体所致　D.班氏丝虫多侵犯上下肢浅表淋巴系统

E.自由生活的耐格里属阿米巴可致原发性阿米巴脑炎

14. 中华按蚊的形态,下列哪一条是错误的：

A.体分头、胸、腹,一双窄长翅,三对细长足,一根尖长喙

B.停息时体与喙成一直线,与停落面成一角度 C.翅脉上有黑白斑

D.触须上有三个白环　E.中胸盾片有 5 条浅色条纹

15. 日本血吸虫雌虫产虫卵于：

A、肠壁　B、肝内小静脉　C、肠系膜小静脉末梢　D、肠腔　E、以上都不是

（二）多选题：

1.下列哪些属于组织与血液寄生虫：

A.蛔虫　B.丝虫　C.旋毛虫　D.鞭虫

2. 下列哪些寄生虫在经治疗的病人粪便中可肉眼见到：

A.蝇蛆　B.蛲虫　C.姜片虫　D.钩虫

3. 人与人之间相互接触可传播的寄生虫有：

A.钩虫　B.阴道毛滴虫　C.阴虱　D.疥螨

4. 下列哪些寄生虫可致皮炎：

A.血吸虫　B.肺吸虫　C.钩虫　D.猪带绦虫

5. 肺吸虫病诊断的重要依据：

A.血相：嗜酸性粒细胞增高　B.血相：WBC 降低　C.生吃溪蟹史　D.游走性皮下包块

6. 寄生虫的感染阶段是指寄生虫的：

A、感染终宿主的阶段　B、感染人体的阶段　C、感染中间宿主的阶段

D、感染储蓄宿主的阶段

7. 能引起痢疾样大便的寄生虫病有：

A.血吸虫病　　B.蓝氏贾第鞭毛虫病　　C.结肠小袋纤毛虫病　　D.肠阿米巴病

8. 可寄生于人体组织内并引起疾病的螨类有：

A、疥螨　　B、革螨　　C、毛囊蠕形螨　　D、恙螨

9. 造成脑部损害的寄生虫是：

A.血吸虫　　B.猪带绦虫　　C.疟原虫　　D.肺吸虫

10. 输血可引起感染的原虫有：

A. 恶性疟原虫　B、杜氏利什曼原虫　　C、弓形虫　D、溶组织内阿米巴

得 分	
评卷人	

四、是非题：（每小题 1 分，共 10 分）

1. 人只能是人体寄生虫的终宿主。（ F ）
2. 溶组织内阿米巴损害人体最常见的部位是肝脏，其次是肠壁和肺。（ F ）
3. 阴道毛滴虫的传播主要是由包囊的直接传播造成的（ F ）。
4. 姜片虫没有第二中间宿主，其囊蚴是在水生植物上形成的。（ T ）
5. 杜氏利什曼原虫可以犬、狼、狐等动物作为保虫宿主。（ T ）
6. 丝虫感染是经蚊子传播的，但经输血也会使人感染丝虫。（ F ）
7. 人是斯氏狸殖吸虫的适宜宿主，因此在病人的痰和粪便中均很容易查到虫卵。（ F ）
8. 带虫者虽无明显的临床症状和体征，但可传播病原体，常为寄生虫病重要的传染源。（ T ）
9. 复殖目吸虫的生活史过程均有世代交替现象。（ T ）
10. 原虫为单细胞原核生物（ F ）。

得 分	
评卷人	

五、问答题：（共 25 分）

1. Please describe the formation、progress and outcome of the egg granuloma of schistosomiasis japonicum, and analyse its advantages and disadvantages. （15 分）

虫卵肉芽肿的形成 3 分：虫卵中的成熟毛蚴---SEA-----巨噬细胞吞噬-----呈递给 Th---分泌 IL-1----分泌大量的淋巴细胞因子---吸引巨噬细胞，嗜酸性粒细胞，成纤维细胞，中性粒细胞等聚集，形成以虫卵为中心的肉芽肿。

发展 3 分：急性期（嗜酸性脓肿）----过渡期（何博礼现象）----慢性期---瘢痕期

结局 3 分：虫卵肉芽肿及其纤维化在血管内形成，堵塞血管，损害血管周围组织---干线型纤维化—干线型肝硬化。

有利之处 3 分：通过肉芽肿形成，将虫卵破坏清除，并隔离和清除了虫卵释放的 SEA，减少其进入血液循环，从而减少抗原抗体复合物的全身损害。

不利之处 3 分：虫卵肉芽肿破坏宿主正常的组织，虫卵肉芽肿纤维化后形成相互连接的瘢痕，导致干线型的肝硬化。

2. What parasitisms would you predict when you meet a fever patient and what diagnoses will you consider.

(please list at least 5 possible parasites infected) （10 分）

（各举 5 例，每例 2 分，其中名称及诊断方法各 1 分）。

疟疾　　：血片---红内期

日本血吸虫病：粪便—虫卵---尼龙绢筛集卵法，毛蚴孵化法

旋毛虫病：肌肉活检

痢疾阿米巴：粪检：包囊或者滋养体

丝虫：外周血涂片查微丝蚴。

广州管园线虫

福氏耐格里阿米巴—原发性阿米巴脑炎

棘阿米巴结膜炎

大学答案帮手