---○---○---

学　　院
口腔医学院
专业班级
口腔医学专业 2001 级 7 年制
学　　号
姓　　名
A 卷 考试时间 2006/01/10

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

中南大学考试试卷 时间 110 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计
得　分											
评卷人											
复查人											

2006 ~ 2007 学年第一学期 2002 级 5 年制《口腔正畸学》课程期末考试试题 34 学时，　学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 80%

得　分	
评卷人	

一、名词解释(本题 20 分，每小题 4 分)

1. 个别正常𬌗：

2. 支抗

3. Class II malocclusion

4. Orthopedic force:

5. Deep overbite:

得　分	
评卷人	

二、填空题(本题 20 分，每空 1 分)

1. 颅底的生长发育主要由_____、_____、进行。

大学答案帮手

2．SNA 角代表_____的位置关系。

3．某患者为恒牙合，其右侧磨牙关系为完全远中，左侧磨牙关系为中性，上颌前牙舌倾斜，前牙深覆盖、覆牙合，5mm，上下牙列拥挤 II 度。该患者的 Angle 分类为_____

4 牙齿的移动类型包括_____、_____、_____、和_____。

5. 按照牙齿移动的方式，可以将固定矫治技术分为两大类，一类是_____技术，其代表是_____和_____技术，另一类是_____技术，其代表是_____和_____技术

6．错牙合畸形的矫治目标是是_____、_____、_____。

得 分	
评卷人	

三、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1．全颅底平面是：（ D ）

A. Bolton 点与鼻根点的连线　　B. 耳点与眶点的连线

C. 蝶鞍点与鼻根点的连线　　D. 颅底点与鼻根点的连线

E. 基准平面

2．中国人恒牙初期错牙合畸形的发病率（中华医学会 2000 年调查结果）是：（ ）

A. 48.66%　　B. 51.85%

C. 71.24%　　D. 72.92%　　E. 94.25%

3．引起颜面不对称畸形的原因有：（ ）

A. 单侧多数后牙反牙合　　B. 双侧多数后牙反牙合

C. 前牙反牙合　　D. 单侧个别后牙反牙合

4．前牙反牙合，一侧磨牙为中性，另一侧为中性偏近中，其错牙合分类为：（ A ）

A. 安 IIIs，毛氏 II3　　B. 安 III，毛氏 II1

C. 安 I，毛氏 II3　　D. 安 I，毛氏 III1

5．下颌恒牙的一般萌出顺序是（ ）

A. 6123457　　B. 6125437　　C. 6123547

D. 6124375　　E. 6123475

6．下列关于下颌骨宽度的增长，正确的是：（ ）

A. 下颌骨的外侧面吸收陈骨，内侧面增生新骨。

B. 髁突随颞凹向侧方生长，可使下颌支宽度增加。

C. 下颌骨前部在乳牙萌出后，宽度增加较多。

D. 下颌尖牙间宽度在 11 岁以后还会增加。

E. 以上均不正确。

大学资料帮手

7．上颌乳尖牙的近中和远中出现间隙称为：（　　）

A．生长间隙　　B．灵长间隙

C．替牙间隙　　D．可用间隙

E．离位余隙

8．上下前牙的覆盖关系分为三度，Ⅱ度深覆盖为：（　　）

A．1-3mm　　B．3-5mm

C．5-8mm　　D．8-10mm

9．以下哪点不属于颅部标志点：（　　）

A．P 点　　B．N 点

C．Or 点　　D．Bo 点　　E．Ba 点

10．唇裂是因一侧或双侧的（　　）

A．侧鼻突与上颌突未融合　　B．球状突和上颌突未融合

C．上颌突和下颌突未融合　　D．侧腭突与前腭突未融合

11．出生时钙化的软骨结合为（　　）

A．蝶筛软骨结合　　B．蝶颞软骨结合

C．蝶骨间软骨结合　　D．筛颞软骨结合

E．蝶枕软骨结合

12．为调整牙弓上牙齿的近远中倾斜度，标准方丝弓矫治器采用：（　　）

A．在托槽上预置轴倾角（tip）　　B．改变托槽底的厚度

C．在弓丝上弯制第一序列弯曲　　D．在弓丝上弯制第二序列弯曲

E．在弓丝上弯制第三序列弯曲

13．由婴儿到成人，腭顶高度逐渐增加的原因是：（　　）

A．腭盖的表面增生新骨及鼻腔底面吸收陈骨　　B．腭盖的表面吸收陈骨及鼻腔底面增生新骨

C．牙槽突的生长速度小于腭盖升高速度　　D．牙槽突的生长速度大于腭盖降低速度

E．以上均不正确

14．上下第一恒磨牙的咬合关系可分为中性关系、近中关系和远中关系，下列哪一项描述为完全近中关系：

A．上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合时与下颌第一恒磨牙的远中颊尖相对。

B．上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合于下颌第一、二恒磨牙之间。

C．上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合时与下颌第一恒磨牙的近中颊尖相对。

D．上颌第一恒磨牙的远中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙的近中颊沟。

15．以下哪种情况应当立即处理（　　）

A. 4 岁小孩前牙间隙　　B. 13 岁小孩上中切牙间有 3mm 间隙

C. 10 岁小孩上前牙轻度拥挤　　D. 6 岁小孩轻度远中牙合　　关系

E. 8 岁小孩前牙深覆牙合

16．　X 线头影测量可做如下分析，除了

大学口腔考试

（A）颅面部生长发育　　（B）双侧髁突对称性
（C）牙、牙合　　、面畸形的机制分析　　（D）外科正畸的诊断和分析
（E）矫治前后牙牙合　　、颅面结构变化

17．面颌肌肉的动力平衡中，与向后的动力有关的主要肌肉有：
（A）颞肌　　（B）翼外肌
（C）翼内肌　　（D）咬肌
（E）唇肌

18．正畸牙移动过程中是牙槽骨吸收，牙骨质却不吸收或少量吸收是因为：（　　）
牙骨质矿化程度高
牙槽骨矿化程度高
牙槽骨内含有的细胞成分多
牙骨质内含有的细胞成分多
牙骨质表面一层为未矿化的类牙骨质

19．面部生长发育完成的顺序为：
（A）宽度、高度、深度　　（B）高度、宽度、深度
（C）宽度、深度、高度　　（D）深度、宽度、高度
（E）高度、深度、宽度

20．毛氏 II3 意味着：
（A）.磨牙中性、前牙深覆盖　　（B）.磨牙远中、前牙深覆盖
（C）.磨牙近中、前牙反牙合　　（D）.磨牙中性、前牙反牙合
（E）.磨牙中性，前牙开牙合

得　分	
评卷人	

四、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1．简述牙列拥挤的治疗原则。（5 分）

2．混合牙列期暂时性错牙合有哪些表现？5 分

3．　简述正畸矫治过程中牙周膜的组织反应。5 分

五、问答题（每题 10 分，共 25 分）

1．试述决定拔牙方案时，应全面考虑哪些因素，以及这些因素对拔牙可能性大小的影响。（10）

2．病例分析（15 分）

大学资料帮手

某患者，男，13 岁。主诉为牙齿排列不齐，上颌前牙前突。临床检查：口腔卫生差。正面观：开唇露齿，上唇前突，侧面为凸面型，双侧磨牙关系为远中尖对尖关系，前牙覆牙合 6mm，覆盖 8mm，上下牙列分别拥挤 6mm 和 8mm。

请根据以上临床资料，试回答以下问题：

1、 该患者的安氏和毛氏分类诊断；

2、 提出该患者的矫治目标；

3、 请为该患者制定矫治计划。

牙医俱乐部

大学答案帮手

中南大学考试试卷 时间 110 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

2006~2007 学年第一学期 2002 级 5 年制《口腔正畸学》课程期末考试

试题 34 学时，1.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 80%

得　分	
评卷人	

一、名词解释(本题 20 分，每小题 4 分)

1. Ideal normal occlusion

答：个别正常牙合，凡轻微错牙合（1 分）对生理过程无大妨碍者，（1 分）都可列入正常牙合，（1 分）这种正常范围的个体牙合彼此之间又有所不同，（1 分）故称个别正常牙合。

2. 阻断性矫治

答：对于正在形成或刚产生的错牙合畸形，用简单的矫治方法阻断畸形的发展，使用权其自行调整成为正常牙合或用矫治的方法促进其正常生长而成为正常牙合。

3. Deep overjet

答：深覆牙合，（1 分）上前牙覆盖下前牙唇面超过切 1/3（1 分）或下前牙（1 分）切缘咬在左上前牙舌面切 1/3 以上者，可分三度：（1 分）Ⅰ°：1/3～1/2；Ⅱ°：1/2～2/3；Ⅲ°：>2/3

4. Leeway space

5. 拥挤度

得　分	
评卷人	

二、填空题(本题 20 分，每空 1 分)

1. 临床上固定矫治器一般间隔 4-6 周加力一次为宜，活动矫治器一般间隔 2-3 周加力一次。

2. 支抗的种类：颌内支抗、颌间支抗、颌外支抗。

---○---○---

学　院
口腔医学院
专业班级
口腔医学专业 2001 级 7 年制
学　号
姓　名
B 卷 考试时间 2006/01/10

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

大学试卷 中南

3．在恒牙萌出后，面部在三维方向的生长发育以_____高低_____增加为最大，其次

是_____长度_____，_____宽度_____增加最少。

4．颅面骨骼的生长发育方式有_骨的长面性质__、骨缝间质__、_软骨间质及长面性质。

5．面部长度与高度的增长有重要影响的 4 条骨缝为_____额颌缝__、__颧颌缝____、

__颧颞缝_____、_____翼腭 缝_____。

6．临床上合适矫治力的表征有：__牙位及颌位变化明显__、__牙齿无明显松 动_____、

__叩诊矫治牙无明显反应、__无明显自沉疼痛__、_X 线牙根及牙周无明显病理变化__。

得 分	
评卷人	

三、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1．　下列哪一项决定牙移动的方式：（　D　）

（A）力　　（B）力偶矩　　（C）力偶矩＋力

（D）力偶矩/力　　（E）力偶矩 X 力

2．　全颅底长为：（　B　）

（A）N-Ar　　（B） S-Ba　　（C）N-Bolton

（D）N-P　　（E）N-Ba

3．　X 线头影测量不能做以下哪项分析：（　B　）

（A）颅面部生长发育　　（B）双侧髁突对称性

（C）牙、牙合、面畸形的机制分析　　（D）外科正畸的诊断和分析

（E）矫治前后牙牙合、颅面结构变化

4．功能矫治器最常用于：（　D　）

（A）任何年龄的下颌后缩（B）乳牙期反牙合

（C）恒牙期 III 类错牙合（D）替牙期近远中错牙合

（E）恒牙初期拥挤病例

5．吮指不良习惯不可能造成的错牙合是：（　D　）

（A）前牙反牙合　　（B）腭盖高拱，牙弓狭窄

（C）前牙开牙合　　（D）远中错牙合

（E）上前牙前突

6．为使牙齿在牙弓达到正常的近远中倾斜度，标准方丝弓技术采用：（　B　）

（A）在托槽上预置冠舌向角度　　（B）在弓丝上弯制第二序列弯曲

大学答案帮手

（C）改变托槽底的厚度　　（D）在弓丝上弯曲第一序列弯曲
（E）在弓丝上弯曲第三序列弯曲

7．面部生长发育完成的顺序为　（　A　）
（A）宽度、高度、深度　　（B）高度、宽度、深度
（C）宽度、深度、高度　　（D）深度、宽度、高度
（E）高度、深度、宽度

8．与建𬌗动力平衡关系不大的肌肉是：（　D　）
（A）舌肌　（B）嚼肌　（C）颊肌　（D）二腹肌　（E）翼内肌

9．以下哪点不属于颅部标志点：（　C　）
A.　P 点　　B.　N 点　　C.　Or 点
D.　Bo 点　　E.　Ba 点

10．毛氏 II^3 意味着：（　C　）
（A）.磨牙中性、前牙深覆盖　　（B）.磨牙远中、前牙深覆盖
（C）.磨牙近中、前牙反𬌗　　（D）.磨牙中性、前牙反𬌗
（E）.磨牙中性，前牙开𬌗

11．由婴儿到成人，腭顶高度逐渐增加的原因是：（　D　）
A.　腭盖的表面增生新骨及鼻腔底面吸收陈骨
B.　腭盖的表面吸收陈骨及鼻腔底面增生新骨
C.　牙槽突的生长速度小于腭盖升高速度
D.　牙槽突的生长速度大于腭盖降低速度
E.　以上均不正确

12．上下第一恒磨牙的咬合关系可分为中性关系、近中关系和远中关系，下列哪一项描述为完全近中关系（　B　）
A.　上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合时与下颌第一恒磨牙的远中颊尖相对。
B.　上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合于下颌第一、二恒磨牙之间。
C.　上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合时与下颌第一恒磨牙的近中颊尖相对。
D.　上颌第一恒磨牙的远中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙的近中颊沟。
E.　上颌第一恒磨牙的远中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙的颊沟近中。

13．中国人恒牙初期错𬌗畸形的发病率（中华医学会 2000 年调查结果）是：（　D　）
A.　48.66%　　B.　51.85%　　C.　71.24%　　D.72.92%　　E.94.25%

14．引起颜面不对称畸形的原因有（　A　）
A.　单侧多数后牙反𬌗　　B.　双侧多数后牙反𬌗
C.　前牙反𬌗　　D.　单侧个别后牙反𬌗
E.　乳牙反𬌗

15．以下哪种情况应当立即处理（　B　）
（A）4 岁小孩前牙间隙　　（B）13 岁小孩中切牙间隙 3mm 间隙

（C）10 岁小孩上前牙轻度拥挤　　（D）6 岁小孩轻度远中牙合关系
（E）8 岁小孩前牙深覆牙合

16. 前牙反牙合，一侧磨牙为中性，另一侧为中性偏近中，其错牙合分类为（ C ）
（A）安氏IIIs,毛氏Ⅱ3　　（B）安氏III,毛氏III
（C）安氏Ⅰ毛氏Ⅱ3　　（D）安氏Ⅰ毛氏III
（E）安氏III,毛氏Ⅱ3

17. 下颌恒牙的一般萌出顺序是（ A ）
A. 6123457　　B. 6125437　　C. 6123547
D. 6124375　　E. 6123475

18. 唇裂是因一侧或双侧的（ B ）
A. 侧鼻突与上颌未融合
B. 球状突和上颌突未融合
C. 上颌突和下颌突未融合
D. 侧腭突与前腭突未融合
E. 侧鼻突与侧腭突

19. 出生时钙化的软骨结合为（ C ）
（A）蝶筛软骨结合　　（B）蝶颞软骨结合
（C）蝶骨间软骨结合　　（D）筛颞软骨结合
（E）蝶枕软骨结合

20. 以下哪项不是活动矫治器的优点：（ D ）
（A）不影响美观
（B）能矫治一般常见错牙畸形
（C）构造简单易制作
（D）方便舒适，能有效控制牙齿移动，保持良好的口腔卫生
（E）能避免损伤牙体牙周组织

得 分	
评卷人	

四、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 简述方丝弓矫治器的原理和三个序列弯曲。（5 分）

答：原理 1. 被弯曲矫治弓丝的形变复位（1 分）

2. 应用保持弓丝作固定和引导（1 分）

三个序列：第一序列弯曲：水平向弯曲（1 分）

第二序列弯曲：垂直向弯曲（1 分）

本试卷答案

第三序列弯曲：转矩弯曲（1 分）

2. 简述牙列拥挤的治疗原则（5 分）

3. 简述错牙合 畸形的局部危害性。（5 分）

五、问答题（共 25 分）

1. 试述前牙反合的鉴别诊断（10）

2.病例分析（15 分）

患者， 男，13 岁，主诉为上颌前牙前突。临床检查：正面观：上下唇闭合不全，上唇向前突，开唇露齿，侧面为凸面型。磨牙为远中尖对尖关系，前牙覆牙合 6mm，覆盖 8.5mm，上牙列拥挤 4mm，下牙列拥挤 8mm。

1. 诊断。

2. 请列出矫治目标。

3）、请写出治疗计划。

大学答案帮手