中南大学考试试卷

2006--2007 学年第 2 学期　　时间 120 分钟

医学影像学　课程 44 学时　3　学分　　考试形式：闭　卷

专业年级：2004 级五年制预防专业　　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

[A1 型题]（最佳选择题，每题 1 分，共　分）　　每一道题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，在答题时只需从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

1. 关于 X 线影像形成原理的概念，以下哪条错误

A．人体组织结构的密度和厚度在影像形成中起着同样重要的作用，

B．自然对比是人体组织自然形成的密度差，

C．在缺乏自然对比的部位引入对比剂，称为人工对比；对比剂是一些密度高于人体组织密度的物质，必须符合安全、无毒和使用方便的要求。

D．人体组织按密度不同，由高至低分为，骨骼、软组织、脂肪以及人体内的气体。

E．人体软组织是中等密度的结构，包括皮肤、肌肉、内脏、软骨、淋巴液等。

2. Colle's 骨折哪一项不正确：

A．发生在桡骨远端距腕关节面 2-3cm 以内。

B．远侧段向掌侧或桡侧移位

C．断端向掌侧成角畸形，伴尺骨茎突骨折

D．可以是斜行或粉碎骨折

E．是最常见的骨折之一

3. 婴幼儿肺结核最常见的 X 线表现是：

A．肺内浸润

B．结核瘤

C．空洞和肺门淋巴结肿大

D．肺内浸润和肺门淋巴结肿大

E．散发播散灶

4. 法乐四联症的超声检查所见应包括一组复杂的心血管畸形：

A．肺动脉狭窄

B．高位室间隔缺损

C．主动脉骑跨

D．右心室肥厚

E．以上都是

5. 在急腹症病人进行腹部平片检查时，错误的是：

A．是首选影像学检查

B．站立后前位和仰卧后前位是不可缺少的

C．应在清洁洗肠后检查

D．应结合透视进行诊断

E．注意排除导致急腹症临床表现的胸部疾病

6. X 线钡餐检查发现胃溃疡，下列哪项有恶性变可能：

A．合并十二指肠球部溃疡

文档资料都来自网络

B．复发性胃溃疡
C．溃疡龛影周围小段环堤形成
D．合并出血
E．溃疡位于胃大弯
7．肾结核晚期特征性 X 线表现：
A．肾积水
B．肾盂肾盏边缘性破坏
C．肾功能减退
D．肾自截
E．小膀胱
8．“硬膜外血肿”典型形态为
A．圆形
B．梭形
C．不规则型
D．新月形
E．球形
9．超声波是如何发生的
A．换能器的逆压电效应
B．换能器的压电效应
C．换能器向人体发送电信号
D．换能器的热效应
E．换能器的磁效应
10. 诊断用超声原理主要应用超声波的
A．散射
B．吸收
C．衰减
D．Doppler 效应
E．反射
11. 声波的衰减主要由于
A. 超声探头频率低
B．扩散声束
C．组织对声能的吸收
D．Doppler 效应
E．侧声影
12．流产的声像特征包括
A．孕囊变形
B．孕囊下移至宫颈
C．随诊孕囊无增大
D．宫腔内可见无回声积血声像
E．孕囊随孕周增大而增大
13．肝内胆管结石的声像表现，正确的是（　　）
A．肝内胆管走行区域可见强回声光团伴声影，远端胆管扩张
B．常随体位改变而移动
C．.胆囊增大

大学答案帮手

D．胆总管扩张
E．常有胆道手术史
14．典型肾脏结石超声表现为（　　）
A．肾盏内长条形强回声
B．　肾盏或肾盂内点状或团状强回声伴声影，周围有少量无回声包绕
C．肾皮质内强回声光团伴声影
D．肾盏内管道状强回声
E．以上都是
15．下列哪个器官不位于腹膜后间隙内（　　）
A．胰腺
B．肾脏
C．肾上腺
D．输尿管
E．胆总管

[A2 型题]（最佳选择题，每题 1 分，共　分）　　每一道题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，在答题时只需从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。
16．**7 岁男孩，脓毒血症患者，左大腿疼痛肿胀 18 天。体查：体温 39.8 度，左大腿肿胀，局部皮温高，皮肤发红，压痛明显。X 线征象：左股骨上段有较广泛的骨质破坏，见少许层状骨膜增生，股骨周围软组织肿胀。**应诊断：
A．急性化脓性骨髓炎
B．恶性骨肿瘤
C．骨结核
D．良性骨肿瘤
E．慢性化脓性骨髓炎
17.某 18 岁男性病人，左踝关节肿胀、疼痛一年余，X 线照片显示：左踝关节间隙变窄，诸构成骨骨质疏松，骨性关节面边缘虫蚀状骨质破坏。最可能的诊断是：
A．化脓性关节炎
B．化脓性骨髓炎
C．滑膜型关节结核
D．骨型关节结核
E．风湿性关节炎
18．31 岁女性，慢性咳嗽，吐痰 10 年，经常痰中带血，胸片上右上肺可见斑片和索条状阴影，其间显示一薄壁环形透亮区，应诊断：
A．肺癌空洞。
B．肺结核空洞。
C．肺脓肿。
D．慢性支气管炎。
E．支气管扩张症。
19.47 岁女性，咳嗽咳痰胸痛半月余，痰为脓臭痰,伴畏寒发热,胸片示：右下肺野见一厚壁空洞,内见高液气平面，空洞周围为大片渗出实变灶,边缘模糊，应诊断：
A．肺癌空洞。
B．肺结核。
C．肺脓肿。

大学答案帮手

D．慢性支气管炎。
E．支气管扩张症。
20. 6 岁男孩，患先天性心脏病,无发绀,于胸骨左缘第二肋间闻及连续性双期杂音，X 线提示左房左室大,见“漏斗征”，肺充血,最可能的诊断：
A．室间隔缺损
B．肺动脉狭窄
C．动脉导管未闭
D．法乐氏四联症
E．房间隔缺损
21. 12 岁男孩，患先天性心脏病,无发绀,于胸骨左缘第二三肋间闻及收缩期杂音，X 线提示右房右室大,肺充血,最可能的诊断：
A．室间隔缺损
B．肺动脉狭窄
C．动脉导管未闭
D．法乐氏四联症
E．房间隔缺损
22. 45 岁男性，上腹痛、伴呕吐，偶有呕血及黑便。体查：上腹剑突下方有触痛。胃肠钡餐检查，胃窦部见一约 0.6× 1.0 CM 大小腔内龛影，其周见不规则环堤,邻近粘膜皱襞向龛影集中,黏膜有破坏，局部胃壁僵硬,无蠕动波。应诊断：
A．早期胃癌
B．良性胃溃疡
C．溃疡型胃癌
D．浸润型胃癌
E．蕈伞型胃癌
23. 25 岁男性，腹痛腹泻 1 年,伴乏力,消瘦。行钡剂造影发现回盲部肠管痉挛收缩,黏膜紊乱,造影剂通过病变肠管时,迅速排空至远端结肠,两端肠管充盈好,而病变肠管显影呈细线样，应考虑为：
A．肠癌
B．肠息肉
C．溃疡型肠结核
D．增殖型肠结核
E．溃疡型结肠炎
24. 32 岁男性，阵发性腹痛 1 天,伴呕吐,肛门停止排气排便。体查：腹平，有肠型，脐周压痛，无反跳痛，肠鸣音亢进。该患者应首选检查:
A．立位腹平片
B．卧位腹平片
C．B 超
D．CT 扫描
E．MRI 检查
25. 39 岁女性, 尿频尿急尿痛,偶伴血尿 3 年，腹部平片示右肾区见钙化灶，造影右肾盂肾盏及右输尿管未见显影,膀胱体积缩小。逆行造影见右肾盂肾盏不规则扩张,右输尿管僵直,呈不规则串珠状。应考虑为：
A．肾肿瘤
B．肾结核
C．肾囊肿

大学资源部

D. 肾盏憩室
E. 肾盏痉挛
26. 35 岁男性，右腰痛 1 周，并向下腹部放射，腹部平片示 L1 右侧见一约 2cm×1cm 大小高密度病灶，加照侧位片示，高密度病灶与脊柱重叠，应考虑何种疾病可能性大：
A. 胆结石
B. 肾结核
C. 肾囊肿
D. 肾结石
E. 腹腔淋巴结钙化
27. 48 岁男性肝硬化患者，钡餐示食管壁张力减低，蠕动减弱，钡剂排空延迟，并在食管下段见到串珠状充盈缺损影，应首先考虑
A. 食管癌
B. 食管下段粘膜下平滑肌瘤
C. 反流性食管炎
D. 食管裂孔疝
E. 食管下段静脉曲张
28. 31 岁男性，头部外伤 1+小时。体查：BP139/79mmHg，神志不清，昏迷，双侧瞳孔散大.CT 表现：右额、颞、顶骨颅骨内板下可见新月形高密度出血灶，CT 值 36-76HU，右侧脑室受压变窄，脑中线结构向左移位约 0.7cm。应诊断：
A. 硬膜下出血
B. 硬膜外出血
C. 脑挫裂伤
D. 蛛网膜下腔出血
E. 脑出血

29. 57 岁男性，肝炎肝硬化患者，超声发现右肝有一巨大肿块，局部突出肝脏表面，肿块内部为混杂回声，肿块周围见不完整包膜，肝门区见增大淋巴结，应考虑：
A. 肝癌
B. 肝血管瘤
C. 肝囊肿
D. 肝脓肿
E. 转移性肝癌

30. 18 岁女性，体检发现右肾上极一约 5mm×5 mm 大小圆形无回声区，边缘光滑锐利，后壁回声增强，应诊断为：
A. 肾癌
B. 肾盂癌
C. 肾结石
D. 肾囊肿
E. 肾结核

[A3 型题] （病历组最佳选择题） 下列试题，每组题都有一段共用题干病历描述，然后提出两个或三个与病历有关的问题，每个问题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，答题时，每道题答只许从五个备选答案中选一个最合适的作为正确答案。

[问题 31-33]

19 岁男性，背痛半月，X 线征象：T8T9 椎体稍变扁，T8 椎体下缘及 T9 椎体上缘见骨质破坏，T8/T9 椎

大学答案帮手

间隙变窄，局部胸椎曲度稍后突，椎旁见梭形软组织肿胀。

31. 该患者应诊断：
A. 脊柱压缩骨折
B. 脊柱结核
C. 脊柱转移瘤
D. 强直性脊柱炎
E. T8/T9 椎间盘病变
32. 关于脊椎骨折，下列哪项不正确：
A. X 线上椎体压缩变扁、呈楔改变
B. 多发生在活动度较大的胸椎下段和腰椎上段
C. 椎间隙变窄
D. 严重时常并发脊椎后突成角，侧移
E. 以单个椎体多见
33. 椎体结核 X 线表现，哪项不正确：
A. 相邻椎体骨质破坏
B. 椎间隙变窄
C. 椎旁冷脓肿形成
D. 椎体压缩呈楔形
E. 以上都不是

[问题 34-36]

一患者胸片示:心脏增大,后前位：心脏呈梨形，心腰膨隆，左心缘见病理第三弓，心底部见双房影，上肺静脉扩张（肺淤血）。侧位：心前缘与胸骨体触面增大，超过胸骨体 1/2，心前间隙变窄，食管左房压迹加深

34. 该患者胸片提示增大房室为:
A. 左心房、右心室增大,
B. 右心房、右心室增大,
C. 左心房、左心室增大,
D. 右心房、左心室增大,
E. 右心室、左心室增大,

35. 下列哪项征象提示出现间质性肺水肿:
A. 肺血管纹理增粗，模糊
B. 双上肺静脉增粗扩张
C. 胸腔积液
D. 肺内蝶翼状分布的斑片状模糊阴影
E. 间隔线 KerleyB 线

36. 该患者可能诊断为:
A. 风心病:主动脉瓣狭窄
B. 风心病:二尖瓣狭窄
C. 风心病:二尖瓣关闭不全
D. 风心病:二尖瓣狭窄并关闭不全
E. 风心病: 主动脉瓣关闭不全

大学答案帮手

[问题 37-40]

42 岁男性，反复上腹痛 3 月，伴反酸嗳气，体查：上腹部剑突下压痛，无反跳痛。

37. 上述患者应选择哪项影像检查

A. 腹平片

B. 上消化道钡餐

C. 全消化道钡餐

D. 钡灌肠造影

E. 碘水造影

38. 消化道钡餐检查前哪项准备通常是不需要的？

A. 禁食。

B. 清洁灌肠。

C. 停服各类药物三天。

D. 有幽门梗阻时须抽出胃内容物。

E. 肠梗阻和胃穿孔不能作钡餐检查，大出血期间暂缓进行。

39. 钡餐发现胃体部小弯侧见一腔外龛影，邻近胃黏膜向龛影集中，未见破坏，局部胃壁柔软，可见蠕动波通过。应诊断：

A．早期胃癌

B．良性胃溃疡

C．溃疡型胃癌

D．浸润型胃癌

E．蕈伞型胃癌

40. 该患者突然腹同痛加剧，体查：腹肌紧张，满腹压痛，反跳痛（+）。此时应首选何种检查：

A．立位腹平片

B．卧位腹平片

C．B 超

D．CT 扫描

E．MRI 检查

[B1 型题]（最佳配伍型） 每一道题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，然后提出 2-3 个问题，共用这 5 个备选答案，答题时需要为每个题选择一个最合适的作为正确答案。每个备选答案可以选择 1 次，1 次以上或 1 次也不选。

[问题 41-42]

A．骨质疏松

B．骨质软化

C．骨质破坏

D．骨质增生硬化

E．骨膜反应

41．密度减低，骨小梁变细减少，间隙增宽，骨皮质出现分层变薄现象

42．密度减低，骨皮质、骨小梁边缘模糊，骨骼变形

[问题 43-44]

A．X 线

B．USG

C．CT
D．MRI
E．肝动脉造影
43．脑外伤首选的诊断方法是
44．胃肠穿孔首选的诊断方法是
［问题 45-46］
A．肺气肿。
B．肺不张。
C．叶间积液。
D．包裹性积液。
E．中叶综合征。
45．肺容积缩小，密度增高，均匀一致，叶间裂是向心性移位，纵隔向患侧移位，肋间隙变窄，膈肌上升。
46．肺容积增大，肺野透亮度增加，呼吸气时，肺野的透亮度改变不大，肺纹理稀疏，胸廓呈桶状，肋间隙增宽膈肌位置低下。

［问题 47-48］
A．左心房、右心室增大，肺充血，
B．左心房、右心室增大，肺淤血，
C．左心房、左心室增大，肺充血，
D．左心房、左心室增大，肺淤血，
E．右心房、左心室增大，肺淤血，
47．　风心病：二尖瓣狭窄
48．风心病：二尖瓣关闭不全

［问题 49-50］
A．结核球。
B．周围型肺癌。
C．炎性假瘤。
D．肺囊肿。
E．错构瘤。
49．右肺上叶前段，病灶呈圆形、椭圆形或不整形肿块影，密度均匀，边缘呈分叶状或有脐样切迹，边缘毛糙，并有短细毛刺阴影，可形成空洞，常考虑为：
50．右肺上叶后段，病灶呈圆形，轮廓清楚光滑，内见钙化，周边有渗出、增殖及纤维条索影，应诊断为：

［名词解释］（每题 2 分，共 10 分，）
51．Osteonecrosis　(Answer in English)
52．双房影
53．支气管气相
54．人工对比
55．Filling Defect (Answer in English)

［简答题］（ 5 题，共 20 分）
56．简述左房增大的 X 线征象

57. 简述大量胸腔积液与一侧性肺不张如何区别
58. 比较骨质疏松、骨质软化
59. 如何用影像技术检查食道异物？
60. 简述良恶性骨肿瘤的 X 线鉴别要点

[综合分析题]（ 题，共 20 分）

61. 综合分析脊椎骨折、脊椎结核及脊柱转移瘤的鉴别
62. 请叙述良恶性胃溃疡的鉴别要点

大学答案帮手

2007 年第 II 学期　　专业　　课程期末考试

标准答案及评分细则

[选择题]每题 1 分，共 50 分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	E	C	C	D	B	A	E
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	B	A	B	E	A	C	B	C	C
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	E	C	C	A	B	D	E	A	A	D
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	C	E	A	E	B	B	C	B	A
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	A	B	C	A	B	A	B	D	B	A

[名词解释]（每题 2 分，共 10 分，Answer in English.）

51. Osteonecrosis occurs when metabolism of bone cells cease forever from local ischemia of bone. (1 分) The chief characteristic that is responsible for the radiographic definition of dead bone is its apparent increase in density. (1 分)

52. 双房影：增大的左心房向两侧及后方扩展，正位像上与正常右心缘构成的重叠影像。(2 分)

53. 支气管气相：肺实变时。其内含气支气管呈树枝状低密度影的现象，多见于炎性病变。(2 分)

54. 人工对比：人工导入某种物质，使原本缺乏天然对比的组织、结构间形成明显密度差，从而提高显示率的方法就是人工对比，导入的物质称为对比剂。(2 分)

55. Filling defect is caused by a space occuping mass producing defect on the barium. (2 分)

[简答题]（ 5 题，共 20 分）

56. 左房大：

1）后前位：心腰扩大，心左缘第三弓出现，向右增大形成双房影。高千伏片见左主支气管上举。(1 分)

2）左侧位：心后缘上部向后增大(0.5 分)

3）右前斜位：食管中下段向后压迫移位(最敏感征象)，仅前缘压迹为轻度增大，压迹伴后移超过胸椎前缘为重度，二者之间为中度。(2 分)

4）左前斜位：推压左主支气管，使其变窄或移位。(0.5 分)

57. 主要根据邻近组织的移位来判断，大量胸腔积液使纵隔及气管向健侧移位，(2 分)一侧性肺不张使纵隔及气管向患侧移位。(2 分)

58.

	骨质疏松	骨质软化
定义(1 分)	一定单位体积内正常钙化的骨组减少	一定单位体积内骨组织有机成分正常

	即有机成分与钙盐成比例减少织	而矿物质含量减少
组织学变化(1 分)	骨皮质变薄，哈氏管扩大和骨小梁减少	骨组织钙化不足，常见中央钙化周边不钙化
X 线表现(1.5 分)	骨密度减低，骨小梁变细减少，间隙增宽骨皮质出现分层变薄现象	密度减低， 骨皮质、 骨小梁模糊，骨骼变形，假骨折线
(0.5 分)	见于废用性	见于佝偻病

59. 多停留在食道的生理狭窄处，以梨状窝、食道入口和主动脉弓压迹处多见。(1 分)平片可以见到高密度异物，显示颈部咽、食道后方软组织肿胀。(1.5 分)低密度异物需靠食道钡棉检查，异物大时钡剂通过受阻，较小的异物产生部分梗阻，此时异物表面常有钡棉滞留。(1.5 分)

60. 良恶性骨肿瘤的鉴别诊断：

	良性	恶性
生长情况(1分)	生长缓慢，不侵及邻近组织，无转移	生长迅速，侵及邻近组织器官；可远处转移
局部骨变化(1分)	与正常骨界限清晰	浸润性生长，与正常骨界限模糊，可有肿瘤骨。
骨膜增生(1分)	一般无骨膜增生 ，病理骨折后可有少量骨膜增生，	多出现不同形式的骨膜增生 ，并可被肿瘤侵犯破坏，形成骨膜三角
周围软组织变化(1 分)	多不累及周围软组织	多累及周围软组织形成肿块，与周围组织分界不清

[综合分析题]（2 题，共 20 分）

61.脊椎骨折：多有外伤史，易发生于脊柱活动较大的部位，如胸腰段；一般单个椎体压缩变扁，不见骨折线，反见一致密影，(1 分)无椎间狭窄，(1 分)不累积软组织。(1 分)

脊椎结核：多引起相邻多个锥体的骨质破坏，(1 分)附件较少受累，椎体松质骨破坏，椎体塌陷变扁，(1 分)椎间隙变窄甚至消失，(1 分)累积软组织可形成椎旁冷脓肿。(1 分)

脊柱转移瘤：多为多个跳跃性椎体广泛性骨质破坏，因承重压缩变扁，(1 分)椎间隙不窄，(1 分)椎弓根等附件多受累破坏. (1 分)

62.	良性胃溃疡	恶性胃溃疡
龛影形状：(2 分)	圆或椭圆形，边缘光滑整齐	不规则，有多个尖角
龛影位置：(3 分)	突出于胃轮廓外	位于胃轮廓之内
龛影周围与口部：(3 分)	粘膜水肿表现如粘膜线、项圈征、狭颈征、粘膜皱襞向龛影集中直达龛影口	指压迹样充盈缺损，有不规则环堤‘粘膜中断、破坏
附近胃壁(2 分)	柔软、有蠕动波	僵硬、蠕动消失