中南大学考试试卷

时间 120 分钟

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

2006 ~2007 学年上学期《牙体牙髓病学》课程期末考试试题

88 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 80 %

得　分	
评卷人	

一、名词解释（5 题×4 分=20 分）

1. retrograde pulpitis

逆行性牙髓炎（1 分）：逆行性牙髓炎的感染来源于患牙牙周病所致的深牙周袋（1 分）。袋内的细菌及毒素通过根尖孔或侧、副根管逆行进入牙髓（1 分），引起根部牙髓的慢性炎症，也可由局限的慢性牙髓炎急性发作。临床症状常具有急性牙髓炎特征，（1 分）此型牙髓炎的感染走向与通常由冠部牙髓开始，逐渐向根部牙髓进展的牙髓炎方向相反，故名为逆行性牙髓炎。

2、Dental plaque

牙菌斑（1）：牙齿或修复体上形成的一种软而粘的、非矿化的细菌沉积物，由粘性基质嵌入其中的细菌构成。（1）是细菌为自身建立的微生态环境，细菌在其中生长、繁殖和死亡，并进行复杂的物质代谢活动，（1）在一定的条件下，细菌的代谢产物可造成牙体或牙周组织的破坏。（1）

3、apexification

根尖诱导成形术（1 分）：是指牙根未完全形成之前而发生牙髓严重病变或尖周炎症的年轻恒牙（1 分），在消除感染或治愈尖周炎的基础上，用药物诱导根尖部的牙髓和（或）根尖周组织形成硬组织（1 分），使牙根继续发育并使根尖形成的治疗方法（1 分）。

4、secondary caries

继发龋（1 分）：龋病治疗后，由于充填物边缘（1 分）或窝沟周围牙体组织破裂（1 分），形成菌斑滞留区，或修复材料与牙体组织不密合（1 分），留有小的缝隙，这些都可能成为致病条件，产生龋病，称继发龋。

5、acid etching technique

酸蚀技术（1 分）：通过酸蚀刻釉质表层（1 分），获得树脂修复体的微机械固位（1

---○---○---

学　院

口腔医学院

专业班级

口腔医学专业
口腔（七）
0201 班

学　号

姓　名

B 卷

考试时间：
2006/11/11

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

得 分	
评卷人	

二、选择题（36 题 X1 分＝36 分）

A1 型题

1. 猛性龋是指（ D ）
A. 龋坏进展较快　B. 仅见于颌面部接受放射治疗的者　C. 龋坏累及牙面广泛
D. 多数牙在短期内同时患龋，进展很快　E. 残冠

2. 急性化脓性根尖周炎症状最严重的阶段是（B ）
A. 根尖脓肿阶段　B. 骨膜下脓肿阶段　C. 粘膜下脓肿阶段
D. 皮下脓肿阶段　E. 形成窦道阶段

3. 下列哪种胞外聚合物不易清除，与菌斑致龋能力密切相关（B ）
A. 右旋多糖　B. 变聚糖　C. 果聚糖　D. 胞外多糖　E. 以上均不是

4. 临床上牙髓息肉一般见于（ E ）
A. 急性牙髓炎浆液期　B. 急性牙髓炎化脓期　C. 慢性闭锁性牙髓炎
D. 慢性溃疡性牙髓炎　E. 慢性增生性牙髓炎

5. 嵌入性牙脱位在复位后多长时间进行根管治疗？（ B ）
A. 1 周　B. 2 周　C. 3 周　D. 4 周　E. 5 周

6. 牙髓切断术中切除的牙髓为（ B ）
A. 部分冠髓　B. 有部分病变的全部冠髓　C. 健康冠髓
D. 有病变的根髓　E. 视具体情况而定

7. 可复性牙髓炎与不可复性牙髓炎不同的主要临床特征是（ A ）
A. 无自发痛，有刺激痛　B. 有自发痛及刺激痛　C. 有自发痛史、刺激去除后疼痛即消失
D. 有自发痛史、刺激去除后疼痛持续较久　E. 有自发痛，无刺激痛

8. 按龋坏程度可将龋病分为（B ）
A. 急性龋、慢性龋、静止性龋　B. 浅龋、中龋、深龋　C. 窝沟龋、平滑面龋
D. 牙釉质龋、牙本质龋和牙骨质龋　E. 干性龋、湿性龋

9. 三氧化二砷用于牙髓失活时，封药时间需（ A ）
A. 24-48 小时　B. 2-4 天　C. 5-7 天　D. 2 周　E. 20 天

10. 发生于年轻恒牙的可复性牙髓炎，去净腐质未露髓者，首选治疗方法为（ C ）

大学医科考试

A.局麻下开髓引流　　B.安抚治疗　C.间接盖髓　　D.活髓切断术　　E 局麻拔髓

11. 牙髓活力温度测验中的冷刺激是指（ B ）
A 低于 15℃的刺激　B.低于 10℃的刺激　C. 低于 5℃的刺激　D.低于 0℃的刺激　E.冰棒的刺激

12. 关于牙髓失活法操作错误的叙述是：（ C ）
A.封失活剂后，一定要向患者交代复诊时间　　B.封失活剂之前，不必彻底去净腐质
C 为保证失活效果，应该将失活剂压入髓腔内　　D.操作中注意避免失活剂接触牙龈组织或口腔粘膜
E.封药时若牙髓出血多，可以适当止血

13. 不属于氢氧化钙特性的是（B ）
A 呈强碱性　　B.激活酸性磷酸酶活性　　C. pH 值为 9~12
D.诱导修复性牙本质形成　　E.具有一定抗菌作用

14. 关于牙髓失活法错误的是（ E ）
A.常用失活剂包括多聚甲醛，金属砷和三氧化二砷等　B.根尖孔尚未形成换牙，不使用亚砷酸失活
C.采用金属砷失活恒牙一般为 5～7 天　　D.亚砷酸造成的神经血管变化出现在封药后 24~48 小时
E 多聚甲醛封药时间不超过 1 周

15. 不符合急性化脓性根尖周炎根尖脓肿阶段的临床表现的是（ E ）
A.自发性剧烈跳痛，患者不敢咬合　　B.患牙伸长感加重，出现早接触
C.对应区域可有淋巴结肿大触痛　　D.患牙Ⅱ一Ⅲ度松动
E.出现颌面部蜂窝织炎

A2 型题

16. 患者男 30 岁，诉自发性牙痛 2 天，口含冰块可暂时缓解，拟诊为（ B ）
A.急性根尖周炎　　B.急性牙髓炎化脓期　　C.急性冠周炎
D.急性牙周脓肿　　E.可复性牙髓炎

17. 患者男 3 0 岁，主诉：右面部弥漫性疼痛 2 天；对于鉴别是否为牙源性疼痛，最有价值的检查手段是（ B ）
A.照曲面体层片　　B.叩诊和牙髓活力检查　　C 选择性麻醉
D.问诊和探诊　　E.牙齿松动度检查

18. 男，9 岁，诉左下后牙冷、热刺激显著疼痛 1 天。查：36 矜面深龋，去龋时见穿髓点约 0.5mm，呈鲜红色，敏感，其恰当的治疗方法是（ A ）
A.直接盖髓，暂时观察　　B.活髓切断　　C.间接盖髓　D.根管治疗　E.塑化治疗

19. 男，40 岁，右上后牙持续剧烈疼痛 1 周，伴伸长感，不敢咬合。查：14 矜面隐裂，冷热刺激痛（-），叩痛（+++），根尖部牙槽粘膜红肿，牙痛（++），相对应的面部轻度肿胀，其诊断是：（ C ）

A.急性牙髓炎　B.急性浆液性根尖周炎　C. 急性化脓性根尖周炎　D.牙髓坏死　E.慢性根尖周炎

20. 女，29 岁，下前牙变色 1 年就诊。查：31 牙冠变色，叩痛（±），冷热刺激痛（-），开髓后根管内有黄褐色清凉液体渗出，X 线示 31 根尖可见约 1cm×1cm 大小圆形、边界清楚的透光区，其诊断是：（ D ）

A.牙髓坏死　B.慢性牙槽脓肿　C.下颌骨肿瘤　D.根尖囊肿　E.慢性骨髓炎

21. 女，28 岁，左下后牙自发性疼痛 1 天就诊。查：36 矜面龋，累及牙本质中层，探酸痛，温度刺激痛（+），叩痛（-）；35 牙体无龋，未探及牙周袋，矜面中央窝处见一椭圆形呈黄色区域，中央见一黑色小点，温度刺激痛（+++），叩痛（+），与主诉症状相关的诊断最可能是：（ D ）

A.36 深龋　B.36 急性牙髓炎　C.35 畸形中央尖　D.35 急性牙髓炎　E.36 中龋

A3 型题

22~25 题共用题干

患者，男，28 岁，下颌第一恒磨牙咬合不适 1 周，感患牙伸长，初时紧咬牙可缓解不适，昨天开始不敢咬牙并出现自发痛，无放射痛，检查发现：46 远中颌面深龋及髓，探(-)，叩痛(+++)，牙齿不松动，龈稍显红肿、无瘘道，根尖区压痛(+)

22. 诊疗过程中哪一项是最没有必要的（D ）

A.X 线检查　B.冷热测　C.牙髓电活力检测　D.牙面染色剂染色　E.探诊

23. 最可能的诊断为（ B ）

A.急性牙髓炎　B.急性根尖周炎　C.急性牙周炎　D.急性牙龈炎　E..不能作出明确诊断

24. 应急处理首选（ E ）

A.服用消炎止痛药　B.根尖区切开引流　C.针刺止痛，并用氢氧化钙直接盖髓
D.去腐、开髓，置氧化锌丁香油棉球安抚镇痛　E.开髓、拔髓、开放引流

25. 应急处理三天后病人复诊，诉症状明显缓解，此时的处理应当是（ C ）

A.封失活剂，嘱再次复诊　B.去除引流条，继续服消炎药，条件许可应作洁治术，并嘱三个月复查
C.清理、预备根管上 2/3，封入氢氧化钙，嘱复诊　D.备洞、永久充填
E.拔除患牙，常规医嘱考虑三个月后义齿修复

A4 型题

26~27 题共用题干

女，65 岁，因感右下后牙嵌塞食物不适数月就诊，检查发现 46 矜面深龋，洞底探痛（±），冷热刺激痛（+），叩痛（-）

26. 若 X 线检查发现 46 矜面深龋，髓腔缩小，髓室顶存在 2mm 厚修复性牙本质，其诊断是：（ C ）

A.慢性闭锁性牙髓炎　B.慢性根尖周炎　C.慢性龋　D.牙髓坏死　E.牙髓钙化

27. 若 X 线检查发现 46 牙合面深龋，近中髓角可疑穿髓，其诊断是：（ A ）
A.慢性闭锁性牙髓炎 B.慢性根尖周炎 C.慢性龋 D.牙髓坏死 E.牙髓钙化

28. 如果去龋后见近中颊侧髓角灰白色穿髓点，深部探痛（++）最佳治疗方法是：（ D ）
A.直接垫底充填 B.直接盖髓 C.间接盖髓 D.根管治疗 E.塑化治疗

29. 若 X 线检查发现 46 牙合面深龋，髓腔缩小，髓室顶存在 2mm 厚修复性牙本质；临床检查未探及穿髓孔，其恰当治疗方法是：（ A ）
A.去腐、备洞、垫底、永久充填 B. 直接盖髓 C. 活髓切断 D.根管治疗 E.塑化治疗

多选题

30. 关于四环素牙，哪些是正确的（ ABD ）
A．四环素可通过胎盘引起乳牙着色 B．前牙比后牙着色明显 C．乳牙比恒牙着色明显
D．四环素牙的着色是永久的 E．四环素对牙的影响仅仅是着色影响美观

31. 慢性牙髓炎的主要临床表现：（ ABDE ）
A．长期的冷、热刺激痛 B．阵发性隐痛或钝痛 C．剧烈的自发痛
D．咬合不适或轻叩痛 E．一般能明确指出患牙

32. 下列哪些是牙髓坏死的临床表现（ ABDE ）
A．患牙一般无自觉症状 B．牙冠变色 C．X 线片显示牙根尖周透射影像
D．温度刺激无反应 E．牙髓活力测验无反应

33. 直接盖髓术适应症有哪些（ ABCD ）
A．龋源性点状露髓、根尖孔未形成的恒牙 B.机械性点状露髓的年轻恒牙
C．外伤性点状露髓的年轻恒牙 D．根尖孔已形成、意外露髓的恒牙，露髓点小于 0.5mm
E．龋源性露髓的恒牙

34. 慢性根尖周炎的病变类型有（ ABCD ）
A．根尖周致密性骨炎 B．根尖周脓肿 C．根尖周肉芽肿
D．根尖周囊肿 E．根周膜炎

35. 深龋的诊断依据有（ ABDE ）
A． 有龋洞 B. 有冷、热、酸、甜等激发痛 C. 有轻度自发痛
D. 有食物嵌塞痛 E. 龋洞深达牙本质深层

36. 下列哪项叙述是正确的（ ABCE ）
A. 根管充填时不必等待窦道封闭
B. 根尖周囊肿在根管治疗后 1 年左右方可逐渐愈合
C. 根管治疗术后 3-6 个月窦道仍未愈合，表示治疗失败

本资料来自网络

D. 根管治疗术后观察 6-9 个月，无异常临床表现，可确定治疗成功

E. 牙根未发育完成者，治疗后形成根尖部最短的时间约 3-6 个月

得 分	
评卷人	

三、简答题：（每题 5 分，共 20 分）

1. 急性牙髓炎的疼痛特点？

自发性阵发性痛（1 分）

夜间痛：疼痛往往在夜间发作，或夜间疼痛较白天剧烈。（1 分）

温度刺激加剧疼痛：冷热刺激可以继发患牙的剧烈疼痛。（1 分）

疼痛不能自行定位：疼痛发作时，患者大多不能明确指出患牙所在（1 分），

疼痛呈放射性或牵涉性，常常是沿着三叉神经第二支或第三支分布区域放射至患牙同侧的上、下颌牙或头、颈、面部（1 分）

2. 楔状缺损的病因

① 刷牙（1.25 分）

② 牙颈部的结构（1.25 分）

③ 酸的作用（1.25 分）

④ 牙体组织的疲劳（1.25 分）

3. 龋洞充填后疼痛的原因

① 激发痛：备洞过程中对牙髓的物理刺激，过冷的水冲洗窝洞，连续钻磨产热及钻牙的负压，中深龋未垫底。（1 分）

② 与对牙合牙接触时痛：银汞合金充填产生微电流 （1 分）

③ 自发痛：对牙髓状况判断错误，充填材料对牙髓的慢性刺激 （1 分）

④ 咬合痛：充填物过高 （1 分）

⑤ 自发性牙周性疼痛：术中器械伤及牙龈，酸蚀剂溢至牙龈，充填物在龈缘形成悬突等。（1 分）

4. 牙髓病的感染途径有哪些？

牙本质小管（1.25 分）；牙髓暴露（1.25 分）；牙周途径（1.25 分）； 血源感染（1.25 分）

得 分	
评卷人	

四、问答题（8 分）

牙隐裂的诊断方法和处理要点？

处理要点：

1) 调𬌗排除合干扰，减低牙尖斜度以减小劈裂力量（1 分）均衡全口合力负担，治疗和（或）拔出全口其他患牙，修复缺失牙（1 分）
2) 隐裂仅达釉牙本质界，着色浅而无继发龋齿损者（2 分），用酸蚀法和粘接剂光固化处理，
3) 有继发龋或者裂纹着色深，以达牙本质浅层、中层者（2 分）沿裂纹备洞，氢氧化钙糊剂覆盖，玻璃离子粘固剂暂封，2 周后无症状则换光固化树脂修复。无症状则换光固化树脂修复。
4) 较深的裂纹或已有牙髓病变者，需进行牙髓治疗。牙髓治疗开始时，可作带环保护牙冠，治疗后及时全冠修复。（2 分）

得 分	
评卷人	

五、病例分析（16 分）

患者，男，50 岁。

主诉：左上后牙剧烈疼痛伴夜间痛 3 天。

病史：1 年前左上后牙遇冷热刺激及食物嵌塞时疼痛，当刺激因素去除后疼痛立即消退；6 个月前突然出现自发性疼痛，呈阵发性发作，夜间不能眠。5 天后其剧烈疼痛自行缓解，但咀嚼时仍感疼痛，自行服用消炎药后，疼痛减轻，仅感咀嚼不适，常伴有左上侧龈粘膜肿胀、疼痛；2 个月后又感冷热刺激痛明显，刺激去除后疼痛立即消失。1 周前冷热刺激痛显著加剧，刺激去除后疼痛很快消退；3 天前疼痛呈自发性阵发性发作，夜间加剧来就诊。

检查：28 颊向错位，叩（±），27，28 间龈乳头退缩，食物嵌塞。

27 远中邻面深龋，牙体变色，探（-），叩（++），松Ⅰ°

26 颊侧颈部探敏感。

25 近中邻面深龋，探痛（++），叩（±），冷热试验疼痛显著加剧。

请回答下列问题：

1. 哪一牙位是本次就诊的主诉牙？
2. 27 的诊断是什么？列出诊断依据；分析其发病过程，说明 25 治疗方案及简要治疗步骤。
3. 25 的诊断是什么？列出诊断依据；分析其发病过程，说明 25 治疗方案及简要治疗步骤。

1. 25 是本次就诊的主诉牙。（2 分）

2. 27 诊断及发病过程（7 分）

慢性根尖周炎（1 分）

a) 1 年前 （1 分）

可复性牙髓炎（或深龋）（依据：受到冷热温度刺激痛，刺激去除后疼痛消失。没有自发痛）

b) 6 月前

大学医学部

---○---○---

学　院
口腔医学院
专业班级
口腔医学专业 口腔（七） 0201 班
学　号
姓　名
A 卷 考试时间： 2006/11/11

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

2006 ~2007 学年上学期《牙体牙髓病学》课程期末考试试题
标准答案和评分细则

得　分	
评卷人	

一、名词解释（5 题×4 分=20 分）

1. Dental Plaque

牙菌斑（1）：牙齿或修复体上形成的一种软而粘的、非矿化的细菌沉积物，由粘性基质嵌入其中的细菌构成。（1）是细菌为自身建立的微生态环境，细菌在其中生长、繁殖和死亡，并进行复杂的物质代谢活动，（1）在一定的条件下，细菌的代谢产物可造成牙体或牙周组织的破坏。（1）

2. Concussion of the Teeth

牙震荡（1 分）：是牙周膜的轻度损伤（1 分），通常不伴牙体组织缺损（1 分），伤后患牙有伸长不适感，轻微松动和叩动，龈缘还可有少量出血，说明牙周膜有损伤（1 分）

3. Retention Form

固位形（分 1）：是防止修复体在侧向或垂直方向力量作用下移位、脱落的形状〔2 分），基本的固位形有：侧壁 固位、倒凹固位、鸠尾固位（1 分）

4. Root canal therapy

根管治疗（1 分）：是治疗牙髓病及根尖周病首选的方法，它是彻底清理根管内炎症和坏死物质（1 分）、扩大成形根管，并对根管进行适当消毒、（1 分）最后严密充填根管（1 分），以除去根管内感染性内容物对根尖周组织的不良刺激，防止根尖周病的发生或促进根尖周病的愈合。

5. retrograde pulpitis

逆行性牙髓炎〔1 分）：逆行性牙髓炎的感染来源于患牙牙周病所致的深牙周袋〔1 分）。袋内的细菌及毒素通过根尖孔或侧、副根管逆行进入牙髓（1 分），引起根部牙髓的慢性炎症，也可由局限的慢性牙髓炎急性发作。临床症状常具有急性牙髓炎特征，〔1 分）此型牙髓炎的感染走向与通常由冠部牙髓开始，逐渐向根部牙髓进展的牙髓炎方向相反，故名为逆行性牙髓炎。

得 分	
评卷人	

二、选择题（36 题 X1 分＝36 分）

A1 型题

1. 牙内陷最严重的一种是（ E ）

A. 畸形根面沟　B. 畸形舌侧窝　C. 畸形舌侧尖　D. 双尖牙　E. 牙中牙

2. 急性化脓性根尖周炎症状最严重的阶段是（ B ）

A. 根尖脓肿阶段　B. 骨膜下脓肿阶段　C. 粘膜下脓肿阶段　D. 皮下脓肿阶段

E. 形成窦道阶段

3. 下列哪种胞外聚合物不易清除，与菌斑致龋能力密切相关（ B ）

A. 右旋多糖　B. 变聚糖　C. 果聚糖　D. 胞外多糖　E. 以上均不是

4. 为判断直接盖髓术后的疗效，至少需复查多长时间（ E ）

A. 3 个月　B. 6 个月　C. 12 个月　D. 18 个月　E. 24 个月

5. 嵌入性牙脱位在复位后多长时间进行根管治疗？（ B ）

A. 1 周　B. 2 周　C. 3 周　D. 4 周　E. 5 周

6. 影响直接盖髓的预后的因素*不包括*（ D ）

A 患者年龄

B 牙髓暴露的时间

C 牙髓暴露的范围

D 是否配合使用口服抗生素

E 牙髓暴露的类型

7. 牙髓切断术中切除的牙髓为（ B ）

A. 部分冠髓　B. 有部分病变的全部冠髓

C. 健康冠髓　D. 有病变的根髓　E. 视具体情况而定

8. 可复性牙髓炎与不可复性牙髓炎不同的主要临床特征是（ A ）

A. 无自发痛，有刺激痛

B. 有自发痛及刺激痛

C. 有自发痛史、刺激去除后疼痛即消失

D. 有自发痛史、刺激去除后疼痛持续较久

E. 有自发痛，无刺激痛

9. 按髓坏程度可将髓病分为（ B ）

本资料来自网络

A. 急性龋、慢性龋、静止性龋

B. 浅龋、中龋、深龋

C. 窝沟龋、平滑面龋

D. 牙釉质龋、牙本质龋和牙骨质龋

E. 干性龋、湿性龋

10. 发生于年轻恒牙的可复性牙髓炎，去净腐质未露髓者，首选治疗方法为（ C ）

A 局麻下开髓引流

B 安抚治疗

C 间接盖髓

D 活髓切断术

E 局麻拔髓

11. 牙髓活力温度测验中的冷刺激是指（ B ）

A.低于 15℃的刺激 B.低于 10℃的刺激 C.低于 5℃的刺激 D.低于 0℃的刺激 E.冰棒的刺激

12. 关于牙髓失活法操作错误的是（ C ）

A 封失活剂后，一定要向患者交代复诊时间

B 封失活剂之前，不必彻底去净腐质

C 为保证失活效果，应该将失活剂压入髓腔内

D 操作中注意避免失活剂接触牙龈组织或口腔粘膜

E 封药时若牙髓出血多，可以适当止血

13. 不属于氢氧化钙特性的是（ B ）

A 呈强碱性

B 激活酸性磷酸酶活性

C pH 值为 9~12

D 诱导修复性牙本质形成

E 具有一定抗菌作用

14. 关于牙髓失活法错误的是（ E ）

A 常用失活剂包括多聚甲醛，金属砷和三氧化二砷等 、

B 根尖孔尚未形成换牙，不使用亚砷酸失活

C 采用金属砷失活恒牙一般为 5~7 天

D 亚砷酸造成的神经血管变化出现在封药后 24~48 小时

E 多聚甲醛封药时间不超过 1 周

15. 不符合急性化脓性根尖周炎根尖脓肿阶段的临床表现的是（ E ）

A 自发性剧烈跳痛，患者不敢咬合

B 患牙伸长感加重，出现早接触

C 对应区域可有淋巴结肿大触痛

D 患牙Ⅱ一Ⅲ度松动

E 出现颌面部蜂窝织炎

A2 型题

16. 患者男 30 岁，诉自发性牙痛 2 天，口含冰块可暂时缓解，其诊断最可能是：（ B ）

A 急性根尖周炎

B 急性牙髓炎化脓期

C 急性冠周炎

D 急性牙周脓肿

E 可复性牙髓炎

17. 男性患者，30 岁，主诉：右面部弥漫性疼痛 2 天；对于鉴别是否为牙源性疼痛，最有价值的检查手段是（ B ）

A 照曲面体层片

B 叩诊和牙髓活力检查

C 选择性麻醉

D 问诊和探诊

E 牙齿松动度检查

18. 男，9 岁，诉左下后牙冷、热刺激显著疼痛 1 天。查：36 牙面深龋，去龋时见穿髓点约 0.5mm，呈鲜红色，敏感，其恰当的治疗方法是（ A ）

A.直接盖髓，暂时观察　　B.活髓切断　　C.间接盖髓　　D.根管治疗　E.塑化治疗

19. 男，40 岁，右上后牙持续剧烈疼痛 1 周，伴伸长感，不敢咬合。查：14 牙面隐裂，冷热刺激痛（-），叩痛（+++），根尖部牙槽粘膜红肿，牙痛（++），相对应的面部轻度肿胀，其诊断是：（ C ）

A.急性牙髓炎　B.急性浆液性根尖周炎　C. 急性化脓性根尖周炎　D.牙髓坏死　E.慢性根尖周炎

20. 女，29 岁，下前牙变色 1 年就诊。查：31 牙冠变色，叩痛（±），冷热刺激痛（-），开髓后根管内有黄褐色清凉液体渗出，X 线示 31 根尖可见约 1cm×1cm 大小圆形、边界清楚的透光区，其诊断是：（ D ）

A.牙髓坏死　B.慢性牙槽脓肿　C.下颌骨肿瘤　D.根尖囊肿　E.慢性骨髓炎

21. 女，28 岁，左下后牙自发性疼痛 1 天就诊。查：36 牙面龋，累及牙本质中层，探酸痛，温度刺激痛（+），叩痛（-）；35 牙体无龋，未探及牙周袋，牙面中央窝处见一椭圆形呈黄色区域，中央见一黑色小点，温度刺激痛（+++），叩痛（+），与主诉症状相关的诊断最可能是：（ D ）

A.36 深龋　B.36 急性牙髓炎　C.35 畸形中央尖　D.35 急性牙髓炎　E.36 中龋

A3 型题

22~25 题共用题干

患者，男，28岁，下颌第一恒磨牙咬合不适1周，感患牙伸长，初时紧咬牙可缓解不适，昨天开始不敢咬牙并出现自发痛，无放射痛，检查发现：46 远中颌面深龋及髓，探(-)，叩痛(+++)，牙齿不松动，龈稍显红肿、无瘘道，根尖区压痛(+)

22. 诊疗过程中哪一项是最没有必要的（ D ）

A X线检查

B 冷热测

C 牙髓电活力检测

D 牙面染色剂染色

E 探诊

23. 最可能的诊断为（ B ）

A 急性牙髓炎

B 急性根尖周炎

C 急性牙周炎

D 急性牙龈炎

E.不能作出明确诊断

24. 应急处理首选（ E ）

A 服用消炎止痛药

B 根尖区切开引流

C 针刺止痛，并用氢氧化钙直接盖髓

D 去腐、开髓，置氧化锌丁香油棉球安抚镇痛

E 开髓、拔髓、开放引流

25. 应急处理三天后病人复诊，诉症状明显缓解，此时的处理应当是 （ C ）

A 封失活剂，嘱再次复诊

B 去除引流条，继续服消炎药，条件许可应作沿治术，并嘱三个月复查

C.清理、预备根管上2/3，封入氢氧化钙，嘱复诊

D.备洞、永久充填

E 拔除患牙，常规医嘱考虑三个月后义齿修复

A4型题

26~27题共用题干

女，65岁，因感右下后牙嵌塞食物不适数月就诊，检查发现46 矜面深龋，洞底探痛（±），冷热刺激痛（+），叩痛（-）

26. 若X线检查发现46矜面深龋，髓腔缩小，髓室顶存在2mm厚修复性牙本质，其诊断是：（ C ）

A.慢性闭锁性牙髓炎 B.慢性根尖周炎 C.慢性龋 D.牙髓坏死 E.牙髓钙化

27. 若X线检查发现46矜面深龋，近中髓角可疑穿髓，其诊断是：（ A ）

A.慢性闭锁性牙髓炎　B.慢性根尖周炎　C.慢性龋　D.牙髓坏死　E.牙髓钙化

28. 如果去龋后见近中颊侧髓角灰白色穿髓点，深部探痛（++）最佳治疗方法是：（ D ）
A.直接垫底充填　B.直接盖髓　C.间接盖髓　D.根管治疗　E.塑化治疗

29. 若 X 线检查发现 46 牙合面深龋，髓腔缩小，髓室顶存在 2mm 厚修复性牙本质；临床检查未探及穿髓孔，其恰当治疗方法是：（ A ）
A.去腐、备洞、垫底、永久充填　B. 直接盖髓　C. 活髓切断　D.根管治疗　E.塑化治疗

多选题

30. 关于四环素牙，哪些是正确的（ ABD ）
A．四环素可通过胎盘引起乳牙着色
B．前牙比后牙着色明显
C．乳牙比恒牙着色明显
D．四环素牙的着色是永久的
E．四环素对牙的影响仅仅是着色影响美观

31. 慢性牙髓炎的主要临床表现：（ ABDE ）
A．长期的冷、热刺激痛　B．阵发性隐痛或钝痛
C．剧烈的自发痛　D．咬合不适或轻叩痛　E．一般能明确指出患牙

32. 龋病的致病因素主要是（ ABCE ）
A．细菌　B．食物　C.宿主　D．年龄　E．一定的时间

33. 直接盖髓术适应症有哪些（ ABCD ）
A．龋源性点状露髓、根尖孔未形成的恒牙　B.机械性点状露髓的年轻恒牙
C．外伤性点状露髓的年轻恒牙　D．根尖孔已形成、意外露髓的恒牙，露髓点小于 0.5mm
E．龋源性露髓的恒牙

34. 深龋的诊断依据有（ ABDE ）
A．有龋洞　B．有冷、热、酸、甜等激发痛　C．有轻度自发痛　D．有食物嵌塞痛
E．龋洞深达牙本质深层

35. 以下关于牙体缺损修复中增加患牙抗力的措施，哪些是对的（ ABCD ）
A．尽量保留牙体硬组织　B．嵌体洞斜面　C．高嵌体　D．去除薄壁弱尖
E．进行预防性扩展

36. 下列哪项叙述是正确的（ ABCE ）
A．根管充填时机不必等待窦道封闭
B．根尖周囊肿在根管治疗后 1 年左右方可逐渐愈合

C. 根管治疗术后 3-6 个月窦道仍未愈合，表示治疗失败

D. 根管治疗术后观察 6-9 个月，无异常临床表现，可确定治疗成功

E. 牙根未发育完成者，治疗后形成根尖部最短的时间约 3-6 个月

得 分	
评卷人	

三、简答题：（每题 5 分，共 20 分）

1. 急性牙髓炎的疼痛特点？

自发性阵发性痛（1 分）
夜间痛：疼痛往往在夜间发作，或夜间疼痛较白天剧烈。（1 分）
温度刺激加剧疼痛：冷热刺激可以继发患牙的剧烈疼痛。（1 分）
疼痛不能自行定位：疼痛发作时，患者大多不能明确指出患牙所在（1 分），
疼痛呈放射性或牵涉性，常常是沿着三叉神经第二支或第三支分布区域放射至患牙同侧的上、下颌牙或头、颈、面部（1 分）

2. 简述慢性根尖周炎的分类

根尖周肉芽肿（1.25 分）；慢性根尖周脓肿（1.25 分）；根尖周囊肿（1.25 分）；根尖周致密性骨炎（1.25 分）

3、窝洞预备的基本原则

去净龋坏组织（2 分）；保护牙髓组织（1.5 分）；尽量保留健康牙体组织（1.5 分）

4. 牙髓病的感染途径有哪些？

牙本质小管（1.25 分）；牙髓暴露（1.25 分）；牙周途径（1.25 分）； 血源感染（1.25 分）

得 分	
评卷人	

四、问答题（共 8 分）

试述根管预备的原则及标准

1. 完善清洁根管系统的所有部分，根管的冠 1/3 具有足够的宽度，能进行有效地冲洗；伴随根管预备每一步进行彻底根管冲洗；保持根尖狭窄处通畅，不能堆积牙本质碎屑；根管比原来直径至少应扩大 3 个器械号，或用标准器械扩至 40 号。（2 分）
2. 适应根管的自然弯曲，避免根尖堵塞和过度预备；预备后的根管应保持根管的原始形状；（2 分）
3. 形成自根尖孔至根管口的连续锥形的管状结构；利于根管预备器械的进入和完善的根管充填，根尖部 2~3mm 的预备使蛀牙胶尖紧密充填，回抽有紧缩感（2 分）

4. 保持根尖狭窄去的原始位置，形成根充档、不能扩大根尖孔(终止在狭窄处的牙本质一侧) （2 分）

得 分	
评卷人	

五、病例分析（16 分）

患者，男，25 岁。

主诉：左上后牙剧烈疼痛伴夜间痛 3 天。

病史：1 年前左上后牙遇冷热刺激及食物嵌塞时疼痛，当刺激因素去除后疼痛立即消退；6 个月前突然出现自发性疼痛，呈阵发性发作，夜间不能眠。5 天后其剧烈疼痛自行缓解，但咀嚼时仍感疼痛，自行服用消炎药后，疼痛减轻，仅感咀嚼不适，常伴有左上侧龈粘膜肿胀、疼痛；2 个月后又感冷热刺激痛明显，刺激去除后疼痛立即消失。1 周前冷热刺激痛显著加剧，刺激去除后疼痛很快消退；3 天前疼痛呈自发性阵发性发作，夜间加剧来就诊。

检查： 28 颊向错位，叩（±）。27，28 间龈乳头退缩，食物嵌塞。

27 远中邻面深龋，牙体变色，探（-），叩（++），松Ⅰ°

26 颊侧颈部探敏感。

25 近中邻面深龋，探痛（++），叩（±），冷热试验疼痛显著加剧。

请回答下列问题：

1. 判断本次就诊的主诉牙，其依据是什么？
2. 分析 1 年来左上后牙各阶段牙痛的疾病过程，并列出依据
3. 对被检查的患牙作出诊断。
4. 本次就诊重点治疗的患牙是哪一牙位？并说明各患牙治疗方案。

1. 本次就诊的主诉牙是 25。（1 分）

依据是：（1 分）

1) 冷热试验疼痛加剧，说明牙髓存在着不可复性牙髓炎；
2) 探诊反应明显，仅轻度叩痛。

2. 27 的发病过程（4 分）

1) 1 年前 （1 分）

可复性牙髓炎（或深龋）（依据：受到冷热温度刺激痛，刺激去除后疼痛消失。没有自发痛）

2) 6 月前

不可复性牙髓炎 （依据：1.自发性阵发性痛；2.夜间痛）（1 分）

牙髓坏死 （依据：剧烈疼痛自行缓解）（1 分）

慢性根尖周炎 （依据：病史由牙髓炎转归，咀嚼不适，消炎药缓解）（1 分）

25 的发病过程（3 分）

1) 2 月前 深龋（冷热刺激痛明显，刺激去除后疼痛立即消失）（1 分）
2) 1 周，可复性牙髓炎（依据：冷热刺激痛显著加剧，刺激去除后疼痛很快消退；）（1 分）

3) 3 天前　不可复性牙髓炎 （依据：自发阵发性疼痛，夜间加剧，牙髓温度测试阳性）（1 分）

3. 诊断：（3 分） 25 急性牙髓炎（1 分）
26 牙本质过敏症（0.5 分）
27 慢性根尖周炎（1 分）
28 错位智齿（0.5 分）

4. 治疗方案（4 分）
25 本次就诊重点处理的患牙（1 分）
开髓引流，拔髓，随后做根管治疗，消炎治疗（1 分）
27 根管治疗（1 分）
26 脱敏治疗（0.5 分）
28 待 25、27 根管治疗完毕，左后牙区粘膜肿胀消退后拔除。（0.5 分）

大学答案帮手

2006 -2007 学年下学期《牙体牙髓病学》课程期末考试试题 A 参考答案

一、名词解释（5 题×4 分=20 分）

1. Dental plaque

牙菌斑（1）：牙齿或修复体上形成的一种软而粘的、非矿化的细菌沉积物，由粘性基质嵌入其中的细菌构成。（1）是细菌为自身建立的微生态环境，细菌在其中生长、繁殖和死亡，并进行复杂的物质代谢活动，（1）在一定的条件下，细菌的代谢产物可造成牙体或牙周组织的破坏。（1）

2. Concussion of the Teeth

牙震荡（1 分）：是牙周膜的轻度损伤（1 分），通常不伴牙体组织缺损（1 分），伤后患牙有伸长不适感，轻微松动和叩动，龈缘还可有少量出血，说明牙周膜有损伤（1 分）

3. Retention Form

固位形（分 1）：是防止修复体在侧向或垂直方向力量作用下移位、脱落的形状（2 分），基本的固位形有：侧臂 固位、倒凹固位、鸠尾固位（1 分）

4. Residual Pulpitis

残髓炎（1 分）：属于慢性牙髓炎，发生在经过牙髓治疗后的患牙（1 分），由于残留了少量炎症根髓（1 分）或者是多根牙遗漏了未作处理的根管，因而命名为残髓炎（1 分）。

5. apexification

根尖诱导成形术（1 分）：是指牙根未完全形成之前而发生牙髓严重病变或尖周炎症的年轻恒牙（1 分），在消除感染或治愈尖周炎的基础上，用药物诱导根尖部的牙髓和（或）根尖周组织形成硬组织（1 分），使牙根继续发育并使根尖形成的治疗方法（1 分）。

二、选择题（30 题 X1 分＝30 分）

A1 型题（1~15） C E D B B D C B B D B C B A E

A2 型题（16~20） B A C D D

A3 型题（21~24） **C A D A**

多选题 25. 、ABDE 26. ABCD 27. ABDE 28. ABDE 29. ACDE 30. ABCE

三、填空题（5 空×1 分=5 分）

1. 生理性根尖孔，0.5~1mm
2. 所有牙齿的唇(颊)舌(腭)面龈三分之一处制备的窝洞
3. 牙髓病治疗后：牙周炎

四、简答题：（每题 5 分，共 20 分）

1. 龋洞充填后疼痛的原因

① 激发痛：备洞过程中对牙髓的物理刺激，过冷的水冲洗窝洞，连续钻磨产热及钻牙的负压，中深龋未垫底。（1 分）

② 与对牙合牙接触时痛：银汞合金充填产生微电流 （1 分）

③自发痛：对牙髓状况判断错误，充填材料对牙髓的慢性刺激 （1 分）

④ 咬合痛：充填物过高 （1 分）

⑤ 自发性牙周性疼痛：术中器械伤及牙龈，酸蚀剂溢至牙龈，充填物在龈缘形成悬突等。（1 分）

2．急性牙髓炎的疼痛特点？

①自发性阵发性痛（1 分）

②夜间痛：疼痛往往在夜间发作，或夜间疼痛较白天剧烈。（1 分）

③温度刺激加剧疼痛：冷热刺激可以继发患牙的剧烈疼痛。（1 分）

④疼痛不能自行定位：疼痛发作时，患者大多不能明确指出患牙所在（1 分），

⑤疼痛呈放射性或牵涉性，常常是沿着三叉神经第二支或第三支分布区域放射至患牙同侧的上、下颌牙或头、颞、面部（1 分）

3. 楔状缺损的病因

① 刷牙（1.25 分）

② 牙颈部的结构（1.25 分）

③ 酸的作用（1.25 分）

④ 牙体组织的疲劳（1.25 分）

4. 简述慢性根尖周炎的分类

根尖周肉芽肿（1.25 分）；慢性根尖周脓肿（1.25 分）；根尖周囊肿（1.25 分）；根尖周致密性骨炎（1.25 分）

五、问答题（共 10 分）

目的（2 分）：在根管清理的基础上，进一步清除感染；建立根尖周病灶的引流通道；便于根管内封药，以保证药物的消毒杀菌作用；便于根管充填，使根充严密准确。

原则和标准：1、适应根管的自然弯曲，预备后的根管应保持根管的原始形状；形成自根尖孔至根管口的连续锥形的管状结构。（2 分）

2、保持根尖狭窄处的原始位置，形成根充档、不能扩大根尖孔；保持根尖狭窄处通畅，不能堆积牙本质碎屑。（2 分）

3、根管的冠 1/3 具有足够的宽度，能进行有效地冲洗，预备后的根管提供足够的空间完成牙胶的加压充填。（2 分）

4、根管比原来直径至少应扩大 3 个器械号，或用标准器械扩至 40 号。（2 分）

六、病例分析（15 分）

1. 本次就诊的主诉牙是 17（1 分）

2. 17：急性牙髓炎（1`分）

依据是：（1 分）深龋近髓，探痛(++)，叩(±)，冷热测引起持续痛，说明牙髓存在着不可复性牙髓炎。

3．18 的发病过程（4 分）

1） 1 年前：可复性牙髓炎（或深龋）〔依据：遇冷热温度刺激不适，无明显疼痛）（1 分）

2） 5 月前：不可复性牙髓炎 （依据：1.自发性阵发性痛；2.夜间痛）（1 分）

牙髓坏死 （依据：剧烈疼痛自行缓解）（1 分）

慢性根尖周炎 （依据：病史由牙髓炎转归，咀嚼不适，消炎药缓解）（1 分）

17 的发病过程（2 分）

1) 3 月前 深龋〔冷热刺激痛明显，刺激去除后疼痛立即消失）（1 分）

2) 2 天前 不可复性牙髓炎 （依据：疼痛剧烈，夜间加剧，冷热测引起持续痛）（1 分）

4．诊断：（2 分）

18 慢性根尖周炎（1 分）

17 急性牙髓炎

16 牙隐裂（0.5 分）

15 楔状缺损（0.5 分）

治疗方案（4 分）

17 主诉牙：开髓引流，拔髓（或封失活剂），随后做根管治疗，全冠修复。（1 分）

18 拔除（1 分）

16 去腐备洞，复合树脂充填，调𬌗。（1 分）

15 垫底后玻璃离子或复合树脂充填。（1 分）

大医答案帮手

2006 -2007 学年下学期《牙体牙髓病学》课程期末考试试题 B 卷参考答案

一、名词解释（5 题×4 分=20 分）

1．secondary caries

继发龋（1 分）：龋病治疗后，由于充填物边缘（1 分）或窝洞周围牙体组织破裂（1 分），形成菌斑滞留区，或修复材料与牙体组织不密合（1 分），留有小的缝隙，这些都可能成为致病条件，产生龋病，称继发龋。

2．Retention Form

固位形（分 1）：是防止修复体在侧向或垂直方向力量作用下移位、脱落的形状（2 分），基本的固位形有：侧壁 固位、倒凹固位、鸠尾固位（1 分）

3．Turner teeth

特纳牙（1 分）：乳牙根尖周严重感染（1 分），可导致继承恒牙釉质发育不全，这种情况往往见于个别牙（1 分），以前磨牙居多（1 分），称为特纳牙。

4．Retrograde pulpitis

逆行性牙髓炎（1 分）：逆行性牙髓炎的感染来源于患牙牙周病所致的深牙周袋（1 分）。袋内的细菌及毒素通过根尖孔或侧、副根管逆行进入牙髓（1 分），引起根部牙髓的慢性炎症，也可由局限的慢性牙髓炎急性发作。临床症状常具有急性牙髓炎特征，（1 分）此型牙髓炎的感染走向与通常由冠部牙髓开始，逐渐向根部牙髓进展的牙髓炎方向相反，故名为逆行性牙髓炎。

5．Root canal therapy

根管治疗（1 分）：是治疗牙髓病及根尖周病首选的方法，它是彻底清理根管内炎症和坏死物质（1 分）、扩大成形根管，并对根管进行适当消毒、（1 分）最后严密充填根管（1 分），以除去根管内感染性内容物对根尖周组织的不良刺激，防止根尖周病的发生或促进根尖周病的愈合。

二、选择题（30 题 X1 分＝30 分）

A1 型题（1~15） CEBCEBECBCDBAE

A2 型题（16~20） BACDD

A3 型题（21~24） **DBEC**

多选题 25.、ABDE 26. ABDE 27. ABCE 28. ABDE 29. ACDE 30. ABCE

三、填空题（5 空×1 分=5 分）

1．牙髓病治疗后：牙周炎

2．Ⅰ类洞

3．蔗糖（1 分）：碳水化合物（1 分）

四、简答题：（每题 5 分，共 20 分）

1、龋洞充填后疼痛的原因

① 激发痛：备洞过程中对牙髓的物理刺激，过冷的水冲洗窝洞，连续钻磨产热及钻牙的负压，中深龋未垫底。（1 分）

② 与对牙合牙接触时痛：银汞合金充填产生微电流 （1 分）

③ 自发痛：对牙髓状况判断错误，充填材料对牙髓的慢性刺激 （1 分）

④ 咬合痛：充填物过高 （1 分）

⑤ 自发性牙周性疼痛：术中器械伤及牙龈，酸蚀剂溢至牙龈，充填物在龈缘形成悬突等。（1 分）

2、急性牙髓炎的疼痛特点？

①自发性阵发性痛（1 分）

②夜间痛：疼痛往往在夜间发作，或夜间疼痛较白天剧烈。（1 分）

③温度刺激加剧疼痛：冷热刺激可以继发患牙的剧烈疼痛。（1 分）

④疼痛不能自行定位：疼痛发作时，患者大多不能明确指出患牙所在（1 分），

⑤疼痛呈放射性或牵涉性，常常是沿着三叉神经第二支或第三支分布区域放射至患牙同侧的上、下颌牙或头、颞、面部（1 分）

3、窝洞预备的基本原则

去净龋坏组织（2 分）；保护牙髓组织（1.5 分）；尽量保留健康牙体组织（1.5 分）

4、牙髓病的感染途径有哪些？

牙本质小管（1.25 分）；牙髓暴露（1.25 分）；牙周途径（1.25 分）； 血源感染（1.25 分）

五、问答题（共 10 分）

目的（2 分）：在根管清理的基础上，进一步清除感染；建立根尖周病灶的引流通道；便于根管内封药，以保证药物的消毒杀菌作用；便于根管充填，使根充严密准确。

原则和标准：1、适应根管的自然弯曲，预备后的根管应保持根管的原始形状；形成自根尖孔至根管口的连续锥形的管状结构。（2 分）

2、保持根尖狭窄处的原始位置，形成根充档，不能扩大根尖孔；保持根尖狭窄处通畅，不能堆积牙本质碎屑。（2 分）

3、根管的冠 1/3 具有足够的宽度，能进行有效地冲洗，预备后的根管提供足够的空间完成牙胶的加压充填。（2 分）

4、根管比原来直径至少应扩大 3 个器械号，或用标准器械扩至 40 号。（2 分）

六、病例分析（15 分）

1. 本次就诊的主诉牙是 17（1 分）

2. 17：急性牙髓炎（1 分）

依据是：（1 分）深龋近髓，探痛(++)，叩(±)，冷热测引起持续痛，说明牙髓存在着不

可复性牙髓炎。

3．18 的发病过程（4 分）

1） 1 年前：可复性牙髓炎（或深龋）〔依据：遇冷热温度刺激不适，无明显疼痛）（1 分）

2） 5 月前：不可复性牙髓炎 （依据：1.自发性阵发性痛；2.夜间痛）（1 分）

牙髓坏死 （依据：剧烈疼痛自行缓解）（1 分）

慢性根尖周炎 〔依据：病史由牙髓炎转归，咀嚼不适，消炎药缓解）（1 分）

17 的发病过程（2 分）

1) 3 月前 深龋〔冷热刺激痛明显，刺激去除后疼痛立即消失）（1 分）

2) 2 天前 不可复性牙髓炎 （依据：疼痛剧烈，夜间加剧，冷热测引起持续痛）（1 分）

4．诊断：（2 分）

18 慢性根尖周炎（1 分）

17 急性牙髓炎

16 牙隐裂（0.5 分）

15 楔状缺损（0.5 分）

治疗方案（4 分）

17 主诉牙：开髓引流，拔髓（或封失活剂），随后做根管治疗，全冠修复。（1 分）

18 拔除（1 分）

16 去腐备洞，复合树脂充填，调𬌗。（1 分）

15 垫底后玻璃离子或复合树脂充填。（1 分）

大学答案帮手