

*

李汉龙[†] 隋英[‡] 韩婷[§]

2025 年 9 月 9 日

表格

摘要

这是一篇关于勾股定理的小短文。其中内容可能包含文字、公式、图形、表格等。

目录

*省教育厅项目资助

[†]沈阳建筑大学理学院

[‡]沈阳建筑大学理学院

[§]沈阳电视大学文法学院

1 勾股定理在古代

西方称勾股定理为毕达哥拉斯定理，将勾股定理的发现归功于公元前 6 世纪的毕达哥拉斯学派 [?]. 该学派得到了一个法则，可以求出可排成直角三角形三边的三元数组。毕达哥拉斯学派没有书面著作，该定理的严格表述和证明则见于欧几里得¹《几何原本》的命题 47: “直角三角形斜边上的正方形等于两直角边上的两个正方形之和。”证明是用面积做的。《周髀算经》载商高 (约公元前 12 世纪) 答周公问:

勾广三，股修四，径隅五。

又载陈子 (公元前 7-6 世纪) 答荣方向

若求邪至日者，以日下为勾，日高为股，勾股各自乘，并而开方除之，得邪至日。

都较古希腊更早，后者已经明确到处勾股定理的一般形式。图??是我国古代对勾股定理的一种证明 [?]

¹欧几里得，公元前 330-275 年。



图 1: 《周髀算经》中做的弦图（仿制），该图给出了勾股定理的一个极具对称美的证明。

勾股定理可以用现代语言装述如下·

2 勾股定理的近代形式

定理 1 (勾股定理) 直角三角形斜边的平方等于两腰的平方和。

可以用符号语言表述为：设直角三角形 ABC ，其中 $\angle C = 90^\circ$ ，则有

$$AB^2 = BC^2 + AC^2. \quad (1)$$

满足式 (??) 的整数称为勾股数。第 ?? 节所说毕达哥拉斯学派得到的三元数组就是勾股数。下表列出一些较小的勾股数：

(??) 读入书签 gougou;emph 勾股数，强调勾股数；?? 读入书签 ancient；

另起一行。

直角边 a	直角边 b	斜边 c
3	4	5
5	12	13

$$(a^2 + b^2 = c^2)$$

参考文献

- [1] 矢野健太郎. 几何的有名定理. 上海科学技术出版社, 1986.
- [2] 曲安金. 商高、赵爽与刘徽关于勾股定理的证明. 数学传播, 20(3), 1998.
- [3] 克莱因. 古今数学思想. 上海科学技术出版社, 2002.

A 附录

勾股定理又叫商高定理，国外也称百牛定理。