

マニュアル内の食い違いと「きゅうり生育予測ノート」での対応表

基準：岩手県農業研究センター『施設きゅうりの摘心栽培における生育予測に基づいた栽培管理法導入マニュアル ver.1.0』（令和8年4月）  
対象：きゅうり生育予測ノート（GitHub Pages 版、2026-09-25 時点） | ページ番号はマニュアル下部のノンブル

| 対応済み 5 項目 食い違いのどちらを採るかを決定、画面・READMEに根拠を明記 |             | 一部対応 1 項目 影響を抑える作りにしたが、食い違い自体への手当ては残る                                                                     |      | 未対応 1 項目 マニュアルの一方の記述をそのまま採用している                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | 対象外 1 項目 表記の誤りで、アプリの計算には影響しない |  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| #                                         | 項目          | マニュアル内の食い違い                                                                                               | 状況   | アプリでの扱い（該当箇所）                                                                                                                                                                                                                         | 今後の対応案                                                                                                |                               |  |
| 1                                         | DIFの向き      | 本文p.15・図2-1は「DIF大＝節間が伸びて栄養成長」。表2-7と図4-1は「栄養へ＝DIF小さく」で逆。図5-9でもDIF→節間伸長は負（n.s.）。                            | 対応済み | 表2-7・図4-1の向きに統一（2026-09-24に変更）：プラスDIF（昼高夜低）＝節間伸長・果実肥大で生殖成長優勢、DIF短縮・マイナス＝節間伸長抑制・樹勢維持で栄養成長へ。推奨管理の「昼夜温差 DIF」行と早見表をこの向きで表示し、本文p.15とは逆である旨を明記。節間長の読み方（表3-1）は変えず、「DIFを大きくした直後は節間長が伸びて栄養側に見えることがある」と注記。<br>いまの生育＞推奨する栽培管理・早見表／README「DIFの向き」 | 本文p.15の記述とどちらが正しいか、作成元に確認する。                                                                          |                               |  |
| 2                                         | 表2-10のモデル区分 | DIF 12.2℃のモデルⅤが「生殖成長」、DIF 7.3℃のモデルⅠが「栄養成長」で、本文の「DIF大＝栄養」と逆に見える。                                           | 対応済み | DIFの向きを表2-7にそろえたことで、モデルⅠ・Ⅱ（DIF 7.3～7.9＝栄養）とモデルⅤ（DIF 12.2＝生殖）が同じ向きになり、食い違いはほぼ解消。区分は高温時間帯・夕方の降温にもよるため、「モデルのDIFと昼夜温差の行が合わないときは昼夜温差の行を優先」と注記。モデルは「草勢の方向×節間長の振れ幅」で選び、理由を表示。<br>いまの生育＞変温管理モデル／README「管理方針の決め方」                              | （現状維持）                                                                                                |                               |  |
| 3                                         | 平均気温の効果     | p.15は「平均気温が低いと草勢が強い」（一般則）。p.29は「気温上昇で早熟作型は草勢弱、抑制作型は草勢強」と作型で逆。                                             | 未対応  | p.15と表2-7の一般則のみを採用（草勢を強める＝平均気温を下げる、弱める＝上げる）。ハウスに作型（早熟・抑制など）は登録できるが、表示と書き出しにしか使っておらず、気温の向きには反映していない。                                                                                                                                   | 直近の実測の平均気温が生育適温（昼25～28℃・夜13～16℃、p.14）より低い時期は、「気温を上げると草勢が強まる」向きに切り替える。作型ではなく実測気温で判定する方が、年や地域の差にも対応できる。 |                               |  |
| 4                                         | 生育→収量のタイムラグ | p.26「最短7日」に対し、同じ文の95%信頼区間が「10～16日」で、推定値が区間の外。                                                             | 対応済み | この日数は計算に使っていない（生育から収量を予測する機能はない）。回帰分析のラグは固定せず、0～30日を自動で探索し、そのハウスのデータで最も相関の強い日数を採用。<br>回帰分析＞ラグ日数の自動探索                                                                                                                                  | 収量の見通しを表示する場合は、7日と決め打ちせず「7～16日後」の幅で示す。                                                                |                               |  |
| 5                                         | 環境→生育のタイムラグ | 気温→茎径が、p.27本文は14日（11～17日）、表5-3は7日。CO <sub>2</sub> →茎径も本文18日／表17日。                                         | 一部対応 | No.4と同じく回帰分析のラグは自動探索で、どちらの値にも依存しない。説明文は「環境の変化が生育に表れるまで7～14日」と幅で表記。一方、推奨管理は「向こう約1か月」を一律に示しており、指標ごとのタイムラグは反映していない。<br>回帰分析の説明文／README 回帰分析の章                                                                                            | 推奨管理の表示に「効き始めは7～14日後」を添え、変更を急がないよう注意書きを加える。                                                           |                               |  |
| 6                                         | 茎径か茎周か      | 表3-1は茎径（mm）、p.20は摘心栽培で茎周を推奨しない。一方、解析図（図5-1・5-6～5-8）の凡例は「茎周」。                                              | 対応済み | 「茎径mm」で統一（表3-1）。入力欄の上に「直径をノギスで測る。茎周で測らない。途中で変えると平準点がずれる」と注記（09-25）。<br>いまの生育＞生育調査を記録する／README                                                                                                                                         | 周期の日数（16日）が茎周データ由来かどうかは作成元に確認する。                                                                      |                               |  |
| 7                                         | N/K比の範囲     | 表2-5の目安は0.6～1.5。実証（p.32）ではN/K比2.5の液肥（住友液肥1号）を使用。                                                          | 対応済み | N/K比が0.6～1.5を外れる液肥は、一覧・候補・入力欄に「目安の範囲外」と表示し、候補1位が範囲外なら注意書きを出す。見本の住友液肥1号のメモにも明記、液肥CSVに列を追加（09-25）。<br>ライブラリ＞液肥／かん水と液肥＞液肥の候補                                                                                                             | （現状維持）                                                                                                |                               |  |
| 8                                         | 表記の誤り       | 目次と本文で追補1・2の題が逆。図4-2が2つ。表4-10の「p.13再掲」は実際p.14。図4-3のCO <sub>2</sub> 単位「%」（ppm）・横軸名「DIF（日）」。第2章の節番号が4→7に飛ぶ。 | 対象外  | 計算には影響しない。アプリとREADMEでの参照は本文側の名称とノンブルにそろえている（例：追補1＝現地事例の解析、表5-1、図4-2＝管理強度の図、p.15）。                                                                                                                                                     | （作成元への報告のみ）                                                                                           |                               |  |

・「対応済み」は、食い違いのどちらを採るかを決めてアプリに反映し、その根拠を画面またはREADMEに書いたものを指す。マニュアルの食い違いそのものが解消したわけではない。

・変更履歴：09-24改訂でNo.1 DIFの向きを表2-7・図4-1にそろえNo.2を更新。09-25版でNo.6（茎径の測り方の注記）とNo.7（N/K比の範囲外表示）を実装し「対応済み」に変更。No.3・No.5の対応案は未実装。