

Dezfouli バンディットデータ — サマリ

概要

Dezfouli et al. (2019) による 2 択バンディット課題の行動データ。
単極性うつ病 (MDD)・双極性障害 (BD)・健常対照 (HC) を対象とする。
本レポートは前処理済みデータのグループ別記述統計をまとめたもの。

コホート

MDD 34 名 (元ラベル: Depression)
BD 33 名 (元ラベル: Bipolar)
HC 34 名 (元ラベル: Healthy)
合計 101 名 ・ 各被験者 12 系列 ・ 計 1,212 系列 ・ 132,251 試行。

課題設計

各被験者は 12 系列を実施 = 6 つの報酬確率条件 × 2 つの実験ブロック。
腕 R1 が常に良い選択肢 (条件により報酬率 $\approx 0.08 \sim 0.25$)、R2 ≈ 0.05 。

デモグラフィック

公開ファイルに含まれる被験者単位の変数は、診断ラベル・躁スコア・抑うつスコア・平均押下速度のみ。年齢・性別・IQ・学歴・服薬などの情報は含まれていない。

出所・ライセンス

取得元: github.com/adezfouli/rnn_hypercoder (data/BD/, Apache-2.0)。
正典データは Figshare の記事 8257259 にも公開。
利用時は Dezfouli et al. (NeurIPS 2019; PLOS Comput Biol 2019) を引用。

グループ別 記述統計

被験者単位の値を 平均 ± 標準偏差 で集計。


指標	HC (n=34)	MDD (n=34)	BD (n=33)
抑うつスコア	1.50 ± 2.06	14.32 ± 7.10	8.76 ± 6.53
躁スコア	0.09 ± 0.38	2.44 ± 5.43	4.42 ± 5.84
押下速度 (秒)	1.65 ± 0.48	1.74 ± 0.57	1.51 ± 0.42
報酬率	0.114 ± 0.010	0.107 ± 0.011	0.108 ± 0.009
良い腕R1選択率	0.51 ± 0.06	0.51 ± 0.09	0.53 ± 0.06
総試行数	1313 ± 333	1379 ± 383	1234 ± 292

補足：
・臨床スコアは想定どおりグループを分離：抑うつは MDD が最高、躁は BD が最高。
・行動指標のグループ差は小さい — 課題の報酬確率が低いため (R1 ≈ 0.08~0.25 に対し R2 ≈ 0.05)、良い腕への選好は全群で弱い。
・記述統計のみで、群間の統計的検定は行っていない。

グループ別 基本統計量（被験者単位）

Dezfouli バンディットデータ — グループ別基本統計量（被験者単位）

● HC（健常） ● MDD（単極性うつ） ● BD（双極性）



系列内での学習曲線（グループ別）

