

סיכום למידת מכונה - תשפ"ו 2026

23 במרץ 2026

גיא יער-און

הסיכום נכתב במהלך סמסטר ב' תשפ"ו (2026), ומבוסס על הרצאותיהם של פרופסור גל צצ'ק, ד"ר אורי שוהם וד"ר אורן גליקמן, לכן יתכן שנפלו טעויות בסיכום, כך שהשימוש בו על אחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1	הרצאה 1	1
1	1.1 רקע מתמטי לקורס	
6	1.2 הגרדיאנט (Gradient)	
8	2 הרצאה 2	2
8	2.1 למידה מונחית (Supervised learning)	
10	2.1.1 איך נוכל להפחית overfitting?	
10	2.2 תאוריית ההחלטה של בייס - Bayes decision theory	
14	2.3 The Bias-Variance Trade-off	
16	2.4 Underfitting ו Overfitting	
17	2.5 Cross Validation	
18	3 הרצאה 3	3
18	3.1 Parameter estimation (הערכת פרמטרים)	
18	4 הרצאה 4	4
18	5 הרצאה 5	5
18	6 הרצאה 6	6
18	7 הרצאה 7	7
18	8 הרצאה 8	8
18	9 הרצאה 9	9
18	10 הרצאה 10	10
18	11 הרצאה 11	11

1 הרצאה 1

1.1 רקע מתמטי לקורס

הגדרה 1. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$. הוקטורים $v \in \mathbb{R}^d$ כך שהפעלת A עליהם לא תשנה את הכיוון שלהם נקראים **וקטורים עצמיים**. כלומר, מתקיים $Av = \lambda v$, כך ש $\lambda \in \mathbb{C}^d$ נקרא **ערך עצמי** ול $\frac{v}{\|v\|}$ נקרא וקטור עצמי המתאים ל λ .

הערה 2. תמיד ננרמל את הוקטורים העצמיים.

הערה 3. בפועל, וקטור עצמי הוא וקטור שהפעלת המטריצה עליו רק משנה את גודל הוקטור, ולא את הכיוון. המטריצה משנה את הגודל בהתאם ל λ , הערך העצמי.

הערה 4. באופן כללי: כאשר מטריצה A פועלת על וקטור v , מתקבל הוקטור Av . A משנה את v באופן לינארי: סיבוב + הזזה.

משפט 5. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית. ויהי λ ע"ע של A . אזי, λ בהכרח ממשי.

הערה 6. לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ישנם d ע"ע מעל $\mathbb{C}$ (הם לא בהכרח שונים זה מזה, ויכולים להיות מרוכבים).

הגדרה 7. המכפלה הסקלרית הסטנדרטית בהינתן $v_1 = (x_1, \dots, x_n), v_2 = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ מוגדרת כך:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = v_1^T v_2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

הגדרה 8. יהיו שני וקטורים $v, u \in \mathbb{R}^n$.

א. נאמר כי u, v הם אורתוגונליים אם, ורק אם $\langle v, u \rangle = v^T u = 0$
 ב. נאמר כי u, v הם אורתונורמליים אם הם אורתוגונליים וגם $\|v\| = \sqrt{v^T v} = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = 1$

משפט 9. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית, ויהיו $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^d$ ו"ע השייכים לע"ע המתאימים $\lambda_1 \neq \lambda_2$. אזי, v_1 ו- v_2 אורתוגונליים (ולכן אורתונורמליים) זה לזה.

הוכחה: מתקיים $Av_1 = \lambda_1 v_1$ ו- $Av_2 = \lambda_2 v_2$ ולכן:

$$\lambda_2 v_1^T v_2 = v_1^T \lambda_2 v_2 = v_1^T A v_2 = v_1^T A v_2 = v_1^T A^T v_2 = (A v_1)^T v_2 = (\lambda_1 v_1)^T v_2 = \lambda_1 v_1^T v_2$$

$$\implies (\lambda_1 - \lambda_2) v_1^T v_2 = 0$$

כיוון ש- $\lambda_1 \neq \lambda_2$ הרי ש- $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ ולכן $v_1^T v_2 = 0$ כלומר $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, ולכן v_1, v_2 אורתוגונליים. כנדרש.

■

משפט 10. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית. אזי,

א. A לכסינה.

ב. קיים לה בסיס אורתונורמלי של ו"ע של $\mathbb{R}^d$.

משפט 11. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית בעלת הע"ע $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ כך ש- $\lambda_i \geq 0, \forall 1 \leq i \leq n$. אזי לכל וקטור $z \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $z^T A z \geq 0$.
הוכחה: A סימטרית ולכן קיים לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים (לפי משפט לעיל), נסמנו $\{v_1, \dots, v_d\}$. מכאן, כל וקטור z ניתן לכתוב כצירוף לינארי של הו"ע כך: $z = \sum_{i=1}^d c_i v_i$, באשר $\{c_i\}_{i=1}^d$ המקדמים. כעת:

$$Az = A \times \sum_{i=1}^d c_i v_i = \sum_{i=1}^d c_i \times A v_i = \sum_{i=1}^d c_i \lambda_i v_i$$

כעת, נעבור לביטוי $z^T A z$:

$$z^T A z = \left(\sum_{i=1}^d c_i v_i \right)^T \left(\sum_{j=1}^d c_j \lambda_j v_j \right) \implies \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d c_i c_j \lambda_j (v_i^T v_j)$$

לפי הגדרת בסיס אורתונורמלי, אם $i \neq j$ הרי ש- $v_i^T v_j = 0$ ואחרת $v_i^T v_i = 1$. (נורמלי). כלומר, כל האיברים בהם $i \neq j$ מתאפסים ונשאר עם האיברים בהם $i = j$, ולכן:

$$\implies \sum_{i=1}^d c_i^2 \lambda_i \geq 0$$

שכן, $\{\lambda_i\}_{i=1}^n \geq 0$ ולכן סה"כ קיבלנו $z^T A z \geq 0$, כנדרש.

■

הגדרה 12. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$. אזי,

1. נאמר כי A היא PSD (Positive Semi Definite) אם לכל $z \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $z^T A z \geq 0$
2. נאמר כי A היא PD (Positive Definite) אם לכל $z \in \mathbb{R}^d$ מתקיים $z^T A z > 0$

משפט 13. תהי $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ סימטרית. אזי, כל הע"ע של A הם אי שליליים אמ"מ A היא PSD . בדומה, כל הע"ע של A הם חיוביים ממש אמ"מ A היא PD .

הוכחה:

$\Leftarrow$ לפי משפט 10.

$\Rightarrow$ יהי λ ע"ע עם ו"ע תואם לו v המקיים $\|v\| = 1$ (מנורמל). אזי,

$$0 \leq v^T A v = v^T \lambda v = \lambda v^T v = \lambda \|v\|^2 = \lambda \cdot 1 = \lambda$$

כנדרש.

14. $\hat{n}$ מסקנה ממשפט 13: מטרית PSD היא גם סימטרית, וגם כל הערכים העצמיים שלה אי שליליים.

15. $\hat{a}\hat{o}\hat{a}\hat{a}$ תהי מטריצה $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. נאמר כי A אורתוגונלית אם $A^T A = A A^T = I$.

16. $\hat{a}\hat{o}\hat{o}\hat{a}$ בפועל, במטריצה אורתוגונלית הכוונה כי כל זוג שורות ועמודות במטריצה הם אורתוגונליים זה לזה ואורתונורמליים (מאונכים, בגודל וקטור יחידה).

17. הערה. אם נפעיל וקטור על מטריצה אורתוגונלית וגם PSD - מה יקרה? נזכר כי הע"ע של מטריצה אורתוגונלית הם ± 1 . כיוון שהיא PSD , אזי רק 1 הוא ערך עצמי. לכן לא יקרה כלום.

משפט 18. (כלל בייס). יהיו A, B זוג מאורעות. אזי, $Pr(A|B) = \frac{Pr(B|A)Pr(A)}{Pr(B)}$

הגדרה 19. יהיו 2 משתנים מקריים X ו Y . כך ש X מקבל ערכים $x_1, \dots, x_k$ עם ההסתברות $Pr(X = x_i)$ ו Y מקבל ערכים $y_1, \dots, y_k$ עם ההסתברות $Pr(Y = y_i)$. אזי, נגדיר את ההתפלגות המשותפת שלהם $Pr(X = x_i, Y = y_i)$. נוכל להכליל זאת עבור d משתנים מקריים $\{X_i\}_{i=1}^d$, כך שכל X_i מקבל ערכים $X_i^1, \dots, X_i^{k_i}$ וההתפלגות המשותפת שלהם הינה:

$$Pr(X_1 = x_1, \dots, X_d = x_d)$$

כמו כן, נוכל להגדירו כמשתנה מקרי יחיד רב ממדי, וקטור $X = (X_1, \dots, X_d)$ ולשאול מתי הוא מקבל את הערך $(x_1, \dots, x_d)$.

הגדרה 20. נגדיר את התוחלת של משתנה מקרי רב ממדי להיות וקטור רב ממדי של התוחלות כך:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = (\mathbb{E}[X_1], \dots, \mathbb{E}[X_d])$$

הגדרה 21. יהיו X, Y זוג משתנים מקריים. נגדיר את $Covariance$ שלהם להיות השונות המשותפת שלהם, בצורה הבאה:

$$Cov(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

מדד זה בודק כמה ישנו קשר בניהם, בפרט אם $Cov(X, Y) > 0$ אזי ישנו קשר חיובי בין השניים (עולים יחד), אם $Cov(X, Y) < 0$ אזי ישנו קשר שלילי בין השניים (אחד עולה, השני יורד) ואם $Cov(X, Y) = 0$ אזי אין קשר לינארי בניהם.

משפט 22. כל ההבאים מתקיימים:

א. $Cov(X, X) = Var(X)$

ב. $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$

ג. $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$

ד. אם X, Y ב"ת אזי הם בלתי מתואמים.

הגדרה 23. נגדיר את מטריצת $Covariance$ באופן הבא:

$$\begin{pmatrix} Cov(X, X) & Cov(X, Y) \\ Cov(Y, X) & Cov(Y, Y) \end{pmatrix}$$

ונבחין כי היא מטריצה סימטרית.

הגדרה 24. יהי $X = (X_1, \dots, X_d)$ משתנה מקרי רב ממדי, נגדיר את מטריצת Covariance כך:

$$\Sigma = \text{Cov}(X) = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_1) & \dots & \dots & \text{Cov}(X_1, X_d) \\ & \text{Cov}(X_2, X_2) & & \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_1, X_{d-1}) & \dots & \dots & \text{Cov}(X_d, X_d) \end{pmatrix} = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(X - \mathbb{E}[X])^T]$$

הערה 25. לכל $i, j \in [n]$ מתקיים כי $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$ כאשר בתא זה של המטריצה ישנו ערך Covariance בין שני המשתנים.

הערה 26. המטריצה Σ היא מטריצה סימטרית, לכן היא לכסינה אורתוגונלית, כמו כן, המטריצה היא PSD ולכן כל הע"ע שלה הם אי שליליים לפי משפט שראינו קודם.

משפט 27. מטריצת Σ היא PSD, כלומר לכל וקטור $z \in \mathbb{R}^d$ שונה מאפס מתקיים $z^T \Sigma z \geq 0$.
הוכחה:

$$z^T \Sigma z =_{\text{def}} z^T \mathbb{E}[(X - \mu)(X - \mu)^T] z$$

כעת, כיוון ש z הוא וקטור קבוע, הרי מתקיים עבור קבוע $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$ ותכונה זו נכונה גם עבור וקטור קבוע, ולכן נוכל להכניסו:

$$= \mathbb{E}[z^T (X - \mu)(X - \mu)^T z]$$

נבחין כי $z^T (X - \mu)$ הוא מכפלה סקלרית (וקטור שורה, כפול וקטור עמודה), לכן תוצאתו סקלר. הביטוי השני, הוא בדיק טרנספוז של סקלר זה. כיוון שטרנספוז של סקלר שווה לסקלר עצמו, הרי שנוכל לכתוב כי:

$$= \mathbb{E}[(z^T (X - \mu))(z^T (X - \mu))^T] = \mathbb{E}[(z^T (X - \mu))^2] \geq 0$$

שהרי המעבר האחרון נובע מכך שאם m הוא אי שלילי, גם התוחלת שלו היא אי שלילית. כנדרש.

■

הגדרה 28. יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ משתנה מקרי גאוסיאני (נורמלי), אזי פונקציית הצפיפות שלו מקיימת:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

הגדרה 29. יהי X וקטור רב ממדי, כך ש $X \in \mathbb{R}^d$, המתפלג גאוסיאני $X \sim N(\mu, \Sigma)$, אזי פונקציית הצפיפות שלו מקיימת:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x-\mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (x-\mu)}$$

באשר x הוא וקטור הקלט, μ הוא וקטור התוחלת, Σ היא מטריצת Covariance (קובעת את "צורת" הפעמון), $\det(\Sigma)$ היא הדטרמיננטה של המטריצה. הביטוי במעריך מחליף את הריבוע בנוסחה המקורית, והוא מודד כמה רחוק x מהמרכז μ , אך הוא מתחשב בCovariance. מרחק זה נקרא Mahalanobis Distance.

הערה 30. מאוד חשוב לשים לב - משתנה רב ממדי מתפלג נורמלי כאשר Σ מייצגת את השונות, נבחין כי למשתנה רב ממדי אין שונות כערך מספרי בודד, אלא מטריצת Covariance שעל האלכסון מייצגת את השונות של הערכים $\{X_i\}_{i=1}^d$.


ישנם כמה מקרים פרטיים שנרצה לדון בהם:

1. מקרה ראשון - $\Sigma = I$: במקרה זה יתקיים,

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \|X - \mu\|^2}$$

כאן כל השנויות שוות לאחד, וכן כל זוג מימדים $x_i \neq x_j$ בלתי מתואמים, כלומר $Cov(X_i, X_j) = 0$. לבסוף, קיבלנו כי ההסתברות של הוקטור הנ"ל תלויה אך ורק במרחק הגאומטרי הישיר שלה מהמרכז (μ) . יש צפיפות גבוהה מאוד סביב התוחלת, ואם נחפש את כל הנקודות שיש להן את אותה הסתברות נקבל את המשוואה $\|X - \mu\|^2 = c$ באשר במרחב דו ממדי מדובר במעגל, ובמרחב רב ממדי על כדור.

לדוגמה: נקודות שנלקחות מתוך התפלגות המקיימת $\Sigma = I$, ענן הנקודות נראה כמו עיגול סימטרי, הסיבה היא כי על האלכסון יש רק 1 ולכן השונות של x שווה בדיוק לשונות של y : הפיזור לגובה שווה לפיזור לרוחב. כיוון שהערכים מחוץ לאלכסון הם אפס, אין קשר בין המשתנים, לכן הם בלתי מתואמים ולכן ענן הנקודות לא נוטה באלכסון. כמו כן, רוב הנקודות קרובות ל $(0,0)$, כיוון שכאן מתקיים $\mu = (0,0)$.



2. מקרה שני - Σ היא מטריצה אלכסונית: כלומר: $\Sigma =$ נפתח אלגברית מעט:

$$\begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \sigma_2^2 & & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \sigma_d^2 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x-\mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \times (x-\mu)} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{d}{2}} \sqrt{\prod_{i=1}^d \sigma_i^2}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (x-\mu)^T \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \frac{1}{\sigma_2^2} & & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{\sigma_d^2} \end{pmatrix} \times (x-\mu)}$$

$$= \prod_{i=1}^d \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}\right)$$

נתעכב להסביר את החלק הכי פחות טריוואלי, המעריך. הרי $x - \mu$ הוא וקטור, נוכל לסמן את ערכיו על מנת שיהיו לנו חיים קלים ע"י

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \frac{1}{\sigma_2^2} & & \vdots \\ 0 & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \frac{1}{\sigma_d^2} \end{pmatrix} \times (x - \mu) = \begin{pmatrix} \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1^2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{x_d - \mu_d}{\sigma_d^2} \end{pmatrix}, \text{ מכאן, } \{x_i - \mu_i\}_{i=1}^d$$


שמקבל את הערכים $\{x_i - \mu_i\}_{i=1}^d$, מכאן מדובר במכפלה סקלרית:

$$(x_1 - \mu_1, \dots, x_d - \mu_d) \times \begin{pmatrix} \frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1^2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{x_d - \mu_d}{\sigma_d^2} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^d \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2}$$

לאחר מכפלה ב $-\frac{1}{2}$, מקבלים את הדרוש.

שוב, תהיה צפיפות סביב μ גבוהה מאוד, אך הפעם בדימוי מדובר בצורת אליפסה (ולא במעגל) וברב מימד צורות מעניינות אף יותר ככל שהמימד ימשיך לגדול.

דוגמה: כאן, אכן מדובר במטריצה אלכסונית. בדוגמה משמאל נראה כי שונות x היא 2, והשונות בציר y היא 1 ולכן ציר x נראה מתוח יותר לצדדים וקיבלנו אליפסה אופקית. בדוגמה מימין, זה בדיוק הפוך, קיבלנו אליפסה אנכית כיוון שהשונות בציר y גדולה מהשונות בציר x .



משפט 31. יהי $X = (X_1, \dots, X_d)$ משתנה מקרי רב ממדי גאוסיאני $X \sim N(\mu, \Sigma)$. אזי, $X_i | X_j$ גאוסיאן (כלומר, גם אם יודעים ערך של אחד מ- $\{X_i\}_{i=1}^d$ אזי עדיין המשתנה הרב ממדי מממד קטן יותר הוא גאוסיאן, וכן $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, \dots, x_d) dx_1$ גאוסיאן גם כן).

משפט 32. אם מטריצת Σ Covariance היא מטריצה אלכסונית (כלומר לכל $i \neq j$ מתקיים $Cov(X_i, X_j) = 0$) אזי $\{X_i\}_{i=1}^n$ הם ב"ת.

הערה 33. לא כטענה אך לשים לב: כל תזוזה לינארית (כולל הכפלה במטריצה וכו') של גאוסיאן היא גאוסיאן.

1.2 הגרדיאנט (Gradient)

הערה 34. מהו הגרדיאנט? מדובר בוקטור, ש"זוכר" את כל הנגזרות החלקיות של פונקציה בכמה משתנים. במקום להסתכל רק על כיוון אחד, הגרדיאנט מייצג את השיפוע של הפונקציה בכל הכיוונים בבת אחת. הוא אומר לנו באיזה כיוון הפונקציה עולה הכי מהר ובאיזו עוצמה. ופורמלית:

הגדרה 35. תהי פונקציה $f(x_1, x_2, \dots, x_d)$ המוגדרת בתחום $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. נגדיר את הגרדיאנט של f כך:

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d} \right]$$

הגדרה 36. תהי f פונקציה, נגדיר את **קצב השינוי של הפונקציה** f בנקודה x לאורך כיוון u **כנגזרת הכיוונית** של f בכיוון u (כאשר u הוא וקטור יחידה כלומר $\|u\| = 1$) כך:

$$D_u f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hu) - f(x)}{h}$$

משפט 37. תהי $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בנקודה $x \in \mathbb{R}^d$. אזי, קצב השינוי של הפונקציה f בנקודה x בכיוון וקטור יחידה u הוא מקסימלי כאשר u בכיוון הגרדיאנט.

הוכחה: תהי f פונקציה גזירה, אזי הקירוב עבורה מסדר ראשון יהיו:

$$f(x + hu) \approx f(x) + \nabla f(x) \cdot (hu) + \varepsilon(h)$$

באשר $\varepsilon(h)$ מסמלת שארית ששואפת לאפס כאשר $h \rightarrow 0$. מכאן, נציב בהגדרת הנגזרת הכיוונית:

$$D_u f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + \nabla f(x) \cdot (hu) + \varepsilon(h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\nabla f(x) \cdot (hu) + \varepsilon(h)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\varepsilon + \nabla f(x) \cdot u) = \nabla f(x) \cdot u$$

מסקנה: קצב השינוי של הפונקציה בכיוון u הוא המכפלה הסקלרית $\nabla f(x) \cdot u$. נעזר באי שוויון שורץ: $a \cdot b \leq \|a\| \cdot \|b\|$ ונקבל:

$$D_u f(x) = \nabla f(x) \cdot u \leq \|\nabla f(x)\| \cdot \|u\|$$

אנו מניחים כי u וקטור יחידה והרי $\|u\| = 1$ ומכאן:

$$D_u f(x) \leq \|\nabla f(x)\|$$

כלומר, הערך המקסימלי של $D_u f(x)$ חסום ע"י $\nabla f(x)$ ויש שוויון לפי א"ש שוורץ רק כאשר הוקטורים תלויים זה בזה, מכאן: הפונקציה משתנה הכי מהר בכיוון $\nabla f(x)$.

■

משפט 38. נגדיר את הפונקציה $f(x) = x^T x = \|x\|^2$. אזי, $\nabla f(x) = 2x$.
הוכחה: נבחין כי אם נסמן $x = (x_1, \dots, x_d)$ הרי שמתקיים לכל $1 \leq i \leq d$ כי:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} x^T x = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^d x_j^2 \right) = 2x_i$$

$$\nabla f(x) = (2x_1, \dots, 2x_d) = 2x, \text{ ולכן,}$$

■

הגדרה 39. מטריצת הסיאן (*Hessian*) היא מטריצה ריבועית שמגדירה את הנגזרות החלקיות מסדר שני. כלומר,

$$H_f = \nabla^2 f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_d} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_d \partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_d^2} \end{pmatrix}$$

משפט 40. נגדיר את התבנית הריבועית $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x$ כאשר A היא מטריצה סימטרית ממיד d . אזי, $\nabla^2 f = A$.
הוכחה: בשלב ראשון נראה כי:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} \left(\frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \right) =$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} \left(\frac{1}{2} \left(\sum_{i,j \neq k} a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=k, j \neq k} a_{kj} x_k x_j + \sum_{j=k, i \neq k} a_{ik} x_i x_k + a_{kk} x_k^2 \right) \right) =$$

$$\frac{1}{2} \left(\sum_{j \neq k} a_{kj} x_j + \sum_{i \neq k} a_{ik} x_i + 2a_{kk} x_k \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^d a_{ik} x_i + \sum_{j=1}^d a_{ki} x_i \right) = \sum_{i=1}^d a_{ik} x_i = (Ax)_k$$

המעבר * נכון כיוון ש A סימטרית ולכן $a_{ik} = a_{ki}$. מכאן,

$$\nabla f = \begin{bmatrix} (Ax)_1 \\ (Ax)_2 \\ \vdots \\ (Ax)_d \end{bmatrix} = Ax$$

$$H_f = \nabla^2 f = \frac{\partial f}{\partial x} (\nabla f(x)) = \frac{\partial f}{\partial x} (Ax) = A, \text{ ומכאן,}$$

■

הגדרה 41. פונקציה היא קמורה אם הקטע שמחבר כל זוג נקודות על גרף הפונקציה נמצא מעל או על הגרף עצמו. פורמלית, לכל $0 \leq t \leq 1$ ולכל x, y :

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$$

הערה 42. אנחנו נעדיף פונקציות הפסד קמורות, כיוון שבהן כל מינימום מקומי הוא בהכרח מינימום גלובלי. כלומר - אם מצאת נקודה בה השיפוע הוא אפס (נקודת מינימום מקומית), היא בהכרח תהיה הנקודה הנמוכה ביותר בכל הפונקציה.

משפט 43. תהי f פונקציה גזירה פעמיים בתחום קצור. f היא פונקציית קמורה אם ורק אם מטריצת ההסיאן שלה $H_f(x)$ היא PSD.

2 הרצאה 2

2.1 למידה מונחית (Supervised learning)

המטרה שלנו תהיה לנסות ללמוד איזושהי "חוקיות" מהעולם. בשביל שנוכל ללמוד חוקיות - אנו זקוקים למידע, $data$.

נתוני האימון - (Training Data): בהינתן n זוגות של דגימות מהצורה $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, כך ש $x_i \in X, y_i \in Y$, $\forall 1 \leq i \leq n$, כך ש x_i הוא הקלט שלקוח מעולם קלטים X וכן y_i הוא הפלט (או התווית) מתוך עולם של פלטים שנקרא Y . לדוגמה: x_i הוא תמונה, y_i יכול להיות התיאור "חתול". ישנה הנחת יסוד לפיה קיימת התפלגות כלשהי $P(X, Y)$ אינה ידועה לנו שממנה מגיעים זוגות אלו. התפלגות זו מייצגת פונקציה $f: X \rightarrow Y$ שאותה נרצה למצוא.

המטרה: נרצה למצוא פונקציה $h: X \rightarrow Y$ שתקרא היפותזה, היא תהיה ההיפותזה שלנו: היא "תחק" את הפונקציה הנסתרת f בצורה הכי טובה שאפשר. לשם כך נגדיר את המדד הבא -

הגדרה 44. מדד ההפסד ($Loss$): נגדיר מדד הפסד ונסמנו $\ell(h(x), y)$ - מדד זה מודד חוסר התאמה בין מה שחזינו ($h(x)$) לבין המציאות (y). בפועל, נחפש פונקציה h שתביא למינימום את Expected Loss - הממוצע המשוקלל של הטעויות שלנו על פני כל המקרים האפשריים לפי ההתפלגות $P(x, y)$ ומוגדר כך:

$$\mathbb{E}_{P(X,Y)}[\ell(h(x), y)] = \sum_{(x,y)} \ell(h(x), y) \cdot p(x, y)$$

הגדרה 45. (מרחב ההיפותזות): נסמן ב $\mathcal{H}$ את מרחב ההיפותזות - מדובר במשפחה מוגדרת של פונקציות שממנה אנחנו "בוחרים" את פונקציית ההפסד. כל פונקציה $h \in \mathcal{H}$ במרחב זה מאופיינת ע"י פרמטרים שנקראים w , אנו מחפשים $h \in \mathcal{H}$ הטובה ביותר שקיימת במרחב ההיפותזות.

את תהליך הלמידה נוכל לחלק לשני חלקים מרכזיים, נפרדים ומשלמים:

1. **Training Phase (שלב האימון):** זהו השלב שבו המחשב "לומד". אנו נותנים לאלגוריתם הלמידה את נתוני האימון שלנו - זוגות $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$. כפלט, האלגוריתם מוציא מודל אותו נסמן ב h_w . המשמעות היא שה h מייצג את הפרמטרים שהאלגוריתם מצא כדי שהפונקציה h תתאים בצורה הטובה ביותר לנתונים.

2. **inference Phase (שלב ההסקה/יישום):** זהו השלב שבו אנחנו משתמשים במה שלמדנו על נתונים חדשים שלא ראינו קודם לכן. אנו לוקחים את המודל הנלמד h_w ומפעילים אותו על קלט חדש x , אנו חוזים את y המתאים למעשה ע"י חישוב פשוט של הפונקציה $h_w(x)$.

הערה 46. בעיות של למידה מונחית מחולקות לרוב לפי סוג הפלט (Y). כאשר סוג הפלט הוא משתנה קטגורי בדיד נקרא לבעיה מסוג Classification (בעיה מסוג סיווג). כאשר סוג הפלט הוא משתנה רציף נקרא לבעיה מסוג Regression (רגרסיה).

לצורך דוגמה, נוכל לבחור באופן ספציפי את מרחב ההיפותזות $\mathcal{H}$ להיות פולינומים מדרגה d . פורמלית, נגדיר את $h_w(x)$ כסכום ממושקל של חזקות x , כך:

$$h_w(x) = w_0 + w_1x + w_2x^2 + \dots + w_dx^d$$

כאשר w 'ים (המשקולות) הם הפרמטרים של המודל שאנו מחפשים בשלב האימון. למה שנרצה לבחור את משפחת הפולינומים? מדובר בסט עשיר מאוד - שיכול לקרב כמעט כל פונקציה שהיא רציפה בצורה טובה. כלומר, הקירוב יהיה טוב. נוכל למצוא פרמטרים $\{w_i\}_{i=1}^d$ שיהיו קרובים מספיק לכלל. כעת, לאחר שבידנו (למשל) פונקציה כ"ל $h_w(x)$. כיצד נוכל לבדוק שהיא אכן מתאימה לנתונים שבידינו?

הגדרה 47. נגדיר מדד הפסד ($Loss$) בשם **Squared Loss** (**הפסד ריבועי**) שיעבוד בצורה הבאה: עבור דגימה בודדת (x_i, y_i) נגדיר את **ההפסד האמפירי** (**Empirical Loss**) ע"י הפונקציה:

$$\ell(w, x_i, y_i) = (h_w(x_i) - y_i)^2$$

ההפרש בניהם מועלה בריבוע על מנת שכל טעות תהיה חיובית, ועל מנת לתת קנס" על טעויות גבוהות יותר. נגדיר את **מודל הטעות הכולל** (**The Overall Error**) כממוצע הטעויות הריבועיות, ונסמן פונקציה זו ב- $Err(w)$ (או ב- MSE):

$$Err(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (h_w(x_i) - y_i)^2$$

כיצד נמדוד איכות של פתרון? נרצה לבדוק כמה המודל (ההיפותזה $\mathcal{H}$) מתאימה לנתונים. ראשית נתבונן במקרה פשוט, בו המודל הוא מדרגה $d = 0$. דהיינו, $h_w(x) = w_0$. נראה כי הפרמטר של המודל הוא יחיד w_0 . נרצה לפתור את בעיית האופטימיזציה הבאה:

$$\min_{w_0} \{Err(w_0)\} = \min_{w_0} \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (w_0 - y_i)^2 \right\}$$

נראה שמדובר בפונקציה ריבועית ב- w_0 , ונחפש את המינימום שלה. לכן נגזור לפי w_0 :


$$\frac{\partial Err(w)}{\partial w_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2(w_0 - y_i) \Rightarrow$$

נשווה לאפס, ונקבל: $\sum_{i=1}^n (w_0 - y_i) = 0$, כלומר קיבלנו $n \cdot w_0 - \sum_{i=1}^n y_i = 0$ ולכן:

$$w_0 = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

כלומר, קיבלנו כי **הערך האופטימלי עבור מודל מדרגה 0 הוא הממוצע האריתמטי של כל $\{y_i\}_{i=1}^n$** .

נראה, כי בסבירות גבוהה שמודל מדרגה 0 לא יביא למינימום את $Loss$ של המודל. לכן, מה שנרצה הוא להמשיך ולהעלות את חזקת הפולינום. בצורה הבאה:




נבחין כי פולינום מדרגה 0 מביא שגיאה שונה מפולינום מדרגה גבוהה מדי (כמו 9). פולינום מדרגה 0 מביא פשוט ערך קבוע - סוג השגיאות שהוא עושה הן קבועות, נראה כי לכל x משמאל הוא חוזה ערך נמוך מדי, ולכל x מימין הוא חוזה ערך גדול מדי. ישנה הטיה ($Bias$). עם זאת, השגיאות במעלה גבוהה הרבה יותר מעניינות - המודל מביא שגיאה מזערית. אך למה אינטואיטיבית הוא מרגיש לנו מודל "לא טוב"? כי אנחנו רואים שהקו האדום שונה מהקו הירוק. נבחין כי אנחנו נקבל במקרה זה שונות גבוהה מאוד! יתרה מזאת - השגיאות שהמודל הזה עושה תלויות ברעש של הדגימה (כמה "רעש" נכנס לנתונים). מה הבעיה? המודל הנ"ל למד יותר מדי את הרעש מהנתונים - הוא משנן את הרעש שיש בנתונים, הוא מסוגל לחזות את הנתונים שהוא כבר ראה באופן מושלם, אבל זה נובע מכך שהוא שינן ($Overfitting$) את הרעש ולא רק את המידע עצמו. זו תופעה מעניינת מאוד - שחושפת לנו את ההבדל בין שגיאת האימון לבין סוג אחר של שגיאה - **Generalization Error**: "טעות ההכללה" שמוגדרת כך:

$$Err_{GEN}(w) = \mathbb{E}_{P(x,y)}[\ell(h_w; x, y)]$$

אנחנו הרי לא מעוניינים להקטין את $Loss$ על סט הנקודות עליהם אנחנו "מתאמנים", אלא נרצה להקטין את תוחלת ה- $Loss$ על כלל ערכי (x, y) מתוך ההתפלגות. הרי - המטרה שלנו היא שהוא יצליח לחזות היטב לא רק את הנקודות שאנחנו נתנו לו, אלא כל זוג נתונים שהוא יקבל בעתיד מתוך $\mathcal{H}$. כלומר, אם נסכם:

אנו לא מכירים את $P(x, y)$ ולכן לא יכולנו למזער את כלל האוכלוסייה - זה שניסינו למזער את נתוני האימון (הערכים שידועים לנו) מוביל לשתי בעיות מרכזיות:

1. **ביצועים ירודים** - המודל עלול ללמוד "רעש" או תכונות ספציפיות שקיימות רק ב- n הדגימות שהבאנו לו ולא קיימות בחוקיות האמיתית של העולם.
2. **אופטימיות יתר** - טעות האימון תהיה תמיד נמוכה יותר מטעות ההכללה, אנו חושבים שהמודל שלנו מצויין כיוון שהוא חוזה מעולה את נתוני האימון אך הוא עלול להכשל על נתונים חדשים. כלומר הבעיה שלנו היא שהביצועים שלנו גרועים - ואנחנו לא יודעים זאת!



נתבונן בדוגמה הבאה בהמשך לדוגמה על הפולינומים:

נראה כי ישנן 2 סוגי טעויות. טעות המבחן מסומנת באדום, ושגיאת האימון בכחול. בעוד שטעות האימון תמיד תמיד לרדת ככל שהמודל נעשה מורכב יותר (במקרה זה, עם הפולינומים!), טעות המבחן תתחיל לעלות בשלב מסוים - העליה הזו בטעות המבחן היא הסימן לכך שהמודל הפסיק ללמוד חוקיות כללית ופשוט התחיל לשנן את נתוני האימון. כלומר: טעות המבחן עוזרת לנו לזהות *overfitting*.

הערה 48. אם נניח כי למודל היו 10 נקודות: $\{(x_i, y_i)_{i=1}^{10}\}$, אזי לפולינום מדרגה 9 ישנן 10 משקולות: כלומר, יש לנו 10 נקודות ועלינו למצוא 10 מקדמים - לכן אפשר למצוא ממש את הפולינום עצמו, ולכן נקבל בגרף כי שגיאת האימון כאשר דרגת הפולינום 9 הוא אפס, כי הצלחנו לחזות את הפולינום בדיוק.

Test: כפי שאמרנו, נרצה שהמודל שלנו ידע להתמודד עם נתונים שלא ראה. זהו שלב המבחן שלו. פעמים רבות נחזיק $data_{test}$, דטה שמיועד למען בדיקה של המודל. אנחנו משתמשים במבחן על מנת להעריך כיצד המודל יתפקד במציאות.

2.1.1 איך נוכל להפחית *overfitting*?

נציע כמה וכמה פתרונות.

1. **להוסיף עוד $data$** : כשיש לנו מעט דגימות, "רעש" מקרי יכול להראות כמו חוקיות אמיתית. ככל שנוסיף יותר דוגמאות הרעש יתחיל להתקזז והחוקיות האמיתית תבלוט יותר. יתרה מזאת - אם נתן למודל 3 נקודות הפולינום יוכל להתפתל בניהן באלפי דרכים מוזרות. אם נתן לו 1000 נקודות, הוא יהיה חייב "להתיישר" לפי המגמה הכללית של כולן כדי לא לצבור שגיאה גדולה מדי.

2. **Regularization**: כאשר אנו מבצעים *overfitting* המודל מנסה לעבור בדיוק דרך כל נקודת רעש בנתוני האימון. כדי לעשות את היגזים האדירים הללו המקדמים של הפולינום הופכים להיות גדולים מאוד בערכם המוחלט. לכן, הרעיון הוא להוסיף מעין קנס למודל על כך שמקדמיו גבוהים מדי. אנו משנים את פונקציית המטרה שלנו כך שהיא לא רק תנסה למזער את הטעות, אלא גם תדאג לשמור על המקדמים קטנים. כך:

$$Err(w) = \sum_{i=1}^n (h_w(x_i) - y_i)^2 + \frac{\lambda}{2} \cdot \|w\|^2$$

החלק השני הוא למעשה $\|w\|^2 = w^T w = \sum_{i=1}^d w_i^2$. החלק הנ"ל מעוניין שהמקדמים יהיו כמה שיותר קרובים לאפס. תפקיד λ הוא להיות "הבורר": אם λ קטן מאוד, אנו כמעט ולא קונסים את המודל - הוא ימשיך לעשות *overfitting* על מנת להוריד את $Loss$. אם λ גדול מאוד - הקנס הופך להיות ממש דומיננטי: המודל יפחד לקבוע מקדמים גבוהים ויעדיף לקבל טעות אימון קצת גבוהה יותר, העיקר שהמקדמים ישארו קטנים.

2.2 תאוריית ההחלטה של בייס - Bayes decision theory

לרוב בלמידת מכונה, נרצה לנחש את הקשר בין הקלט לפלט, x ו- y מתוך נתונים ידועים. נניח לרגע ויש לנו ידע אלוהי - ובו אנו יודעים בדיוק את פונקציית ההסתברות המשותפת של x ו- y . כלומר אנו יודעים את $D = P(x, y)$. בהינתן ידע מלא על הבעיה, מהי האסטרטגיה האופטימלית לפעולה? כלומר, איך נחליט החלטות שיביאו לכמה שפחות טעויות.

ואפילו מקרה מעניין יותר: אנו יודעים את ההתפלגות - אך איננו יודעים את הפרמטרים של ההתפלגות. למשל, אנו יודעים כי הנתונים שלנו מתפלגים נורמלית אך לא יודעים את μ, σ^2 . לכן: נרצה לבצע הערכה (estimate) של הפרמטרים.

איך לא, נתחיל בדוגמה. דילמה: אתה שוקל האם לקחת היום מטרייה, או שלא. אתה לא יודע בוודאות אם ירד או שלא ירד היום גשם! **זוהי דילמה.** מצד אחד, גשם+אין מטרייה: אתה תרטיב ותהיה מעוצבן. מצד שני, אין גשם+יש מטרייה: אתה תהיה מעוצבן קצת (כי סחבת מטרייה לחינם). אך, נניח וקיבלת שבריר של מידע. הסתכלת דרך החלון וראית עננים שחורים - כעת החלטת: בעקבות התצפית, אקח מטרייה. כמובן שמטריות לא מעניינות אותנו. נרצה להכליל דוגמה זו **להסקה סטטיסטית**. בהינתן $data$, דגימה אמפירית, נרצה להכליל ממנה ולהסיק על "העולם". נפרמל זאת:

הגדרה 49. על מנת לתאר את תאוריית ההחלטה של ביס נגדיר:

1. **world states:** "מצבי עולם", מצבים $\{\omega_i\}_{i=1}^n$ שהם התרחישים האפשריים במציאות. מצבים אלו זרים, כלומר לכל $i \neq j \in [n]$ מתקיים $\omega_i \neq \omega_j$ וכן אם Ω הוא מרחב שלנו אזי $\Omega = \bigcup_{i=1}^n \omega_i$.
2. **תצפיות אמפיריות:** $S_n = \{x_1, \dots, x_n\}$. דגימות אמפיריות אשר אספנו מהשטח. n מייצג את מס' הדגימות.
3. **מודל הסתברותי:** יש לנו ידע מלא על ההתפלגויות. בפרט, $P(\omega)$ - ההסתברות לפני שראינו בכלל את הנתונים (למשל: מהי ההסתברות שירד גשם ביום זה), וכן $P(S_n|\omega)$ - הסיכוי לראות את התצפיות הללו, באשר שהעולם נמצא במצב מסוים (למשל: מה הסיכוי לראות עננים שחורים אם אכן ירד גשם?).
4. **פעולות אפשריות:** קבוצה $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ של החלטות אפשריות שאנו יכולים לקבל. (קודם לכן בדוגמה, α_1 היא לקחת מטרייה α_2 היא שלא לקחת).
5. **עלויות:** נסמן $\Lambda = \{\lambda(\alpha_k|\omega_j)\}$ - המדד שקובע כמה נשלם על ההחלטה שלנו. כלומר, המחיר של נקיטת פעולה α_k כאשר המצב האמיתי בעולם הוא ω_j . למשל: $\lambda(Umbrella|rain)$ יהיה בעל מחיר גדול מאוד: העצבים שנרטבים ואין מטרייה.

משפט 50. יהי ω מצב כלשהו בעולם Ω שאינו ידוע. תהי x תצפית מהשטח. אזי, לפי חוק ביס מתקיים:

$$\underbrace{Pr(\omega|x)}_{\text{Posterior}} = \frac{Pr(x|\omega)}{Pr(x)} \cdot \underbrace{Pr(\omega)}_{\text{Prior (belief)}}$$

הסבר הנוסחה:

- $Pr(\omega)$: ה"אמונה", זהו הידע הקודם. זוהי ההסתברות של המצב ω עוד לפני שראינו את הנתונים.
 - $Pr(x|\omega)$: זו ה"נראות", כלומר, בהינתן שאנו יודעים כי העולם במצב ω מה הסיכוי לקבל x .
 - $Pr(x)$: מדובר בראייה. זוהי ההסתברות לראות את התצפית x ללא קשר למצב העולם כרגע.
 - $Pr(\omega|x)$: מדובר ביעד הסופי, ה"הסתברות" $Pr(\omega|x)$: ההסתברות כי מצב העולם הוא ω לאחר שכבר ראינו את התצפית x . כלומר, אחרי שראית את התצפית (העננים), מה הסיכוי שבאמת יהיה גשם?
- הערה 51.** זהו המקום שבו אנחנו מגלים שנוסחה בהסתברות כל כך תמימה כל כך חשובה - אנו למעשה לוקחים ידע קודם, משלבים אותו עם נתונים חדשים ($Likelihood$) ומקבלים מסקנה מעודכנת.
- מהי המטרה שלנו?** מטרתנו לתכנן אסטרטגיה, שתסומן כפונקציה $\alpha(S_n)$. כקלט: היא מקבלת את התצפיות שלנו, וכפלט היא קובעת איזו פעולה α_i באשר $i \in [k]$ עלינו לבצע. הקריטריון להצלחה - היא תביא למינימום של עלויות/הפסדים. כלומר - נרצה כמה שפחות נזקים בממוצע בהתחשב במחירי הטעות λ .

הגדרה 52. הסיכון המותנה (Conditional risk) מסומן כ- $R(\alpha_k|x)$ הוא העלות המצופה שלנו אם נבחר בפעולה α_k לאחר שראינו את התצפית x . מתקיים:

$$R(\alpha_k|x) = \mathbb{E}_{P(\omega|x)}[\lambda(\alpha_k|\omega)] = \sum_{\omega_j \in \Omega} \lambda(\alpha_k|\omega_j) Pr(\omega_j|x)$$

הסבר: מדובר סה"כ במעבר על כל מצבי העולם, חישוב מחיר הפעולה בהינתן המצב הספציפי הזה, ומכפילים בהסתברות של מצב העולם הזה בהינתן שאנחנו יודעים את התצפית x .

נבחין כי בנוסחה מוזכר $Pr(\omega_j|x)$. כיצד נחשבו? כלומר - בהינתן התצפית x , מהי ההסתברות למצב העולם ω_j ? נוכל למצוא את ההסתברות באמצעות חוק ביס ונוסחת ההסתברות השלמה:

$$Pr(\omega_j|x) = \frac{Pr(x|\omega_j)}{Pr(x)} \cdot Pr(\omega_j) = \frac{Pr(x|\omega_j) \cdot Pr(\omega_j)}{\sum_{\omega_i \in \Sigma} Pr(x|\omega_i) \cdot Pr(\omega_i)}$$

כעת, יש לנו מס' סיכון לכל פעולה α_k אפשרית. כיצד נבחר את האסטרטגיה האופטימלית? ובכן, נגדיר:

$$\alpha^*(S_n) = \operatorname{argmin}_{\alpha} R(\alpha|x)$$

כלומר, מעבר על כל α האפשריות ונקח את α שנתנה את התוצאה המינימלית עבור R (מספר הסיכון) - כיוון שנרצה כמה שפחות עלות.

הגדרה 53. (Overall risk). אסטרטגיה $\alpha(S_n)$ היא החוק שקובע איזו פעולה נבחרה עבור כל תצפית x_i אפשרית. נרצה להגדיר את העלות הממוצעת של חוק זה על פני כל התצפיות:

$$R(\alpha(S_n)) = \sum_{x_i \in S_n} R(\alpha(x_i)|x_i) \cdot Pr(x_i)$$

הערה 54. אסטרטגיה היא פונקציה, כך שבהינתן x_i היא אומרת מראש - בצע $\alpha(x_i)$. לכן בהגדרה הקודמת, רצינו לחשב את הסיכון של האסטרטגיה. לכל פעולה ישנה אסטרטגיה שנבחרה בפונקציית האסטרטגיה, $\alpha(x_i)$. נרצה לבדוק את הסיכון של אותה פעולה נבחרת, כלומר $R(\alpha(x_i)|x_i)$, ולשקלל זאת בהסתברות לקבל את אותו הקלט. כך נחשב למעשה את הסיכון המשוקלל של האסטרטגיה.

כעת נציג כמה וכמה דוגמאות חשובות:

דוגמה 55. (Zero One cost) נניח כי אנחנו רוצים לנחש נכון את מצבי העולם, וכל טעות עולה לנו אותו דבר. נניח כי הפעולות $\{\alpha_i\}_{i=1}^k$ הן הניחושים שלנו לגבי מצב העולם האמיתי $\{\omega_i\}_{i=1}^k$. (לדוגמה: מצבי העולם הם התמונה היא תפוז, והתמונה היא תפוח. α_1 זה ניחוש שהתמונה תפוז α_2 ניחוש שהתמונה תפוח. ישנה התאמה על ניחוש מצב העולם האמיתי). כמו כן, נשלם 1 על כל טעות ו-0 אם צדקנו. לשם כך, נשתמש בפונקציה דלתא δ_{kj} כך שמקיימת:

$$\delta_{kj} := \begin{cases} 1 & k = j \\ 0 & k \neq j \end{cases}$$

לכן, נגדיר את העלות בצורה הבאה: $\lambda(\alpha_k|\omega_j) = 1 - \delta_{kj}$ (הרי אם הניחוש α_k מתאים למצב ω_j אזי $k = j$ ובמקרה זה $\delta_{kj} = 1$ ולכן $\lambda(\alpha_k|\omega_j) = 1 - 1 = 0$), אחרת נקבל כי $\lambda(\alpha_k|\omega_j) = 1$. הרי שאם צדקנו בניחוש, לא נרצה לשלם על כך אך אם טעינו נשלם בדיוק אחד). כעת, נחשב את הסיכון המותנה R :

$$R(\alpha_k|x) = \sum_{j=1}^K \lambda(\alpha_k|\omega_j) Pr(\omega_j|x)$$

נבחין כי העלות היא 0 שצדקנו ו-1 שטעינו, לכן הגורמים מתאפסים בכל המקרים בהם צדקנו. כלומר ה' Σ 'ל היא סכום המקרים בהם טעינו.

$$R(\alpha_k|x) = \sum_{j \neq k} Pr(\omega_j|x)$$

אך אנחנו יודעים כי סכום ההסתברויות הללו, של כל מצבי העולם הוא 1. כלומר, $\sum_{j \neq k} Pr(\omega_j|x) + Pr(\omega_k|x) = 1$ ולכן:

$$R(\alpha_k|x) = 1 - Pr(\omega_k|x)$$

כעת, נרצה $\alpha^*(S_n) = \operatorname{argmin}\{R(\alpha_k|x)\}$. על מנת ש- $1 - Pr(\omega_k|x)$ יהיה הכי קטן, נרצה כי $Pr(\omega_k|x)$ יהיה גדול ככל הניתן. כלומר, להמר על מצב העולם שיש לו את ההסתברות הגבוהה ביותר בהינתן התצפיות שראינו. לסיכום: כשכל טעות עולה לנו אותו המחיר בדיוק, הדרך הכי זולה במקרה זה היא להמר על הסוס הכי חזק (זה עם ההסתברות הכי גבוהה). והערה נוספת: למעשה הדרך שלנו לשלם הכי פחות היא באמת אכן $1 - Pr(\omega_k|x)$. אנחנו תמיד נשלם 1, פרט למקרה בו צדקנו, ואז נשלם פחות. הדרך הכי טובה שלנו לשלם פחות - להמר על זה שנהיה צודקים לגבי ההסתברות הגבוהה ביותר.

■

דוגמה 56. כעת, נניח כי העלויות לא בהכרח 0 ו-1. ננתח מקרה עם 2 מצבי עולם ו-21 פעולות. נתבונן במטריצת עלויות מגודל 2×2 . נסמן $\lambda_{kj} = \lambda(\alpha_k | \omega_j)$. הסיכון לכל פעולה מוגדר כך:

$$R(\alpha_1 | x) = \lambda_{11} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{12} Pr(\omega_2 | x)$$

$$R(\alpha_2 | x) = \lambda_{21} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{22} Pr(\omega_2 | x)$$

כעת, נשאל את עצמנו מתי נבחר ב- α_1 ? כאשר הסיכון שלה קטן יותר. דהיינו,

$$\lambda_{11} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{12} Pr(\omega_2 | x) < \lambda_{21} Pr(\omega_1 | x) + \lambda_{22} Pr(\omega_2 | x)$$

$$(\lambda_{12} - \lambda_{22}) Pr(\omega_2 | x) < (\lambda_{21} - \lambda_{11}) Pr(\omega_1 | x)$$

$$\frac{Pr(\omega_1 | x)}{Pr(\omega_2 | x)} > \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}$$

כעת, נעזר בחוק בייס:

$$\frac{\frac{Pr(x|\omega_1)}{Pr(x)} \cdot Pr(\omega_1)}{\frac{Pr(x|\omega_2)}{Pr(x)} \cdot Pr(\omega_2)} > \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}}$$

$$\underbrace{\frac{Pr(x|\omega_1)}{Pr(x|\omega_2)}}_{\text{Likelihood ratio}} > \underbrace{\frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}} \cdot \frac{Pr(\omega_2)}{Pr(\omega_1)}}_{\text{Decision boundary}}$$

מאגף שמאל, קיבלנו את הLikelihood ration: יחס בין הסתברויות, שעונה על השאלה: פי כמה התצפית שראינו x מתאימה למצב 1 יותר מאשר למצב 2?
מצד ימין, קיבלנו את Decision boundry: מדובר בערך מספרי שקובע את הרף ומורכב מ-2 חלקים:
1. יחס Priors: כמה מצב 2 נפוץ יותר לעומת מצב 1 ביומיום.
2. יחס העלויות: כמה יותר כואב לטעות בסוג אחד של טעות לעומת השני.
המספר הזה הוא הגבול - אם הראיות מהשטח (לייקהוד רטיו) חזקות יותר מערך זה - נבחר ב- α_1 . אחרת: נבחר ב- α_2 .
במקום לחשב הסתברויות מסובכות בכל שלב, המודל הנ"ל אומר: תשווה בין שתי האפשרויות, תראה אם הראיה מספיק חזקה לך על מנת לעבור את הסף.

■

עד כה התעסקנו במצב בו יש לנו תצפית אחת, x . ומה אם יש לנו n תצפיות? כלומר תצפיות $\{x_i\}_{i=1}^n$? במצב זה:

$$\underbrace{\frac{Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_1)}{Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_2)}}_{\text{Likelihood ratio}} > \underbrace{\frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}} \cdot \frac{Pr(\omega_2)}{Pr(\omega_1)}}_{\text{Decision boundary}} = \Theta$$

כעת, נניח כי התצפיות שלנו $\{x_i\}_{i=1}^n$ הן בלתי תלויות זו בזו (דרישה הגיונית), בהינתן למצב העולם ω_i . אזי, לפי חוקי הסתברות יתקיים כעת:

$$Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_1) = \prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_1), Pr(x_1, \dots, x_n | \omega_2) = \prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_2)$$

ולכן אי השוויון יהפוך להיות: $\frac{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_1)}{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_2)} > \Theta$. נבחין כי בעולם של הסתברויות, להכפיל הרבה הסתברויות זה לא רעיון חכם במיוחד. למה לא? כי יתכן וההסתברויות הנ"ל מאוד קטנות וקרובות לאפס, מכפלתן זו בזו תהיה עוד יותר קטנה וקרובה לאפס, ומבחינת המחשב זה ייצור מספרים אפסיים שהוא לא ידע כיצד להתמודד איתם. לכן, נרצה להעזר במתמטיקה על מנת למנוע מצב כזה: נשתמש ב $\log$ שהיא פונקציה מונוטונית עולה ולכן לא תשפיע על אי השוויון. נגדיר $\Theta' = \log(\Theta)$ ויתקיים:


$$\log\left(\frac{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_1)}{\prod_{i=1}^n Pr(x_i | \omega_2)}\right) > \Theta' \iff \sum_{i=1}^n \log\left(\frac{Pr(x_i | \omega_1)}{Pr(x_i | \omega_2)}\right) > \Theta'$$

מעבר למשמעות המתמטית, במקום מבחן אחד עכשיו יש לנו צבירת ראיות. לכל תצפית x_i כך ש $i \in [n]$ נחשב את Log-Likelihood ration שלה. אם התצפית תומכת ב ω_1 אזי $\log$ יהיה חיובי ואחרת שלילי (לפי חוקי $\log$, הרי תמיכה משמעותה $\frac{Pr(x_i | \omega_1)}{Pr(x_i | \omega_2)} > 1$ ובמקרה זה $\log$ חיובי ואי תמיכה משמעותה $\frac{Pr(x_i | \omega_1)}{Pr(x_i | \omega_2)} < 1$ ובמקרה זה $\log$ שלילי). אנו סוכמים את הראיות, לכן נבחר את α_1 אם סכום התצפיות הכולל היה גדול מהגבול. בדומה, על α_2 .

הערה 57. כפי שראינו בדוגמאות קודמות, הנחנו כי אנחנו יודעים את התפלגות הנתונים. תאוריית בייס מניחה שיש לנו ידע אלוהי על התפלגויות הנתונים. בפועל, בחיים האמיתיים אף אחד לא נותן לנו את התפלגות הנתונים. אז מה נעשה בקורס? הקורס ילמד אותנו כיצד לגשר בין הגישות.

2.3 The Bias-Variance Trade-off

Bias היא הטייה, זו שגיאה שנובעת מהנחות יסוד פשטניות מדי של המודל. שונות זו השגיאה שנובעת מרגישות יתר של המודל לשינויים בנתוני האימון. ננסה להבין מה הקשר בין השניים, באמצעות התמונה הבאה:



נחלק למקרים:

1. **שונות והטיה נמוכים (שמאל למעלה):** המודל פוגע בדיוק במרכז, ובכל פעם שניתן לו סט חדש של נתונים יפגע בדיוק באותו מקום - עקבי, זהו היעד שלנו.
2. **שונות נמוכה, הטיה גבוהה (שמאל למטה):** המודל מאוד עקבי (תמיד פוגע באותה נקודה!) כי השונות נמוכה, אבל הנקודה הנ"ל רחוקה מהמרכז: כי יש הטיה. המודל טועה בגלל הנחה שגויה, אך טועה בצורה עקבית.
3. **שונות גבוהה, הטיה נמוכה (ימין למעלה):** בממוצע, הנקודות נמצאות יחסית קרובות למרכז כי ההטייה נמוכה אך הן מפוזרות זו מזו בגלל שהשונות גבוהה. המודל מבין את הכיוון הכללי - אך נורא מפוזר.
4. **שונות והטיה גבוהים (ימין למטה):** המצב הכי גרוע. גם הטיה גבוהה - ולכן רחוק מהיעד, וגם הנתונים מפוזרים כי השונות גבוהה. המודל טועה גם בממוצע וגם לא עקבי.

נרצה לפרמל את המושגים עליהם דנו כאן, ולפתח קשר מתמטי.

הגדרה 58. יהיו $S_n = \{(x_i, y_i)_{i=1}^n\}$ נתוני האימון שלנו, המגיעים מעולם $\mathcal{D}$ כך שהדגימות ב"ז זו בזו. נרצה להעריך את y (שלא ידוע) באמצעות פונקציית היפותזה $\mathcal{H}$: $h(x) = h(x; S_n)$ שנבחין שתלוי בנתונים עליה התאמנה. מטרתנו לחזות את y עבור נק' מבחן חדשה $(x, y) \sim \mathcal{D}$ שלא נמצאת בנתוני האימון שלנו. נגדיר את MSE (Mean Squared Error) כתוחלת של ריבוע ההפרש בין הערך האמיתי לחזוי:

$$MSE = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[(y - h(x))^2]$$

מטרתנו תהיה להבין מדוע המודל שלנו טועה - האם זה בגלל חוסר גמישות (Bias) או מרגישות יתר לנתונים (Variance). MSE מתפרק לשניהם -

- $Bias$: המידה שבה החיזוי של המודל מתאים לפונקציית המטרה בממוצע.
- $Variance$: המידה שבה החיזור עבור נקודה בודדת משתנה בממוצע.

לפני כן, נגדיר שני סוגי תוחלות:

1. תוחלת על נתונים: תוחלת ע"פ כל הנקודות מהעולם $\mathcal{D}$. כאשר נבדוק טעות מבחן, נשתמש בתוחלת זו.

$$\mathbb{E}_{(x,y)}[\cdot] = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[\cdot]$$

2. תוחלת על סטי אימון: תוחלת מעל סטי האימון. התוחלת הנ"ל מדגימה בממוצע כיצד המודל מתנהג בממוצע כשמחליפים לו את הדטה עליו התאמן.

$$\mathbb{E}_{S_n}[\cdot] = \mathbb{E}_{S_n \sim \mathcal{D}^n}[\cdot]$$

משפט 59. בהינתן התפלגות נתונים $\mathcal{D}$, מדגם אימון $S_n \sim \mathcal{D}^n$, והיפוזזה $h(x, S_n)$ השגיאה הריבועית הממוצעת (MSE) ניתנת לפירוק לשני רכיבים חיוביים:

$$MSE = Bias^2 + Variance$$

באשר:

$$Bias = \mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2] \text{ וכך } Variance = \mathbb{E}_{(x,y)}[\mathbb{E}_{S_n}[(h(x) - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2]]$$

הוכחה:

$$\mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[(y - h(x))^2] = \mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)] + \mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))^2] =$$

$$\mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2] + \mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))^2] + 2\mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)) \cdot (y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])]$$

נרצה לנתח את הביטוי $2\mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)) \cdot (y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])]$:

$$2\mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)) \cdot (y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])] =$$

$$2\mathbb{E}_{S_n, (x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))] = 2\mathbb{E}_{(x,y)}[\mathbb{E}_{S_n}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))]]$$

$$= 2\mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x)])] =$$

$$2\mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])] = 0$$

מכאן קיבלנו:

$$MSE = \mathbb{E}_{(x,y)}[(y - \mathbb{E}_{S_n}[h(x)])^2] + \mathbb{E}_{(x,y)}[(\mathbb{E}_{S_n}[h(x)] - h(x))^2]$$

הערה 60. למעשה, $Bias$ הוא כמה המודל $h(x)$ חוזה טוב את המטרה בתוחלת. אם יש $Bias$ גבוה - המודל עקום מהיסוד. **כיצד נקטין את $Bias$?** צריך להפוך את המודל לגמיש יותר או לחלופין למורכב יותר. כלומר: נרצה ש $h(x)$ תבחר מסת רחב יותר של פונקציות - למשל פולינומי מדרגות גבוהות ולא רק לינארי.

כיצד נקטין את השונות? אפשרות אחת היא להגדיל את הדטה של האימון (ככה נעריך טוב יותר את $h(x)$), **אפשרות אחרת** היא להגביל מראש את המודל לקבוצה קטנה יותר של פונקציות - הרי אם נכריח אותו לבחור מתוך סט קטן (למשל מתוך קווים לינאריים בלבד) הוא יהיה הרבה יותר "קשיח": ההגיון הוא כי מודל פשוט הוא מודל עקבי - קו ישר לא יכול להתפתל כדי לעבור דרך רעש בנתונים ולכן אם נחליף את נתוני האימון הקו הישר שנקבל יהיה דומה לקודם. התוצאה היא שהשונות תרד משמעותית אך ההטייה עלולה לעלות.

2.4 $Overfitting$ ו $Underfitting$


כיצד בפועל נראה אימון של מודל? נחלק לשלבים:

Training loop (לולאת האימון): זהו השלב שבו המודל לומד. המודל מעדכן את הפרמטרים שלו, כדי למזער את השגיאה על סט האימון S_n . המטרה בשלב זה היא להקטין את $Bias$. ככל שנרוץ יותר פעמים על נתוני האימון, המודל יתאים את עצמו אליהם יותר.

Evaluate the loss on the validation set: זהו שלב ה"בקרה" שקורה תוך כדי האימון. מדוע זה נחוץ? סט האימון לא יכול להגיד לנו אם התחלנו לעשות $overfitting$, ולכן אנחנו בודקים את הביצועים על נתונים שהמודל לא התאמן עליהם ישירות. אם השגיאה באימון יורדת אבל השגיאה בוולדיאציה מתחילה לעלות: זהו סימן מובהק לכך שהמודל התחיל ללמוד רעש ועלינו לעצור.

Evaluate on Test Set: זהו שלב המבחן הסופי שקורה רק פעם אחת בסוף התהליך. סט המבחן חייב להיות טהור - אסור לנו לקבל החלטות על המודל כמו לשנות פרמטרים בהתבסס על סט המבחן - זה לרמות את עצמנו.

כיוון שאנחנו כל הזמן עושים בקרה - שגיאת האימון שלי תמיד ירדה, כי אני מתקן את עצמי תוך כדי הבקרה. אך השגיאה של ה $validation$ לא בהכרח תמיד תרד! כמו בדוגמה בתמונה מטה. אם נראה מצב שהשגיאה של ה $validation$ עולה: אנחנו נבין שיש כאן סכנה ל $overfitting$. אם ראינו מצב כזה - צריך לעצור ולתת למודל שוב להתאמן. לבסוף, כשנראה ששגיאת הוולדיאציה מתיישרת עם שגיאת האימון (שירידת), נוכל לעבור לשלב המבחן הסופי.



הגדרה 61. Underfitting הוא מצב של תת התאמה. זהו מצב שבו המודל פשוט מדי בכדי לתפוס את המבנה של הנתונים. סימנים לכך:

1. שגיאה גבוהה בסט האימון וגם בסט ההערכה.
 2. מצב של $Bias$ גבוה, המודל לא מצליח ללמוד אפילו את הנתונים שהוא ראה: לכן ברור שלא יצליח לחזות חדשים. למשל, נסיון להתאים קו לינארי לנתונים שמתנהגים בצורה ריבועית של פרבולה.
- מדוע זה קורה? המודל פשוט מדי. איך לתקן?** להגדיל את מורכבות המודל או לאפסמז יותר טוב.


הגדרה 62. Good fit היא התאמה טובה, זהו המצב אליו אנחנו שואפים בתהליך האימון. סימנים לכך:

1. שגיאה נמוכה בסט האימון וגם בסט ההערכה.
2. מצאנו איזון בין השונות להטיה: $Bias$ נמוך מספיק בשביל להבין את החוקיות, והשונות נמוכה מספיק בשביל לא להיות מושפעים מהרעש. המודל מבצע הכללה (Generalization) טובה.

הגדרה 63. $overfitting$ הוא מצב שבו המודל שינן את נתוני האימון במקום ללמוד את החוקיות שלהם. סימנים לכך:

1. שגיאה נמוכה מאוד בסט האימון, אך שגיאה גבוהה בסט ההערכה.
 2. מצב של שונות גבוהה מאוד - המודל גמיש מדי וחודר לרעש של מדגם ספציפי. פוגע בנתוני האימון אך מתרסק על נתונים חדשים.
- מדוע זה קורה?** סט נתונים קטן מדי או מודל מורכב. **כיצד לתקן?** לקחת מודל פחות מורכב, לקחת דטה-סט גדול יותר.

הערה 64. בתמונה, דוגמאות לכל אחד מהמקרים:



אם נרצה לתאר מהם שונות והטיה, נוכל לומר כך: Bias מתאר למעשה כמה הנתונים שלי רחוקים מהמצב האמיתי (y), בעוד Variance מתאר כמה בכל שלב ושלב החיזויים שלי יהיו שונים זה מזה. כעת נרצה לשאול:

מהו Bias גבוה? בממוצע, אנחנו רחוקים מהחיזוי האמיתי. המודל לא הבין את מורכבות הדטה.

מהו Variance גבוה? המודל הופך להיות רגיש מדי לכל תנועה בנתוני האימון - במקום ללמוד חוקיות כללית שמושפעת לכל הנתונים בעולם הוא מתחיל להתייחס לכל רעש או סטיות מקריות בסט האימון הספציפי. מדוע לפונקציה מורכבת יש שונות גבוהה? המודל בונה פונקציה מורכבת - שעוברת בדיוק דרך כל נקודה: אם יש נקודה אחת שהיא טעות או רעש - המודל יתעקם כדי להגיע אליה. ההתעקמויות האלו הם יוצרים וריאנס גבוה: המודל איבד את יכולת ההכללה כי בנה את עצמו בהתאם לנתונים.

2.5 Cross Validation

כפי שראינו, אי אפשר להשתמש ב-Test set על מנת לקבל החלטות על המודל לכן צריך את סט ה-Validation. תפקידו: עזרה בבחירת הגדרות המודל (אלו ה-Hyper-parameters): מס' הפרמטרים, בחירת אלגוריתם אופטימיזציה, קבועי רגולציה λ וכו'.

מה הבעיה שנוצרת מכך? אם ה-dataset שלנו קטן,

אם נפריש חלק משמעותי ממנו ל-Validation ישאר קצת מאוד דטה עבור האימון עצמו. (זה יעלה את Bias כי המודל לא למד מספיק)

אם נפריש חלק קטן ממנו ל-Validation הערכת הביצועים שלנו תהיה תלויה מאוד בנקודות הספציפיות שנפלו בסט הוולידציה. בחירה מקרית מזלזלת או מחמירה מדי של סט וולידציה תשפיע על כל החלטות המדגם.

לשם כך, נשתמש בשיטה בשם Cross Validation:

1. נקח את כל הנתונים שלנו ונחלקם ל- k קבוצות שוות בגודלן. (לרוב משתמשים $k = 5, 10$)
2. מריצים אימון למשך k פעמים: בכל איטרציה $1 \leq i \leq k$:
- א. Training set: משתמשים ב- $k - 1$ מהחלקים כדי לאמן את המודל.
- ב. Validation set: משתמשים בחלק i שנותר בצד כדי לבדוק את הביצועים.
- המשמעות: בכל פעם חלק אחר של הנתונים משמש כ"בוחר".
3. בסוף הולאה יש לנו k ערכי שגיאה (אחד לכל קבוצה) ונחשב את הממוצע שלהם: $Error = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Error_i$. הממוצע הנ"ל הוא Performance Estimation שלנו, הרבה יותר יציב מהערכה על סט וולידציה בודד כי הוא ראה את כל הנתונים בתפקיד הוולידציה.
4. בחר את הפרמטרים עם ה-performance הגבוה ביותר. אנחנו למעשה חוזרים על התהליך הנ"ל כולו עבור קבוצות שונות של היפר פרמטרים (פולינומים דרגה 2, דרגה 3 וכו'...). נבחר את הפרמטרים שהשיגו את הממוצע השגיאות הנמוך ביותר.

הערה 65. אם בחרנו בשיטה זו, אנחנו קודם נבצע cross validation, ואז נעבור לשלב האימון - ללא ולדיציה, עם הפרמטרים שנבחרו, ולבסוף את שלב המבחן. לעומת זאת: אם לא בחרנו בשיטה זו - הוולידציה קורית במקביל לאימון, ולבסוף מתבצע המבחן.

הערה 66. כיצד בחירת k משפיעה על ההטיה והשונות?

נבחין כי ככל ש- k יהיה גדול יותר, Bias יהיה קטן יותר: כיוון שככל ש- k גדול, כך סט האימון בכל קבוצה גדול יותר וקרוב יותר לגודל N המקורי, מודל שמאומן על יותר נתונים מייצג טוב יותר את המודל הסופי, ולכן השגיאה שמודדים ב- CV היא הערכה קרובה יותר.

כמו כן, ככל ש- K גדול יותר - Variance יהיה גדול יותר: כיוון שככל ש- k גדל, סטי האימון בכל איטרציה הופכים להיות כמעט זהים (לצורך

ההמחשה: אם $N = 100$ וכן $k = 2$, אזי החפיפה תהיה אפסית שכן אפשר לחלק 2 קבוצות בגודל 50. אך אם $N = 100$ ו- $k = 10$, במקרה זה בכל איטרציה יהיו 90 דגימות - ויהיה הרבה יותר חפיפה בין הדגימות במקרה זה), כאשר המדגמים עליהם נרץ את K האיטרציות מאוד דומים - הממוצע שייחושב בסוף יהיה רגיש יותר לנתונים חריגים ולכן השונות תגדל.

מסקנה: שוב ישנו טרייד-אוף בין השניים.

3 הרצאה 3**3.1 Parameter estimation (הערכת פרמטרים)****4 הרצאה 4****5 הרצאה 5****6 הרצאה 6****7 הרצאה 7****8 הרצאה 8****9 הרצאה 9****10 הרצאה 10****11 הרצאה 11**