

דף עבודה — פרק 1: מהו שבר?

מונה, מכנה ומשמעות החלוקה · שברים פשוטים · כיתה ה'

שם:

כיתה:

תאריך:


לפני שמתחילים, שני דברים לזכור:

- ① המכנה (למטה) אומר לכמה חלקים שווים חילקנו. המונה (למעלה) אומר כמה חלקים לקחנו.
- ② החלקים חייבים להיות שווים — אחרת זה לא שבר.

שאלה 1 — קריאת שבר מתוך ציור

קל


לכל צורה: כתבו איזה שבר צבוע, ואיזה שבר אינו צבוע.



ג.



ב.



א.

שאלה 2 — מונה ומכנה

קל

לכל שבר, כתבו מהו המונה, מהו המכנה, ומה השבר אומר במילים.

1. $\frac{2}{5}$

2. $\frac{7}{10}$

3. $\frac{1}{100}$

שאלה 3 — מהמילים לשבר

קל

1. בכיתה 30 תלמידים, מתוכם 13 בנים. איזה שבר מהכיתה הם הבנים?

2. ביממה 24 שעות. אורי ישן 8 שעות. איזה שבר מהיממה אורי ישן?

3. בשקית 12 סוכריות, אכלנו 5. איזה שבר מהסוכריות **נשאר**?

שאלה 4 – מי גדול יותר? בינוני

הקיפו את השבר הגדול יותר, וכתבו במילים **למה** (בלי חישוב).

1. $\frac{1}{4}$ או $\frac{1}{7}$

2. $\frac{1}{10}$ או $\frac{1}{3}$

3. $\frac{3}{8}$ או $\frac{5}{8}$

שאלה 5 – השלמה לשלם בינוני



1. פיצה חולקה ל-6 חלקים שווים ואכלנו $\frac{4}{6}$. איזה שבר נשאר?

2. איזה שבר צריך להוסיף ל- $\frac{3}{10}$ כדי לקבל שלם?

3. רשמו שלושה שברים **שווים** ששווים ל-1.

שאלה 6 – ציור בינוני

חלקו כל צורה לחלקים **שווים** וצבעו את השבר המבוקש.



א. צבעו $\frac{3}{4}$

ג. צבעו $\frac{5}{9}$

ב. צבעו $\frac{1}{2}$

שאלה 7 — חשיבה הפוכה

מאתגר

1. יעל אומרת: "אכלתי $\frac{1}{4}$ מהעוגה, וזה 2 חתיכות". לכמה חתיכות שוות חולקה כל העוגה?
2. דני קיבל $\frac{1}{5}$ משקית גולות, וזה 6 גולות. כמה גולות היו בשקית כולה?
3. הסבירו מדוע **לא ייתכן** שבר שהמכנה שלו הוא 0.

דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו שבר?



לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צבוע $\frac{1}{4}$, לא צבוע $\frac{3}{4}$. ב. צבוע $\frac{3}{4}$, לא צבוע $\frac{1}{4}$. ג. צבוע $\frac{3}{4}$, לא צבוע $\frac{1}{4}$.
נקודת דיון: שלוש צורות שונות לגמרי — ואותו שבר. השבר מתאר יחס, לא צורה.

שאלה 2. א. מונה 2, מכנה 5 — חילקנו ל-5 חלקים שווים ולקחנו 2. ב. מונה 7, מכנה 10 — חילקנו ל-10 חלקים שווים ולקחנו 7. ג. מונה 1, מכנה 100 — חילקנו ל-100 חלקים שווים ולקחנו 1.

שאלה 3. א. $\frac{13}{30}$. ב. $\frac{8}{24}$. ג. $\frac{7}{12}$ — שימו לב: השאלה שואלת מה נשאר ($12 - 5 = 7$), לא מה נאכל. טעות נפוצה: $\frac{5}{12}$.

שאלה 4. א. $\frac{1}{4}$ גדול — פחות חלקים, כל חלק גדול יותר. ב. $\frac{1}{3}$ גדול — מאותו נימוק. ג. $\frac{5}{8}$ גדול — כאן המכנה זהה, החלקים באותו גודל, ופשוט לקחנו יותר מהם.

שאלה 5. א. $\frac{2}{6}$. ב. $\frac{7}{10}$. ג. כל שבר שהמונה בו שווה למכנה, למשל $\frac{2}{2}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{9}{9}$.

שאלה 6. א. חלוקה ל-4 רצועות שוות, 3 צבועות. ב. חלוקה ל-2 חצאים שווים, אחד צבוע. ג. חלוקה ל-9 חלקים שווים (למשל רשת 3×3), 5 צבועים.
בבדיקה: הדגישו שוויון החלקים, לא רק את מספרם.

שאלה 7. א. כל רבע = 2 חתיכות, ויש 4 רבעים $\rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow$ **8 חתיכות**. ב. כל חמישית = 6 גולות, ויש 5 חמישיות $\rightarrow 5 \times 6 = 30 \rightarrow$ **30 גולות**. ג. המכנה אומר לכמה חלקים חילקנו את השלם. חלוקה לאפס חלקים חסרת משמעות — אי אפשר לחלק דבר לאפס חלקים. לכן המכנה חייב להיות גדול מ-0.