

דף עבודה — פרק 4: השלמה לריבוע

משוואות ריבועיות · פרק 4 — האיבר המשלים, צורת הקדקוד וגזירת נוסחת השורשים

שם:

כיתה:

תאריך:

הכלל המרכזי: כדי להשלים את $x^2 + bx$ לריבוע מושלם מוסיפים את הריבוע של חצי מהמקדם של x , כלומר $(b/2)^2$, ומתקבל $x^2 + bx + (b/2)^2 = (x + b/2)^2$. במשוואה מוסיפים את המספר הזה לשני האגפים — לא לאגף אחד בלבד. אם המקדם המוביל אינו 1, מחלקים תחילה את כל המשוואה בו; בפונקציה מוציאים אותו כגורם משותף מהאיברים שמכילים את x . בהוצאת שורש אל תשכחו את $\pm$ — אחרת נעלם פתרון שלם. צורת הקדקוד היא $y = a(x - h)^2 + k$ והקדקוד הוא (h, k) — שימו לב שהסימן בסוגריים הפוך לשיעור הקדקוד.

שאלה 1 — האיבר המשלים — מקדמים זוגיים קל

איזה מספר יש להוסיף לכל ביטוי כדי להפוך אותו לריבוע מושלם, וכיצד ייראה הריבוע?

a. $x^2 + 6x$ ← _____

b. $x^2 - 10x$ ← _____

c. $x^2 + 14x$ ← _____

שאלה 2 — האיבר המשלים — גם כשהמקדם אינו זוגי קל

השלימו לריבוע מושלם וכתבו את הריבוע:

a. $x^2 + 20x$ ← _____

b. $x^2 + 3x$ ← _____

c. $x^2 - x$ ← _____

שאלה 3 — מריבוע מוכן אל הפתרון קל

פתרו בעזרת הוצאת שורש לשני הכיוונים. אל תשכחו את שני הסימנים.

a. $(x - 4)^2 = 25$

b. $(x + 2)^2 = 9$

c. $(x - 1)^2 = 0$

שאלה 4 — השלמה לריבוע — משוואה ראשונה קל

פתרו בהשלמה לריבוע ובדקו את שני הפתרונות בהצבה:

$$x^2 + 6x - 7 = 0$$

שאלה 5 — השלמה לריבוע — משוואה שנייה קל

פתרו בהשלמה לריבוע:

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

שאלה 6 — שתי משוואות בהשלמה לריבוע בינוני

פתרו בהשלמה לריבוע:

$$x^2 + 10x + 9 = 0 \text{ .a}$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0 \text{ .b}$$

שאלה 7 — מקדם מוביל שאינו 1 בינוני

חלקו תחילה במקדם המוביל, ורק אז השלימו לריבוע:

$$2x^2 + 8x - 10 = 0 \text{ .a}$$

$$3x^2 - 12x + 9 = 0 \text{ .b}$$

בינוני

שאלה 8 — צורת הקדקוד כשהמקדם המוביל הוא 1

כתבו כל פונקציה בצורת הקדקוד, וכתבו מהו הקדקוד:

a. $y = x^2 + 6x + 11$

b. $y = x^2 - 10x + 18$

בינוני

שאלה 9 — צורת הקדקוד — מוציאים גורם משותף

כתבו בצורת הקדקוד, וקבעו אם הקדקוד הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום:

a. $y = 3x^2 - 12x + 5$

b. $y = -2x^2 + 8x - 1$

בינוני

שאלה 10 — המחיר שממקסם את הרווח

הרווח החודשי של דוכן, באלפי שקלים, מתואר על ידי $y = -x^2 + 12x - 20$, כאשר x הוא מחיר המוצר בשקלים. כתבו את הפונקציה בצורת הקדקוד, ומצאו באיזה מחיר הרווח מרבי ומהו הרווח הזה.

שאלה 11 — תשובה מדויקת עם שורש מאתגר

פתרו בהשלמה לריבוע והשאירו תשובה מדויקת (עם סימן שורש):

$$x^2 + 6x + 4 = 0$$

שאלה 12 — מהקדקוד אל המשוואה מאתגר

פרבולה שקדקודה $(-3, 2)$ עוברת בנקודה $(0, 5)$. מצאו את המקדם המוביל a , וכתבו את הפונקציה גם בצורת הקדקוד וגם בצורה הכללית.

שאלה 13 — אתגר: כמה פתרונות, ולמה מאתגר

נתונה המשוואה $x^2 - 6x + k = 0$ עם פרמטר k . השלימו לריבוע, ואז קבעו:

a. עבור אילו ערכי k יש שני פתרונות שונים?

b. עבור איזה ערך יש פתרון יחיד, ומהו?

c. עבור אילו ערכים אין פתרון ממשי?

דף פתרונות למורה — פרק 4: השלמה לריבוע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מוסיפים 9: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ ב. מוסיפים 25: $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$ ג. מוסיפים 49: $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$

שאלה 2. א. מוסיפים 100: $x^2 + 20x + 100 = (x + 10)^2$ ב. מוסיפים $9/4$: $x^2 + 3x + 9/4 = (x + 3/2)^2$ ג. מוסיפים $1/4$: $x^2 - x + 1/4 = (x - 1/2)^2$

שאלה 3. א. $x - 4 = \pm 5$, ולכן $x = 9$ או $x = -1$ ב. $x + 2 = \pm 3$, ולכן $x = 1$ או $x = -5$ ג. פתרון יחיד $x = 1$

שאלה 4. מעבירים: $x^2 + 6x = 7$. חצי מ-6 הוא 3 וריבועו 9, ומוסיפים לשני האגפים: $(x + 3)^2 = 16$. מכאן $x + 3 = \pm 4$, כלומר $x = 1$ או $x = -7$. בדיקה: $1 + 6 - 7 = 0$ וגם $49 - 42 - 7 = 0$

שאלה 5. מעבירים: $x^2 - 8x = -12$. חצי מ-8 הוא -4 וריבועו 16: $(x - 4)^2 = 4$. מכאן $x - 4 = \pm 2$, כלומר $x = 6$ או $x = 2$. בדיקה: $36 - 48 + 12 = 0$ וגם $4 - 16 + 12 = 0$

שאלה 6. א. $x^2 + 10x = -9 \rightarrow (x + 5)^2 = 16 \rightarrow x + 5 = \pm 4$, ולכן $x = -1$ או $x = -9$ ב. $x^2 - 2x = 15 \rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0$, ולכן $x = 5$ או $x = -3$

שאלה 7. א. מחלקים ב-2 ומקבלים $x^2 + 4x - 5 = 0 \rightarrow (x + 2)^2 = 9 \rightarrow x + 2 = \pm 3$, ולכן $x = 1$ או $x = -5$ ב. מחלקים ב-3 ומקבלים $x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow (x - 2)^2 = 1 \rightarrow x - 2 = \pm 1$, ולכן $x = 3$ או $x = 1$

שאלה 8. א. $y = (x^2 + 6x + 9) - 9 + 11 = (x + 3)^2 + 2$ ב. $y = (x^2 - 10x + 25) - 25 + 18 = (x - 5)^2 - 7$

שאלה 9. א. $y = 3(x^2 - 4x) + 5 = 3(x - 2)^2 - 12 + 5 = 3(x - 2)^2 - 7$ והוא מינימום כי $a = 3 > 0$ ב. $y = -2(x^2 - 4x) - 1 = -2(x - 2)^2 + 8 - 1 = -2(x - 2)^2 + 7$ והוא מקסימום כי $a = -2 < 0$

שאלה 10. מוציאים -1 כגורם ומשלימים: $y = -(x^2 - 12x) - 20 = -(x - 6)^2 + 36 - 20 = -(x - 6)^2 + 16$ והקדקוד הוא (6, 16), ולכן במחיר 6 שקלים הרווח מרבי ושווה 16 אלף שקלים. בדיקה: $-36 + 72 - 20 = 16$

שאלה 11. מעבירים: $x^2 + 6x = -4$. מוסיפים 9 לשני האגפים: $(x + 3)^2 = 5$. מוציאים שורש: $x + 3 = \pm \sqrt{5}$, ולכן $x = -3 + \sqrt{5}$ או $x = -3 - \sqrt{5}$

שאלה 12. מציבים בצורת הקדקוד $y = a(x - 2)^2 - 3$ עבור $x = 0$ מקבלים $4a - 3 = 5$, ולכן $a = 2$. צורת הקדקוד: $y = 2(x - 2)^2 - 3$; ובפתיחת הסוגריים $y = 2x^2 - 8x + 5$. בדיקה: עבור $x = 0$ מתקבל $y = 5$ ✓

שאלה 13. משלימים: $x^2 - 6x = -k \rightarrow x^2 - 6x + 9 = 9 - k$. א. שני פתרונות שונים כאשר $9 - k > 0$, כלומר $k < 9$
ב. פתרון יחיד $x = 3$ כאשר $k = 9$ ג. אין פתרון ממשי כאשר $9 - k < 0$, כלומר $k > 9$