

# דף עבודה — פרק 3: פירוק טרינום ריבועי

שני מספרים שסכומם  $b$  ומכפלתם  $c$

שם: .....

כיתה: .....

תאריך: .....

כדי לפרק שילוש מהצורה  $x^2 + bx + c$  מחפשים שני מספרים שסכומם  $b$  ומכפלתם  $c$ , וכותבים  $(x + p)(x + q)$ . את הסימנים אפשר לקבוע מראש: אם האיבר החופשי חיובי — לשני המספרים אותו סימן, והוא הסימן של האיבר האמצעי; אם האיבר החופשי שלילי — הסימנים הפוכים, והגדול בערכו המוחלט נושא את הסימן של האיבר האמצעי. החיפוש נעשה שיטתית: עוברים על כל זוגות המחלקים של האיבר החופשי ובודקים לכל זוג את הסכום. לפני הכול בודקים אם יש גורם משותף להוציא, ובסוף בודקים בפתיחת סוגריים.

## שאלה 1 — סכום ומכפלה קל

מצאו שני מספרים המקיימים:

a. סכום 7 ומכפלתם 12  $\leftarrow$  \_\_\_\_\_

b. סכום 5 ומכפלתם 6  $\leftarrow$  \_\_\_\_\_

c. סכום 9 ומכפלתם 8  $\leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — פירוק ראשון קל

פרקו לגורמים:

a.  $x^2 + 5x + 6 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $x^2 + 8x + 15 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — עוד שני סימני פלוס קל

פרקו לגורמים:

a.  $x^2 + 7x + 12 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $x^2 + 9x + 20 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — שילוש בודד קל

פרקו לגורמים:  $x^2 + 6x + 8$

התוצאה: \_\_\_\_\_

## שאלה 5 — בדיקה בפתיחת סוגריים קל

פרקו לגורמים את  $x^2 + 11x + 18$ , ואז פתחו סוגריים כדי לוודא שחזרתם לביטוי המקורי.

התוצאה: \_\_\_\_\_

## שאלה 6 — שני מספרים שליליים בינוני

פרקו לגורמים:  $x^2 - 7x + 10$

.....

## שאלה 7 — מחלקים גדולים יותר בינוני

פרקו לגורמים:  $x^2 - 9x + 18$

.....

## שאלה 8 — האיבר החופשי שלילי בינוני

פרקו לגורמים:  $x^2 + 4x - 21$

.....

## שאלה 9 — שני סימנים שליליים בינוני

פרקו לגורמים:  $x^2 - 3x - 10$

.....

## שאלה 10 — האיבר האמצעי הוא איקס בודד בינוני

פרקו לגורמים:  $x^2 - x - 12$

.....

## שאלה 11 – שניים שנבדלים רק בסימן בינוני

פרקו את שני הביטויים והשוו ביניהם:

$$a. \quad \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow x^2 + 11x + 24$$

$$b. \quad \underline{\hspace{2cm}} \leftarrow x^2 - 11x + 24$$

## שאלה 12 – אתגר: מחלקים רבים מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים:  $x^2 - 13x + 36$

---

---

---

## שאלה 13 – אתגר: סימנים הפוכים מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים:  $x^2 + 2x - 35$

---

---

---

## שאלה 14 – אתגר: רק אחד מתפרק מאתגר

רק אחד משני הביטויים מתפרק לגורמים בעזרת מספרים שלמים. קבעו איזה, פרקו אותו, והראו מדוע השני אינו מתפרק:

$$a. \quad x^2 + 5x + 4$$

$$b. \quad x^2 + 5x + 7$$

---

---

---

## שאלה 15 – אתגר: קודם גורם משותף מאתגר

פרקו עד הסוף:  $2x^2 + 10x + 12$

---



## דף פתרונות למורה — פרק 3: פירוק טרינום ריבועי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 3 ו-4 ב. 2 ו-3 ג. 1 ו-8

שאלה 2. א.  $(x + 2)(x + 3)$  ב.  $(x + 3)(x + 5)$

שאלה 3. א.  $(x + 3)(x + 4)$  ב.  $(x + 4)(x + 5)$

שאלה 4.  $(x + 2)(x + 4)$

שאלה 5.  $(x + 2)(x + 9)$  — בדיקה:  $x^2 + 9x + 2x + 18 = x^2 + 11x + 18$

שאלה 6.  $(x - 2)(x - 5)$  — מכפלה 10 וסכום -7

שאלה 7.  $(x - 3)(x - 6)$  — מכפלה 18 וסכום -9

שאלה 8.  $(x + 7)(x - 3)$  — מכפלה -21 וסכום 4

שאלה 9.  $(x - 5)(x + 2)$  — מכפלה -10 וסכום -3

שאלה 10.  $(x - 4)(x + 3)$  — מכפלה -12 וסכום -1

שאלה 11. א.  $(x + 3)(x + 8)$  ב.  $(x - 3)(x - 8)$  — אותה מכפלה 24, סכומים נגדיים

שאלה 12.  $(x - 4)(x - 9)$  — בדיקה:  $x^2 - 9x - 4x + 36 = x^2 - 13x + 36$

שאלה 13.  $(x + 7)(x - 5)$  — בדיקה:  $x^2 - 5x + 7x - 35 = x^2 + 2x - 35$

שאלה 14. א' מתפרק:  $(x + 1)(x + 4)$ . ב' אינו מתפרק — מכפלה 7 מתקבלת רק מהזוגות 1 ו-7 (סכום 8) או 1 ו-7- (סכום -8), ואף אחד מהם אינו נותן סכום 5

שאלה 15.  $2x^2 + 10x + 12 = 2(x^2 + 5x + 6) = 2(x + 2)(x + 3)$