



קבוצה	משככי כאב, נוגדי חום
מנגנון הפעולה	עיכוב פעילות האנזים Cyclooxygenase 3 (COX3) המצוי במערכת העצבים המרכזית בלבד. מכיוון שאקמול אינו פועל על האנזימים COX1 ו-COX2 (כמו NSAID) הוא אינו משפיע על טסיות הדם ועל מערכת החיסון. אקמול אינו שייך לקבוצת התרופות (Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs) NSAID ואינו נוגד דלקת.
פרמקוקינטיקה	מתן ב-P.O - ספיגה מהירה דרך מערכת העיכול. - שיא ההשפעה לאחר 1-2 שעות. - טווח ההשפעה הוא 3-4 שעות. - זמן מחצית החיים 1-3 שעות. מתן ב-I.V - השגת אפקט בתוך 10-15 דקות. - פירוק התרופה נעשה בכבד.
התוויות לשימוש	כאב בדרגה קלה או בינונית; הורדת חום.
התוויות נגד	חולים הסובלים ממחלת כבד כרונית. רגישות ידועה לתרופה.
תופעות לוואי	כאבי בטן; בחילות והקאות.
מינון	מתן ב-P.O ילדים – 15 mg/kg. מקסימום למנה – 250 mg. מבוגרים – 500-1000 mg. מתן ב-I.V - תינוקות (מעל שנה), ילדים ונוער (עד 50 ק"ג) – 15 mg/kg. - מבוגרים (מעל 50 ק"ג) – 1 gr.
צורות מתן במד"א	I.V טבלייה למתן ב-P.O
מופיע בפרוטוקול	<u>הטיפול בכאב; ירידה בפרפוזיה (שלא על רקע טראומה)</u> (כטיפול להורדת חום).