



קבוצה	תרופות לטיפול בהפרעות קצב
מנגנון הפעולה	אדנוזין מאט את ההולכה ב-AV Node ומעכב את ההולכה במסלול Re-entry. הוא פועל על קבוצת רצפטורים (A 1-4) המקושרים לחלבון G, ומעכבים או משפיעים על פעילות האנזים Adenylate Cyclase. השפעתו הלבבית מושגת בתיווך הרצפטור A1 המעכב את פעילות האנזים, מוריד את רמות ה-CAMP – ומוביל לרפולריזציה של התא.
פרמקוקינטיקה	השפעה מיידית. זמן מחצית חיים של 10 שניות.
התוויות לשימוש	חשד לטכקירדיה על-חדרית (SVT).
התוויות נגד	רגישות יתר ידועה; Sick Sinus Syndrome; חסם הולכה מדרגה שנייה או שלישית. אסתמה קשה.
תופעות לוואי	ירידת לחץ דם; flushing; בחילות; הקאות; כאב בחזה; כאב ראש.
מינון	מבוגרים – מנה ראשונה 6 mg, מנה שנייה 12 mg. ילדים – מנה ראשונה 0.1 mg/kg (מנה מקסימלית 6 mg), מנה שנייה 0.2 mg/kg (מנה מקסימלית 12 mg).
דגשים בעת השימוש	השכבת המטופל, מתן בווריד גדול ופרוקסימלי, הרמת היד לאחר המתן, מתן מיידי של בולוס סליין.
צורות מתן במד"א	מתן תוך-וריד I.V.
מופיע בפרוטוקול	<u>טכיקרדיה במבוגר; טכיאריטמיה בקומפלקס רחב - מבוגר; טכיאריטמיה בקומפלקס צר - מבוגר; טכיאריטמיה בקומפלקס רחב בתינוקות ובילדים; טכיאריטמיה בקומפלקס צר בתינוקות ובילדים</u>