

קבוצה	אלקטרוליט
מנגנון הפעולה	סידן הכרחי ונחוץ בפעילותם של תהליכים פיזיולוגים רבים וביניהם הולכה עצבית ופעילות השרירים. לסידן יש השפעה גדולה על סף הגירוי של המערכת העצבית בכלל ועל שחרורם של ניוטרנסמיטרים בפרט. סידן הכרחי להתכווצות תקינה של השרירים, לתפקוד הכליה, לקרישת הדם ולפעילות הלב. סידן הוא חלק ממערכת הבקרה של שחרור ואגירת ניוטרנסמיטרים. בשריר, סידן נקשר לטרופונין ויחד עם נוכחות ATP (אנרגיה כימית) מאפשר לשריר להתכווץ. במערכת העצבים, סידן במצבו היוני נושא מטען חיובי מאוד (Ca^{++}) הגורם לממברנה להיות יציבה. אם רמות הסידן נמוכות מדי נירונים ותאי לב יהיו בעלי סף גירוי נמוך לצורך הפעלה וכתוצאה מכך יופיעו עוויתות (Tetany).
פרמקוקינטיקה	השפעה מיידית. שיא פעילות מידי.
התוויות לשימוש	נטילת יתר של חסמי בטא; היפרקלמיה; נטילת יתר של חסמי תעלות סידן; חשיפה לחומצה הידרופלורית.
התוויות נגד	אי־ספיקת לב; אי־ספיקת כליות; חולים הנוטלים דיגיטאליס.
תופעות לוואי	עקצוץ באזור העירוי; ירידת לחץ דם; עילפון; הפרעות קצב; דום לב.
מינון	מבוגרים – 1 gr. תינוקות וילדים – 60 mg/kg (מקסימום 1 gr).
צורות מתן במד"א	I.V בהזלפה תוך 5 דקות.
מופיע בפרוטוקול	חשד לתסמונת מעיכה (היפרקלמיה עם שינויים באק"ג).

