

קבוצה	תרופה אנטי־פסיכוטית
מנגנון הפעולה	דרופרידול היא תרופה אנטי־פסיכוטית השייכת למשפחת הבוטירופנונים. התרופה משיגה את השפעתה מעצם היותה אנטגוניסט לרצפטורי דופמין מסוג D2 ב־chemoreceptor trigger zone במוח. לפיכך יש לה גם פעילות אנטי־אמטית (נגד בחילות והקאות). קישור נוסף מתקיים גם אל רצפטורי GABA ב־CNS ומשיג אפקט של הרגעת המטופל והפחתת חרדה. נוסף על כך לדרופרידול יש גם אפקט אנטי־היסטמיני ואנטי־סרוטונינרטי – אם כי חלש יותר. מנגנון הפעולה המדויק של התרופה עדיין אינו ברור דיו.
פרמקוקינטיקה	תחילת השפעה תוך 3-10 דקות. שיא ההשפעה לאחר כ־30 דקות. זמן מחצית חיים: כשעתיים
התוויות לשימוש	דליריום; התקף פסיכוטי אקוטי. (מומלץ לשלב עם דורמיקום)
התוויות נגד	רגישות ידועה לתרופה; Prolonged QT Syndrome מולד או נרכש.
תופעות לוואי	לחץ דם נמוך; טכיקרדיה; חרדה; אי־שקט מוטורי; היפראקטיביות. עוד עלולות להופיע תופעות אקסטרה־פירמידליות, כגון תסמינים דמויי פרקינסון. בספרות נמצאו מעט דיווחים על התפתחות הפרעות קצב חדריות משניות ככל הנראה להארכת מקטע QT. הסיכוי לפרכוס בקרב חולי אפילפסיה גדל בשל הורדת סף הגירוי לפרכוס. במקרה זה יש לטפל בדומה לפרכוס כרגיל.
מינון	מבוגרים – 5 mg מתן ב־I.M, או 2.5 mg מתן ב־I.V. במידת הצורך אפשר לחזור על המנה לאחר 20–30 דקות. ילדים – אפשר לטפל מעל גיל 16 בלבד במינון הזהה למבוגרים. – מעל גיל 75 אפשר לטפל במנה אחת בלבד.
צורות מתן במד"א	I.M, I.V
מופיע בפרוטוקול	<u>מענה רפואי למטופל אובדני או למטופל עם חשד להפרעה נפשית מגבילה;</u> <u>דליריום</u>

