

קבוצה	משכך כאבים ממשפחת האופיאטים
מנגנון הפעולה	פנטניל הוא אופיאט סינטטי בעל השפעה מהירה ומשך פעילות קצר יחסית. הפנטניל הוא אגוניסט חזק לרצפטורי μ -opioid, וככזה הוא פוטנטי פי 100 ממורפין בשיכון כאב. הפוטנטיות הרבה שלו מיוחסת לרמת הליפופיליות הגבוהה שלו המאפשרת חדירה מהירה ל-CNS.
פרמקוקינטיקה	בשל שימוש הנרחב, בשנים האחרונות פותחו פרומולציות רבות המאפשרות את מתן הפנטניל באמצעות מדבקות עוריות, כדורי מציצה, סוכריות על מקל, ספריי תת-לשוני, משאפים ומתן תוך-אפי. בשונה ממורפין, פנטניל אינו גורם לשחרור היסטמין ולרוב אינו גורם לבחילות והקאות.
התוויות לשימוש	תחילת השפעה תוך דקות. משך ההשפעה כ-30–60 דקות. זמן מחצית חיים 2–4 שעות.
התוויות נגד	שיכון כאב.
תופעות לוואי	רגישות או אי-סבילות ידועה לפנטניל או לתרכופות ממשפחת האופיאטים.
מינון	דיכוי נשימתי; ברדיקרדיה; ירידה או עלייה בלחץ הדם; סחרחורת; בלבול; יובש בפה; ישנוניות; בחילה; הזעה.
צורות מתן במד"א	– 1-2 mcg/kg מקסימום למנה בודדת – 100 mcg. אפשר לחזור פעם אחת על המנה לאחר 5–10 דקות אם לא הושג האפקט הרצוי. במתן ב-I.N – אפשר לחזור פעם אחת על מחצית המינון לאחר 10–15 דקות. – במטופלים עם לחצי דם נמוכים, בקשישים (מעל גיל 75 שנים) ובחולי COPD יש להפחית את המינון (¼ מהמינון הרגיל).
דגשים נוספים	I.N / I.M / I.V
מופיע בפרוטוקול	יש להקפיד לתת את התרופה בהזרקה איטית במשך 1–2 דקות, יש להקפיד ולבצע הערכת כאב חוזרת 10 דקות לאחר המתן, יש להקפיד על ניטור מלא של המטופל (לרבות מדידות לחץ דם חוזרות) בכל מהלך הטיפול והפינוי.
	הטיפול בכאב; תסמונת כלילית חריפה (ACS)

