



קבוצה	ויטמין B 12
מנגנון הפעולה	הידרוקסיקובלמין הוא ויטמר של הוויטמין B12 (אינו מיוצר באופן טבעי בגוף, הופך לנגזרת פעילה בעקבות פעילות של אנזים ייעודי). ויטמין B12 הוא למעשה סדרה של תרכובות החיוניות לייצור DNA בתאים, יצירת תאי דם על ידי מח העצם, וכמו כן הוא חיוני לפעילותה של מערכת העצבים. בהרעלת ציאניד פועל ההידרוקסיקובלמין באמצעות היקשרות ליוני הציאניד והרחקתם מהגוף. התרכובת המצומדת (ציאנוקובלאמין) אינה רעילה ומופרשת בשתן. ההידרוקסיקובלמין נקשר ליוני הציאניד הן בזרם הדם הן בתוך התאים.
פרמקוקינטיקה	ספיגה מהירה מזרם הדם.
התוויות לשימוש	חשד (קליני) להרעלת ציאניד.
התוויות נגד	אין התוויות נגד למתן התרופה. אין להזליף את התמיסה באותו עירוי עם תיאוסולפט או דוכמין – מחשש להיווצרות גבישים בתמיסה!
תופעות לוואי	עלייה בלחץ הדם, תופעות אלרגיות שונות (בעיקר פריחה), טכיקרדיה, פעימות לב מוקדמות, נפיחות מקומית באזור העירוי. דיסקולורציה של השתן (צבע אדום) החולפת בתוך מספר ימים.
מינון	מבוגרים – 5 gr בהזלפה תוך 15 דקות. תינוקות וילדים – 70 mg/kg (מקסימום 5 gr) בהזלפה תוך 15 דקות. יש למהול ב־200 ml סליין.
צורות מתן במד"א	ב־I.V – ערכת ציאנוקיט
מופיע בפרוטוקול	<u>הטיפול בנפגע משאיכת עשן</u>