



| קבוצה                  | ניטרט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מנגנון הפעולה</b>   | <p>לאיזוקט מספר השפעות מקבילות הגורמות לאפקט אנטיאנגיוטי –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- הרפיית השריר החלק בדופן כלי הדם הוורידים – הקטנת ההחזר הווריד אל הלב (הקטנה של ה-Pre-Load).</li> <li>- הרפיית השריר החלק בדופן כלי הדם העורקיים – הפחתה בתנגודת הסיסטמית (After-Load) והרחבת כלי הדם הכליליים.</li> </ul> <p>במתן פומי ספיגת התרופה כמעט מלאה אך הזמינות הביולוגית נמוכה. עם השימוש עולה הזמינות הביולוגית אצל החולה. התרופה מתפרקת בכבד לשני מטבוליטים (2 מונוניטרט [20%] ו-5 מונוניטרט [80%]). בעוד זמן מחצית החיים של איזוקט הוא כשעה, זמן מחצית החיים של המטבוליט הפעיל 5 מונוניטרט הוא 5 שעות.</p> |
| <b>פרמקוקינטיקה</b>    | <p>תחילת ההשפעה בתוך 1–3 דקות (מתן ב-S.L / I.V.).</p> <p>שיא ההשפעה לאחר 5–10 דקות (מתן ב-S.L / I.V.).</p> <p>משך ההשפעה 20–30 דקות (מתן ב-S.L), 3–6 שעות (מתן ב-I.V.).</p> <p>זמן מחצית חיים 60 דקות.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>התוויות לשימוש</b>  | חשד לתסמונת כלילית חריפה; בצקת ריאות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>התוויות נגד</b>     | <p>לחץ דם סיסטולי נמוך מ-100 mmHg; ירידה של 20% ויותר מתחת לערך הדיאסטולי שנמדד בתחילת הטיפול; היפוולמיה; שימוש בתרופות לאינאונות ב-36 השעות האחרונות; חשד לאוטם ימני; היצרות קשה של המסתם האאורטלי.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>תופעות לוואי</b>    | ירידה בלחץ הדם; כאבי ראש; עילפון; טכיקרדיה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>מינון</b>           | <p><b>מתן ב-S.L – 1-3 מנות ספריי בתוך 3-5 דקות.</b></p> <p><b>מתן ב-I.V – Drip:</b></p> <p>מינון התחלתי של 20 mcg/min.</p> <p>אפשר לעלות ב-20 mcg כל 5-10 דקות.</p> <p>מינון מקסימלי 200 mcg/min.</p> <p>מהילה לדוגמה – 60 mcg/1 ml = 6 mg/100 ml (בסט רגיל 3 mcg = 1 drop).</p> <p><b>מתן ב-I.V – PUSH:</b></p> <p>1-2 mg למנה ב-PUSH.</p> <p>ניתן לחזור על המנה כל 5-10 דקות.</p> <p>מינון מקסימלי לשעה – 12 mg.</p> <p>מהילה – יש למהול את התרופה כי 2.</p>                                                                                                                                                                  |
| <b>צורות מתן במד"א</b> | I.V, S.L (spray)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>מופיע בפרוטוקול</b> | <b>תסמונת כלילית חריפה (ACS); בצקת ריאות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |