

קבוצה	תרופות לטיפול ביתר־לחץ דם
מנגנון הפעולה	התרופה משלבת יכולות של עיכוב סלקטיבי לפעילות רצפטורים מסוג אלפא 1 עם עיכוב לא סלקטיבי של רצפטורים מסוג בטא. בשל פעילותה התרופה גורמת לווזודילטציה עורקית ולהפחתת תפוקת הלב (באמצעות האטת הדופק והקטנת נפח הפעימה). האפקט הסופי יהיה הורדת לחץ הדם.
פרמקוקינטיקה	תחילת ההשפעה מיידית. שיא ההשפעה לאחר 5 דקות. זמן מחצית חיים 3 שעות.
התוויות לשימוש	הורדת לחץ דם. אזהרה: יש להימנע מהורדה מהירה מדי של ערכי לחץ הדם מחשש לפגיעה באספקת הדם למוח.
התוויות־נגד	רגישות ידועה לאחד ממרכיבי התרופה; ברדיקרדיה מתחת ל־60 דקה; חסם עלייתי־חדרי מדרגה II ומעלה; היסטוריה של אסתמה קשה.
תופעות לוואי	סחרחורת; ברדיקרדיה; בלבול; טשטוש ראייה.
מינון	בולוסים חוזרים במינון של 20 mg, בהזרקה איטית, כל 5–10 דקות, עד להשגת אפקט רצוי. מינון מקסימלי – 300 mg
צורות מתן במד"א	I.V bolus
מופיע בפרוטוקול	<u>גישה למטופל עם חשד לאירוע מוחי; רעלת היריון (פרה־אקלמפסיה/אקלמפסיה)</u>

