



קבוצה	אלקטרוליט
מנגנון הפעולה	תרכובת כימית המורכבת ממגנזיום, סולפט, גופרית וחמצן ($MgSO_4$). למגנזיום מטען חשמלי הדומה לסיידן ולכן הוא יכול להחליפו בחלק מהתהליכים הפיזיולוגיים. עם זאת מולקולת הסיידן גדולה משמעותית ממולקולת המגנזיום ועל כן המגנזיום אינו יכול לשמש תחליף בכל התהליכים שבהם דרוש סיידן. המגנזיום יכול למנוע מסידן להיקשר לטרופונין וכך למנוע את כיווץ השריר. מעכב את מעבר אותות עצב־שריר באמצעות שינוי סף פוטנציאל הפעולה.
פרמקוקינטיקה	השפעה מיידית. משך ההשפעה כ־30 דקות.
התוויות לשימוש	פרכוסים (רעלת היריון); התקף אסתמה קשה; טיפול בהפרעות קצב (TDP); היפומגנזמיה.
התוויות נגד	אי־ספיקת כליות; חסמי הולכה; נזק ישן לשריר הלב.
תופעות לוואי	ירידה חדה בלחץ הדם; דיכוי נשימתי / CNS; הזעה; סומק.
מינון	מבוגרים – Pulseless VT (חשד ל־TDP) 1-2 gr – במתן ב־PUSH יש למהול ל־25% בתמיסת סליין. – WCT (חשד ל־TDP) 2 gr – התקף אסתמה קשה – 2 gr – פרכוסים (אקלמפסיה) – 4 gr – מיהול בתוך 100 ml תמיסת סליין. הזלפה במשך 10 דקות. ילדים – Pulseless VT – 25-50 mg/kg (מנה מקסימלית 2 gr). – במתן ב־PUSH יש למהול ל־25% בתוך 5-10 ml תמיסת סליין. – WCT והתקף אסתמה קשה – 50 mg/kg (מנה מקסימלית 2 gr). – מיהול בתוך תמיסת סליין. להזליף תוך 10-15 דקות.
צורות מתן במד"א	I.V
מופיע בפרוטוקול	<u>דום לב במבוגר VT/VF; טכיאריטמיה בקומפלקס רחב - מבוגר; טכיאריטמיה בקומפלקס רחב - תינוקות וילדים; התקף אסתמה במבוגר, התקף אסתמה בילדים; רעלת היריון (פרה־אקלמפסיה/אקלמפסיה)</u>