

קבוצה	חוסם בטא
מנגנון הפעולה	מטופרולול הוא חסם סלקטיבי של רצפטורים מסוג בטא 1 המצויים בעיקר על פני ממברנת תאי שריר הלב ובכליות. חסימת רצפטורים אלו על פני תאי המיוקרד ומערכת ההולכה מאיטה את קצב הלב, מאיטה את מהירות ההולכה ומגינה על החדרים מפני קצבים מהירים המועברים מהעליות.
פרמקוקינטיקה	תחילת השפעה תוך כ־10 דקות (מתן ב־I.V.). זמן מחצית חיים עשוי להגיע למספר שעות בהתאם לצורת המתן והמינון.
התוויות לשימוש	האטת הפרעות קצב מהירות; טיפול בתעוקת חזה; יתר־לחץ דם; מיגרנה.
התוויות נגד	רגישות ידועה לתרופה; חסם הולכה מלא או מדרגה שנייה, WPW.
תופעות לוואי	בחילה; ברונכוספזם; ברדיקרדיה; ירידה בלחץ הדם, חולשה, סחרחורת.
מינון	מנה ראשונה – 2.5 mg. מנות המשך (לפי הצורך) – 2.5-5 mg, כל 5-10 דקות, עד למינון מקסימלי של 15 mg. התרופה אינה מיועדת למתן בילדים!
צורות מתן במד"א	I.V.
מופיע בפרוטוקול	<u>טכונתמיה בקומפלקס צר – מבוגרים</u>

