



קבוצה	משתק שרירים לטווח בינוני במנגנון nondepolarizing
מנגנון הפעולה	רוקורוניום הוא אנטגוניסט (מדכא) תחרותי לרצפטור הניקוטין של אצטיל-כולין. קישור התרופה לרצפטור ב־motor end-plate מונע את היכולת של אצטיל-כולין להיקשר לרצפטור ולהפעילו. האפקט המתקבל הוא שיתוק לטווח בינוני (30–40 דקות) של השרירים המשרוטים. רוקורוניום משמש לצורך אינדוקציה (בשילוב תרופות אנסטטיות דוגמת אטומידט או קטמין) בעת ביצוע אינטובציה, וכן במצבים שבהם נדרש שיתוק שרירים לאורך זמן, כגון ניתוחים או מטופלים מונשמים.
פרמקוקינטיקה	השפעה תוך 1–2 דקות. זמן מחצית חיים של 30–40 דקות.
התוויות לשימוש	שיתוק שרירים לטווח בינוני (30–40 דקות) לצורך הנשמה מיטבית של מטופל הסובל מאי־ספיקה נשימתית.
התוויות נגד	רגישות יתר ידועה.
תופעות לוואי	תגובה אלרגית; כאבי שרירים; שינויים בלחץ הדם.
מינון	שיתוק שרירים במטופל מונשם – 0.6 mg/kg מנה חד־פעמית. כחלק מפרוטוקול RSI – 1 mg/kg – מנה חד־פעמית.
צורות מתן במד"א	I.V
מופיע בפרוטוקול	<u>ניהול מתקדם של נתיב האוויר</u>
הערה	יש להקפיד על ניטור רצף (סטורציה וקפנומטריה) של כל מטופל מונשם שקיבל רוקורוניום.