

קבוצה	אלקטרוליט
מידע	אבקת סודיום ביקרבונט היא למעשה סודה לשתייה. השימושים בחומר זה רבים ומגוונים, לדוגמה שימוש כסוג של סבון במצרים העתיקה, כחומר ניקוי, לבישול ולאפייה ואף כחומר לשיפור ביצועי ספורטאים.
מנגנון הפעולה	נוגד חומצה מערכתי מהיר וחזק. מעלה באופן מיידי את רמות pH בפלזמה כיוון שמשמש כבופר לעודף יוני מימן. בתמיסת התרופה הנתרן (Na^+) והביקרבונט (HCO_3^-) נפרדים, ומולקולת הביקרבונט יכולה לקבל את יוני המימן (H^+) החיוביים ולהפוך לחומצה קרבונית (H_2CO_3). בשל התכונות הכימיות של מולקולת הביקרבונט היא מתחברת בהעדפה ליוני המימן ולא ליוני הנתרן החופשיים בתמיסה גם כן. החומצה הקרבונית תפורק בהמשך למים ולפחמן דו־חמצני. בטיפול במינון יתר של תרופות ממשפחת הטריציקליים, מעבר לטיפול בחמצת שעלולה להיווצר, יוני הנתרן חשובים על מנת להתגבר על חסימת תעלות הנתרן שמתרחשת גם בהרעלה.
פרמקוקינטיקה	השפעה מידית. משך ההשפעה 1–2 שעות.
התוויות לשימוש	היפרקלמיה; חמצת מטבולית ידועה; אי־ספיקת כליות כרונית; הרעלת תרופות מסוג טריציקליים (תרופות נוגדות דיכאון); טיפול מניעתי בפציעות מעיכה.
התוויות נגד	אין התוויות נגד כאשר מדובר באחד ממקרי ההתוויות לשימוש.
תופעות לוואי	היפוקלמיה; היפרנטרמיה; יתר לחץ דם; Hyperosmolar syndrome
מינון	החייאה ו־ROSC – 1 meq/kg. תסמונת מעיכה – 50 meq בליטר סליין (מנה חד־פעמית).
צורות מתן במד"א	I.V
מופיע בפרוטוקול	<u>דום לב במבוגר VT/VF; דום לב במבוגר PEA/ASYSTOLE; הטיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC); טיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC) - תינוקות וילדים; חשד לתסמונת מעיכה</u>

