

קבוצה	נוגד הרעלת ציאניד
מנגנון הפעולה	לסודיום תיוסולפט שימושים בתחומים רבים ביניהם בתעשיית הצילום, הכימיה, הביולוגיה. גם בתחום הרפואה לסודיום תיוסולפט שימושים שונים כאשר אחד מהם הוא היותו אנטידוט בעת הרעלת ציאניד. במתן סודיום תיוסולפט בעת הרעלת ציאניד, מולקולת הציאניד הופכת לתיוציאנט הפחות רעיל ובהמשך מופרש בשתן. הוא משמש כמרכיב רפואי במקרים נוספים, כגון המודיאליזה, כימותרפיה ותכשירים עוריים אנטי־פטריותיים. בעת שימושו כאנטידוט להרעלת ציאניד פועל רק על הציאניד המצוי בזרם הדם.
פרמקוקינטיקה	לא קיים מספיק מידע בבני אדם.
התוויות לשימוש	חשד להרעלת ציאניד. יש לחשווד בהרעלת ציאניד אצל נפגעי שאיפת עשן במקום סגור, ויש ירידה במצב ההכרה (שלא עקב חבלת ראש) ופגיעה קרדיווסקולרית.
התוויות נגד	אין חל איסור על מתן בויזמני של התרופה באותה גישה ורידית עם הידרוקסיקובלמין.
מינון	מבוגרים – 10-12.5 gr, בהזלפה תוך 10 דקות. ילדים – 400 mg/kg (מנה מקסימלית 12.5 gr), בהזלפה תוך 10 דקות.
צורות מתן במד"א	I.V
מופיע בפרוטוקול	<u>הטיפול בנפגע משאיפת עשן</u>

