



קבוצה	קושר סלקטיבי של משתקי שרירים
מנגנון הפעולה	המבנה המולקולרי של התרופה מאפשר לה "לעטוף" את מולקולת הרוקורניום וכך למנוע את התקשרותה לרצפטור של אצטיל-כולין בסינפסה. בניגוד לתרופות אחרות היא אינה משפיעה על פעילות האנזים אצטילכולינאסטרז ולפיכך אינה גורמת ל"ריבאונד" מוסקריני (כלומר אין צורך לתת אטרופין במקביל). לתרופה יש אפיניות גם למשתקי שרירים אחרים, אם כי נמוכה בהרבה מהאפיניות לרוקורניום. במקרים נדירים תיתכן חזרה של פעילות משתק השרירים, ולפיכך חובה להמשיך ולנטר את המטופל ברציפות (סטורציה וקפנומטריה).
פרמקוקינטיקה	תחילת השפעה (ביטול הפעילות של משתק השרירים שניתן) צפויה בטווח של 2-3 דקות מרגע מתן התרופה ב-I.V.
התוויות לשימוש	צורך בביטול מיידי של השפעת משתק שרירים עקב התפתחות מצב של can't intubate or can't ventilate במטופל שקיבל רוקורניום.
התוויות נגד	אין התוויות נגד כאשר מדובר בצורך מיידי לביטול השפעתו של משתק השרירים.
תופעות לוואי	לא משמעותיות.
מינון	16 mg/Kg – במנה חד-פעמית. 1500 mg – מקסימום למנה
צורות מתן במד"א	I.V
מופיע בפרוטוקול	<u>ניהול מתקדם של נתיב האוויר</u>