



קבוצה	משכן כאבים אופיאטי
מנגנון הפעולה	טרמדקס הוא אופיאט סינתטי, הוא יוצר על ידי חברת GmbH בשנות השבעים, והוא משמש בעיקר לשיכוך כאבים בינוניים עד חזקים. טרמדקס משיג את השפעתו בעיקר בשל היותו μ-opioid receptor agonist, serotonin releasing agent & norepinephrine reuptake inhibitor. מנגנון פעולתו כמשכך כאבים עדיין אינו מובן לגמרי, והשפעתו מושגת ככל הנראה גם באמצעות פעילותו על הסרטונין ועל הנוראדרנלין, נוסף לקישור שלו בעוצמה הבינונית למערכת האופיאטית. המטבוליט העיקרי של טרמדקס הוא O-desmethytramadol. המטבוליט נקשר חזק יותר כי 200 לרצפטורים אופיאטים ומשכך כאבים חזק כי 6 מהטרמדקס עצמו. שיכוך הכאב של טרמדקס מופסק רק חלקית לאחר מתן נרקן בשל פעילותו במערכת הסרטונין – נוראדרנלין. מתן נרקן לאחר נטילה של טרמדקס (גם במינון יתר) עלול לגרום לפרכוס.
פרמקוקינטיקה	תחילת ההשפעה מהירה מאוד. שיא ההשפעה לאחר 1.5–2 שעות. זמן מחצית חיים 5–7 שעות.
התוויות לשימוש	טיפול בכאב בינוני.
התוויות נגד	גיל מתחת ל-14; מטופלים הנוטלים בקביעות מעכבי MAO; נשים בהריון/מניקות
תופעות לוואי	סחרחורת; ישנוניות; טשטוש; בחילות; הקאות; עצירות; כאב ראש; הזיות; אופוריה.
מינון	50-100 mg Flashtab
צורות מתן במד"א	P.O Flashtabs פלשטאבס – למציצה בלבד.
מופיע בפרוטוקול	<u>הטיפול בכאב</u>