

| קבוצה           | מרחיב סמפונות סימפטומטי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מנגנון הפעולה   | משפיעל רצפטורים מסוג $\beta_2$ וגורם להרפיית שריר חלק בדופן הסימפונות. מקטין הפרשת ריר ובצקת באמצעות עיכוב הפרשת היסטמין. לונטולין השפעה מינימלית על רצפטורי $\beta_1$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| פרמקוקינטיקה    | תחילת ההשפעה תוך 5–15 דקות.<br>שיא ההשפעה לאחר 1–1.5 שעות.<br>משך ההשפעה 3–6 שעות.<br>זמן מחצית חיים 3 שעות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| התוויות לשימוש  | ברונכוספזם; היפרקלמיה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| התוויות נגד     | רגישות יתר ידועה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| תופעות לוואי    | טכיקרדיה; דפיקות לב; הרחבת כלי דם פריפריים; רעד שרירים; כאב ראש; צריבה בגרון; יובש בפה; פעימות מוקדמות; בחילות; הקאות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| מינון           | <p><b>מבוגרים –</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– אסתמה – 5 mg בהתקף קשה, 2.5 mg בהתקף קל או בינוני (אפשר לבצע אינהלציות חוזרות – עד 3 אינהלציות בהפרש של 20 דקות).</li> <li>– אנפילקסיס – 2.5–5 mg, אפשר לחזור על המנה שלוש פעמים בהפרש של 20 דקות.</li> <li>– בטובוס – 5 mg מהול ב־5 ml סליין.</li> <li>– החמרה ב־COPD – אינהלציה חד־פעמית במינון 2.5 mg.</li> </ul> <p><b>ילדים</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0.15 mg/kg.</li> <li>– מנה מקסימלית 5 mg.</li> </ul> |
| צורות מתן במד"א | Inhalation<br>E.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| מופיע בפרוטוקול | <u>התקף אסתמה במבוגר; התקף אסתמה בילדים; החמרה במחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD); תגובה אלרגית (אנפילקסיס) מבוגר; חשד לתסמונת מעיכה</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

