



קבוצה	תרופות לטיפול בבחילות והקאות
מנגנון הפעולה	זופרן הינה אנטגוניסט חזק לרצפטור הסרטונינרגי 5HT3 ואנטגוניסט חלש לרצפטור הדופמינרגי. רצפטורים מקבוצת ה־5HT3 מצויים בעיקר בקצות עצב הוואגוס (המעצבב את מערכת העיכול) ובאזור ה־postrema שבגזע המוח. ככל הנראה השפעתה האנטי־אמטית מושגת בעיקר באמצעות בלימת גירוי העצב הווגאלי על ידי סרטונין המופרש מתאי אפיתל של המעי בתגובה לגירויים שונים (לדוגמה גסטרו־אנטריטיס), וחלקית גם באמצעות חסימת הרצפטורים ב־chemoreceptor trigger zone במוח.
פרמקוקינטיקה	תחילת השפעה מיידית. שיא ההשפעה תוך כ־30 דקות. משך ההשפעה מספר שעות. זמן מחצית חיים: 7-2 שעות בהתאם לגיל ולקיומן של מחלות כבד.
התוויות לשימוש	בחילות והקאות הנגרמות כתוצאה ממחלות או ממצבים פיזיולוגיים שונים (לדוגמה היריון, גסטרו־אנטריטיס, לאחר טיפול כימותרפי וכדומה).
התוויות נגד	רגישות יתר ידועה; Prolonged QT Syndrome, נטילת apomorphine.
תופעות לוואי	כאב ראש, ברדיקרדיה, הארכת מקטע QT, הפרעות קצב חדריות (במטופלים עם מקטע QT מאורך).
מינון	מבוגרים – 4 mg במנה חד־פעמית במתן איטי. מעל גיל 65 למהול ב־100 ml סליין ומתן איטי. ילדים (מעל גיל חודש) – 0.15 mg/kg (מנה מקסימלית 4 mg) במתן איטי במנה חד־פעמית.
צורות מתן במד"א	מתן תוך־וריד I.V (עדיף) או תוך־שרירי I.M.
מופיע בפרוטוקול	<u>בחילות או הקאות:</u> כל הפרוטוקולים שבהם תיתכן הופעת בחילות והקאות כחלק מההסתמנות הקלינית (לדוגמה, <u>הטיפול בנפגע טביעה בים המלח;</u> לאחר טיפול באופיאטים וכדומה).