


**1 לידה במועד**

מעל 37 שבועות היריון. מתחת לגיל 22 שבועות היריון – אין לבצע פעולות החייאה ביילוד.

2 ייבוש וחימום היילוד

שימוש בכיסוי ייעודי וחימום פנים הרכב.

3 ניתוק "מאוחר" של חבל הטבור

לאחר דקה לפחות.

4 כתיחת נתיב אוויר

+ תנוחת "הסנפה".
+ שאיבת נוזלים (סקשן) – במקרה של עדות לחסימה או מי שפיר מקוויאלים (טרם ביצוע הנשמה).

5 גירוי מעורר

בכף הרגל או שפשוף הגב.

6 קצב הנשמה

+ 40-60 בדקה, בנוכחות דופק.
+ הימנע מניפוח יתר של הריאות במהלך ההנשמה.

7 מדידת סטורציה

ביד ימין בלבד.

8 עיסויים והנשמות

+ ביחס של 1:3.
+ בקצב של 120 בדקה.
+ טכניקת אגודלים.

9 אדרנלין (כל 3-5 דקות)

+ מינון ב-IV – 0.01-0.03 mg/kg.
+ מינון ב-E.T – 0.05 mg/kg.
+ ריכוז – 1:10000.

תוכן עניינים > כללי : פרק 2

אנמנזה

יש סבירות גבוהה שיילוד שנולד לפני סוף שבוע 37 להיריון (פג) יזדקק לפעולות החייה.

בדיקה גופנית ובדיקות עזר

- + יש לבצע ליילוד מבחן אפגר לפחות פעמיים (דקה לאחר הלידה ו-5 דקות לאחר הלידה). ציון של 7 ומעלה נחשב כ תקין. אם הציון בבדיקה השנייה נמוך מ-6, יש לבצע בדיקה שלישית.
- + יילוד חיוני מוגדר כיילוד עם מאמץ נשימתי תקין, עם טונוס שרירים תקין ועם דופק מעל 100 בדקה.
- + מומלץ לבצע את הערכת קצב הלב באמצעות חיבור היילוד למוניטור. הערכת קצב הלב באמצעות האזנה לקולות הלב או באמצעות מישוש דופק טבורי אינה מהימנה.
- + יילודים רגישים לשינויי טמפרטורה קיצוניים. יש לנטר את חום היילוד ולהימנע מהגעה למצב של היפותרמיה (חום מתחת 36° צלזיוס) או היפרתרמיה (חום מעל 38° צלזיוס). מומלץ לחמם את חלל הרכב ולהשתמש בכיסוי ייעודי עבור היילוד.
- + ייתכן שיעברו כ-5-10 דקות עד שערכי הסטורציה של היילוד יהיו תקינים. אין למהר ולהנשים את היילוד בלחץ חיובי (אלא אם קיימים סימנים למצוקה נשימתית).

טיפול

- + טיפול במסגרת "מעגל ההחייאה" (הנשמה, עיסויים, אדרנלין) מתאים ליילודים עד גיל חודש.
- + בזמן החייאה מלאה מומלץ להקפיד על ביצוע 90 עיסויים ו-30 הנשמות בדקה.
- + יש לשקול מתן עירוי נוזלים כאשר יש חשד קליני או סימנים לאובדן דם אצל היילוד (עור חיוור, דופק חלש). הטיפול המומלץ הוא עירוי סליין בנפח של 10 ml/kg.
- + יילודים רגישים מאוד להיפוגליקמיה, ולפיכך מייד לאחר סיום ההחייאה וייצוב היילוד יש לשקול מתן עירוי גלוקוז תוך-ורידי (בריכוז של 10%), תוך כדי ניטור רמת הגלוקוז ושמירה על ערכים מעל 50 mg%. בדיקת סוכר תיעשה באמצעות דקירת עקב היילוד לצורך נטילת דגימת דם.