

דום לב ונשימה VT/VF

1 שוק חשמלי 

◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-גרמי

האם יש התוויה למתן שוק חשמלי? 

לא

כן

◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ תן אדרנלין כל 3-5 דקות 2
◀ שקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר

האם יש התוויה למתן שוק חשמלי?

לא

כן

מצב של חזרת דופק ספונטני? ROSC

לא

כן

עבור לפרוטוקול מתאים 5

עבור לפרוטוקול הטיפול בחולה לאחר החייאה (ROSC)

◀ בצע החייאה במשך 2 דקות
◀ תן אמיודרון ב-IV 3
◀ טפל בגורמים הפיכים 4

יש עדיפות למתן תוך-ורידי או תוך-גרמי של התרופות.

1 השוק החשמלי

- + שוק ראשון – 2 J/kg
- + שוק שני – 4 J/kg
- + שוק שלישי ומעלה – 4-9 J/kg
- + אין לעלות מעל 10 J/kg או מעל 200 J

2 אדרנלין

- + מינון ב-IV 0.01 mg/kg
- + מינון מקסימלי למנה – 1 mg
- + יש לתת מייד בולוס של 10 ml סליין.
- + מינון ב-ET 0.1 mg/kg מהולים ב-3-5 ml סליין. יש לבצע 5 הנשמות רצופות.

3 אמיודרון

- + מינון – 5 mg/kg מהולים ב-5-10 ml
- + ניתן לחזור על המנה עוד פעמיים – עד למקסימום של 3 מנות.
- + מינון מקסימלי למנה – 300 mg

4 טיפול בגורמים הפיכים

- + היפוולמיה – מתן בולוסים חוזרים של סליין בנפח של 20 ml/kg
- + היפוגליקמיה – מתן גלוקוז במינון 0.2-0.5 gr/kg
- + מנה מקסימלית – 12.5 gr. ריכוז – עד 25% (ובתינוקות עד 10%).
- + היפותרמיה – חימום המטופל והסביבה.
- + היפוקסיה – מתן חמצן בריכוז מרבי.
- + היפרקלמיה או חמצת מטבולית – מתן סודיום ביקרבונט.
- + חזה אוויר בלחץ – ניקוז חזה באמצעות מחט (NA).

5 פרוטוקול מתאים

פינוי מטופל לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה
הימנעות מביצוע פעולות החייאה או הפסקתן

תוכן עניינים > כללי : פרק 2