




1 הימנעות מהחייאה במקרים

1. מוות ודאי –
 - + אבדן צלם אנוש.
 - + ניתוק הראש או האגן.
 - + צפידת מוות.
 - + ריקבון ממושך.
 - + כתמי מוות ממושכים.
2. "חולה הנוטה למות" – לפי הוראה במסמך רשמי תקף.
3. התנגדות אקטיבית של בני המשפחה – יש להיוועץ ברופא המוקד הרפואי ולשקול צורך בזימון משטרה.

2 הפסקת החייאה

- כשמתמלאים 2 התנאים גם יחד –
- + לאחר 20 דקות רצופות של החייאת ALS מלאה, שבהן הקצב נשאר ASYSTOLE או PEA.
- + ערך Etco2 נמוך מ-10 mmHg ללא עיסויים.
- + יילוד בגיל הריון קטן מ-22 שבועות.

הפסקת החייאה בתינוקות או בילדים

אין להפסיק פעולות החייאה בתינוקות או בילדים, למעט מקרים מיוחדים באישור רופא.

3 סימנים למוות מוחי

- + אישונים מורחבים ולא מגיבים לאור.
- + היעדר רפלקס קרנית.
- + היעדר רפלקס "עיני בובה".

4 זיהוי ודאי של הנפטר

- תעודה נושאת תמונה, כגון –
- + תעודת זהות או דרכון.
- + רישיון נהיגה.
- + תעודת חוגר או תעודת קצין.

תוכן עניינים > כללי : פרק 2

