




1 עירוי נוזלים

- + יש לתת למטופלים הסובלים מהקאות מרובות וסימני דהידרציה.
- + עירוי סליין בקצב 20 ml/kg/hr. מנה מקסימלית: 1 ליטר.

2 זופרן

התוויה לטיפול

- + מטופל סובל מבחילות או מהקאות עקב אחד או כמה מגורמים אלה –
- הפרעות שונות במערכת העיכול, גסטרופרזיס, ריפלוקס, השפעות של כימותרפיה, שימוש בחומרים אופיאטיים, היריון, מיגרנה, אוטם שריר הלב, עווית כלייתית.

התוויות־נגד

- + גיל מתחת לחודש ימים.
- + רגישות יתר ידועה לתרופה.
- + מקטע QT מאורך.

מינון

- + מבוגרים – 4 mg ב־I.M., או ב־I.V. ב־PUSH איטי.
- + ילדים – 0.15 mg/kg ב־I.M., או ב־I.V. ב־PUSH איטי.
- מקסימום 4 mg.
- + מנה חד־פעמית.

תופעות לוואי

- + כאבי ראש.
- + תופעות קרדיווסקולריות – ברדיקרדיה, הארכת מקטע QT (עלול לגרום להתפתחות הפרעות קצב חדריות).
- + תגובה אלרגית – עד אנפילקסיס (נדיר).

אבחנה מבודלת (בחילות והקאות)

- + פתולוגיות במערכת העצבים המרכזית – פגיעה ווסטיבולרית, מיגרנה, עליית לחץ תוך־גולגלתי.
- + פתולוגיות גסטרו־אינטסטינאליות – חסימת מעי, גסטרו־אנטריטיס, מחלות של כיס המרה, גירוי צפקי.
- + השפעה של תרופות ושל סמים – כימותרפיה, דיגוקסין, אלכוהול, חומרים אופיאטיים.
- + מצבים מטבוליים שונים – היריון, קטואצידוזיס, אורמיה.
- + מצבים קליניים אחרים – אוטם שריר הלב, עווית כלייתית.