




השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה.

1 חמצן

+ מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 94%.

2 היפוגליקמיה

+ כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.

+ יש לבדוק אם למטופל יש חיבור למשאבת אינסולין, ואם כן – יש לסגור את המשאבה.

3 גלוקוג'ל P.O

+ מתן גלוקוג'ל למטופל בהכרה ומשתף פעולה.

עד גיל 6 – חצי שכיפרת.

גיל 6 ומעלה – שכיפרת שלמה.

4 גלוקוז ב-I.V.

+ מינון – 0.2-0.5 gr/kg.

+ מנה מקסימלית – 12.5 gr.

+ ריכוז – עד 10%.

+ להזריק באיטיות בתוך 2-3 דקות.

+ אם אין שיפור במצב המטופל אפשר לחזור על המנה לאחר 5 דקות (מחצית מהמינון).

5 נרקן

+ מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן).

+ מתן מנות חוזרות עד להשגת אפקט רצוי או עד להגעה למינון מקסימלי.

+ מינון למתן ב-I.N – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי).

+ מינון למתן ב-I.V – עד משקל 20 ק"ג – 0.1 mg/kg עד מנה מקסימלית של 2 mg (מהול ב-5 ml סליין בהזרקה איטית).

+ מעל משקל 20 ק"ג – 2 mg (מהול ב-5 ml סליין בהזרקה איטית).

+ אם לא חל שיפור אפשר לתת מנה נוספת.

...

6 גורמים הפיכים אחרים

- + שוק או התייבשות – תן נוזלים ב־I.V.
- + חום גבוה – תן אקמול (P.R. או I.V.).
- + הרעלת זרחנים אורגניים – עבור לפרוטוקול המתאים.

אבחנה מבודלת

שוק (לסיבותיו), מחלת חום, היפוגליקמיה, הרעלות, הפרעות מטבוליות/ אלקטרוליטריות, חבלת ראש, מצב שלאחר הפרכוס (פוסט־איקטלי).

היפוגליקמיה

תסמינים סובייקטיביים

- + בתינוקות – ישנוניות, הפרעות אכילה, אי־שקט, טכיפניאה, ציאנוזיס, היפותרמיה.
- + תופעות נוירוגניות – רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- + תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

סימנים אובייקטיביים

- + חיוורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

סימנים

ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב־Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). במתבגרים ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

דגשים בבדיקה הגופנית

- + בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- + יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- + יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.
- + יש לחפש סימני הזרקה.

גורמים הפיכים אחרים

- + שוק או התייבשות – עירוי סליין בבולוסים של 20 ml/kg.
- + חום גבוה – אקמול ב־P.R. 125/250 mg. ב־I.V. 15 mg/kg, מנה מקסימלית 250 mg (מעל גיל שנה).