




1 טיפול ראשוני להפחתת כאב

- + קיבוע חיצוני.
- + קירור מקומי.

2 הערכת עוצמת כאב

- היעזר בסרגל מספרי או ציורי.
- אם המטופל מעורפל הכרה או שאינו משתף פעולה - בצע הערכת כאב סובייקטיבית ובהתאם למדדים.

3 כאב קל - עוצמה 1-3.

4 כאב בינוני - עוצמה 4-6.

5 כאב חזק - עוצמה 7-10.

6 אקמול P.O

- מינון 500-1000 mg.
- ילדים 15 mg/kg עד למקסימום של 250 mg.

7 אופטלגין

- מבוגרים 500-1000 mg.
- ילדים 20 mg/kg עד למקסימום של 500 mg.

8 טרמדקס פלשטבס

- מינון 50-100 mg.

9 אקמול I.V

- תינוקות (מעל גיל שנה), ילדים ונוער (עד 50 ק"ג) 15 mg/kg.
- מבוגרים (מעל 50 ק"ג) 1 gr.

...

שיקולים במתן תרופות

טרם מתן התרופה יש לשאול את המטופל על רגישות.

+ אקמול

- בטבליות (מתן פומי) – לכאב קל.
- בנוזל (מתן תוך־וריד) – לכאב בינוני.
- התוויות־נגד – אין לתת למטופלים הסובלים ממחלת כבד כרונית.

+ אופטלגין

- בנוזל – לכאב קל.
- התוויות־נגד –
- אין לתת למטופלים הסובלים מחסר ב־G6PD.
- אין לתת לנשים בהיריון או נשים מניקות.
- אין לתת למטופלים הסובלים (או סבלו בעבר) מדיכוי מח עצם (כגון מושתלי מח עצם).

+ טרמדקס פלשטבס

- אין לתת לילדים מתחת לגיל 14.
- פלשטבס – טבליות מסיסות בפה, למציצה בלבד.
- התרופה עלולה לגרום לסחרחורת, לבחילות והקאות, לטשטוש, לישנוניות או למצב רוח אופורי.
- התוויות־נגד –
- אין לתת לנשים בהיריון או נשים מניקות.
- אין לתת למטופלים הסובלים מדיכאון ונוטלים מעכבי MAO.

+ פנטניל

- במתן ב־I.V / I.M – אפשר לחזור על המנה פעם אחת נוספת לאחר 5–10 דקות (אם נדרש המשך טיפול).
- במתן ב־I.N – אפשר לחזור פעם אחת על מחצית המינון לאחר 10–15 דקות.
- יש להפחית מינון ל־ $\frac{1}{3}$ מהמנה במקרים אלה –
- מבוגרים מעל גיל 75.
- כאשר לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ־100 mmHg.
- במטופלים הסובלים מ־COPD.
- התרופה עלולה לגרום לישנוניות, לתחושת בחילה ולטשטוש.
- התרופה עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם, לכן יש לתת בבולוס איטי (תוך 1–2 דקות).
- התוויות־נגד – אין לתת למטופלים על סף אי־ספיקה נשימתית (אלא אם כן קיימת כוונה לבצע ניהול מתקדם של נתיב האוויר).

10 פנטניל ב־I.V / I.M

- מינון 1–2 mcg/kg.
- מקסימום למנה בודדת 100 mcg.
- ניתן לטפל גם בנפרד, ללא שילוב עם קטמין.

ב־I.N

- מינון 1.5 mcg/kg.
- מקסימום למנה בודדת 100 mcg.

11 קטמין ב־I.V

- מינון סינרגיסטי 0.2 mg/kg.
- מינון אנלגטי 0.3–0.5 mg/kg.

11 קטמין ב־I.M

- מינון אנלגטי 0.5–1 mg/kg.

12 זופרן

- מבוגרים 4 mg.
- ילדים 0.15 mg/kg.

13 דורמיקום

- מבוגרים 1–2.5 mg.

+ קטמין

- לתרופה יש פעילות מצטברת בעת מתן משולב עם חומרים אופיאטיים.
- במינונים המקובלים בטיפול סינרגיסטי ואנלגטי – שכיחות תופעות הלוואי נמוכה ביותר.
- במקרה הצורך אפשר לתת ב- $1\text{--}0.5\text{ mg/kg}$ במינון I.M.
- אפשר לחזור על המנה פעם אחת נוספת לאחר 10 דקות (אם נדרש טיפול המשכי).
- התרופה עלולה לגרום לעלייה בלחץ הדם ובדופק ולתופעות נירופסיכיאטריות חולפות.
- התוויות נגד – אין לתת למטופלים עם לחץ דם גבוה (מעל 180 mmHg סיסטולי).

+ זופרן

- מנה חד־פעמית.
- מעל גיל 65 למהול ב- 100 ml סליין ומתן איטי תוך ניטור לבבי.
- התוויות נגד – רגישות ידועה לתרופה, הארכת מיקטע QT.