

רעלת היריון וקדם־רעלת היריון (Pre-Eclampsia, Eclampsia)

רעלת היריון (pre-eclampsia או pre-eclampsia toxemia: PET) היא מצב רפואי המתרחש ב־5% עד 7% מההריונות ומאופיין בשלושה תסמינים: עליית לחץ דם, פרוטאינוריה (proteinuria, עלייה בכמות החלבון בשתן) ובצקת. משום ששכיחות הבצקות גבוהה גם בהריונות נורמליים, הימצאות של בצקת כשלעצמה אינה קריטריון לאבחון רעלת היריון. רעלת היריון היא מצב רפואי פתולוגי הכרוך בסיכון לתחלואה ואף לתמותה של האישה. תרופות להורדת לחץ דם משמשות רק לטיפול בתסמינים ולא במחלה עצמה, יילוד העובר הוא הדרך היחידה שבה אפשר לסיים את רעלת היריון.

מאפייני רעלת היריון

- מתחילה בדרך כלל לאחר השבוע ה-20 להיריון.
- הגורם לא ידוע, יתר לחץ דם (יל"ד) וסוכרת הם גורמים מסייעים למחלה.
- המחלה גורמת לאי־סדירות במחזור הדם של האישה.
- הבעיה משפיעה על זרימת הדם לכליות. הן אוגרות נתרן כפיצוי, וגורמת לכיווץ של כלי הדם הפריפריים.
- הנזק לעובר: כיווץ כלי הדם הפריפריים גורם לנזק באספקת הדם לתינוק.
- התוצאה: האטה בגדילת העובר או מותו.
- תלונות האישה: כאבי ראש, טשטוש ראייה וכאבי בטן.
- בבדיקה: בצקות ולחץ דם גבוה.
- כל לחץ דם מעל 130/80 מ"מ"כ או עלייה בדיאסטולי מעל 15 מ"מ"כ יותר מהרגיל צריך להחשיד לקיום המחלה.

רעלת, אקלמפסיה (Eclampsia)

אקלמפסיה (eclampsia) היא התפרצות מלאה של תופעות כגון פרכוסים אצל אישה עם רעלת היריון (pre-eclampsia).

- קדם רעלת יכולה להתפתח לרעלת לפני, תוך כדי ואחרי הלידה
- המחלה גורמת לתמותה של 5%-15% מהנשים
- זהו הגורם השני בחומרתו למות האם
- התלונות: כאבי ראש, טשטוש ראייה וכאבי בטן.
- הסימנים: בצקות (בעיקר בפנים ובידיים), לחץ דם גבוה, חיוורון ופחד. כמו כן רואים פרכוסים אפילפטיים.

הטיפול

הטיפול הוא בעיקר דיכוי הפרכוסים במהירות.

- שומרים על בטיחותה של המטופלת
- מאבטחים A, B ומספקים חמצן
- מתחילים פינוי לבית חולים קרוב ומדווחים על אבחנה משוערת
- חוברים לנט"ן בהתייעצות עם מוקד מרחבי