

הזרקות



תמונה 25.30 הזרקה תת־עורית (Sub Cutaneous: SC)

הזרקה תת־עורית (Sub Cutaneous: SC)

יתרונות - ביצוע מהיר, מתאים לשימוש במצבי אנפילקסיס ואסתמה

חסרונות - ספיגה איטית יחסית

ביצוע

- מכינים מזרק ותרופה, ספוגיות חיטוי וכלי למחטים מזוהמות
- מוודאים שהמטופל אינו אלרגי לתרופה
- שואבים חומר למזרק
- בוחרים מקום ההזרקה
- מחטאים
- מרימים שכבת השומן בשתי אצבעות
- החדרה מהירה - מחט 25g בזווית של 45°
- מושכים בוכנה לאחור לוודא המקום
- מזריקים בהזרקה איטית
- יוצאים במהירות



תמונה 25.31 הזרקה תוך־שרירית (Intra Muscular: IM)

הזרקה תוך־שרירית (Intra Muscular: IM)

יתרונות - אפשר להזריק כמות גדולה יחסית של חומר, אפשר להזריק חומר שומני, טיפול יעיל לשיכוך כאבים, מתאים בפינוי ארוך, ספיגה מהירה יותר מ־SC.

חסרונות - יש להימנע משימוש במצבי הלם וכאבים בבית החזה.

ביצוע

- מכינים מזרק ותרופה, ספוגיות חיטוי וכלי למחטים מזוהמות
- לפני הזרקה שואבים כדי לוודא שלא נפגעו כלי דם
- מוודאים שהמטופל אינו אלרגי לתרופה
- שואבים חומר למזרק

- בחרים מקום הזרקה
- מחטאים
- מותחים את העור
- החדרה מהירה - 2/3 ממחט 23g בזווית של 90°
- מושכים לאחר וידוא המקום
- מזריקים הזרקה איטית
- מותחים את העור
- יוצאים במהירות
- מחטאים ומעסים המקום

החדרת עירוי תוך־וריד



תמונה 25.32 עירוי תוך־וריד

עקרונות כלליים

- המקום הפריפרי המועדף הוא באמה או בזרוע

סיבוכים מקומיים אפשריים

- המטומה
- קריש דם
- דלקת בווריד - פלביטיס וחסימת הווריד
- "פארה" (=ליד, para-), סטייה מהווריד
- צלוליטיס
- כאבים

סיבוכים כלליים אפשריים

- זיהום
- שליחת קריש דם לכיוון הריאות
- תסחיף של צינורית פוליאטילן
- תסחיף אוויר