

- בחרים מקום הזרקה
- מחטאים
- מותחים את העור
- החדרה מהירה - 2/3 ממחט 23g בזווית של 90°
- מושכים לאחר וידוא המקום
- מזריקים הזרקה איטית
- מותחים את העור
- יוצאים במהירות
- מחטאים ומעסים המקום

החדרת עירוי תוך־וריד



תמונה 25.32 עירוי תוך־וריד

עקרונות כלליים

- המקום הפריפרי המועדף הוא באמה או בזרוע

סיבוכים מקומיים אפשריים

- המטומה
- קריש דם
- דלקת בווריד - פלביטיס וחסימת הווריד
- "פארה" (=ליד, para-), סטייה מהווריד
- צלוליטיס
- כאבים

סיבוכים כלליים אפשריים

- זיהום
- שליחת קריש דם לכיוון הריאות
- תסחיף של צינורית פוליאטילן
- תסחיף אוויר

בחירת וריד פריפרי

היתרונות

- גישה נוחה ויעילה לווריד בזמן ההחייאה
- אינו מצריך הפסקת החייאה כדי לבצע
- נדרשת פחות מיומנות מווריד מרכזי
- פחות סיבוכים יחסית לווריד מרכזי
- שוטפים כל תרופה ב-20 סמ"ק ולאחר מכן מרימים את האיבר

החסרונות

- נמצא בתמט במצב הלם
- דלקות בווריד נפוצות יחסית
- לשימוש בייחוד לתמיסות איזוטוניות, תמיסות היפרטוניות גורמות לכאב ולדלקות
- נדרשות לתרופה 1-2 דקות להגיע למחזור המרכזי

עירוי תוך-גרמי

רקע אנטומי



תמונה 25.33 עירוי תוך-גרמי

העצם בגופו של האדם אינה מבנה קשיח בלבד. תוכנה הפנימי הוא רקמה ספוגית עשירה בתאים שמייצרים את תאי הדם השונים; רקמה זו נקראת מח העצם. כל עצם בגוף מקבלת את אספקת הדם שלה מדם שנכנס אל תוך מח העצם ומספק דם לתאי העצם מבפנים החוצה. בעצמות הארוכות הגדולות שבגוף, עצם הירך (femur), השוק והזרוע, יש כלי דם גדולים במיוחד.

היתרונות והחסרונות של עירוי תוך-גרמי

יתרונות החדרת עירוי תוך-גרמי

- מאפשר הזרקת תרופות כשאין אפשרות לגישה תוך-ורידית
- מאפשר הזלפת נוזלים כשאין אפשרות לגישה תוך-ורידית

חסרונות החדרת עירוי תוך-גרמי

- הפעולה דורשת מיומנות נוספת
- הפעולה מכאיבה
- סכנת זיהום מקומי מוגברת
- אין להחזיר עירוי לגפה שנפגעה או נשברה שכן זרימת הדם שבגפה זו עלולה להיפגע.