

סיכום תרופות - רפואת חירום

אדנוזין (Adenosine) - התוויות נגד

- רגישות יתר ידועה
- תסמונת סינוס חולה (Sick sinus syndrome)
- חוסם הולכה מדרגה שנייה או שלישית
- אסתמה קשה

אדרנלין/אפינפריין (Adrenaline/Epinephrine)

ייעוד:

- תגובה אלרגית/אנפילקסיס
- סטרידור
- ברדיקרדיה
- התקף אסתמה
- דום לב

צורת השפעה ומנגנון פעולה:

- אדרנלין הוא הורמון ונוירוטרנסמיטור המיוצר בבלוטת האדרנל. הוא פועל על קולטנים אדרנרגיים מסוג α ו- β .
- השפעה על β_1 : חיזוק כיווץ שריר הלב, העלאת לחץ דם ודופק
 - השפעה על β_2 : הרפיית השריר החלק בסימפונות
 - השפעה על α : כיווץ עורקיקים והרחבת כלי דם בשרירים

אטרופין (Atropine)

ייעוד:

- הרעלות זרחן אורגני
- ברדיקרדיה

צורת השפעה ומנגנון פעולה:

- אנטגוניסט תחרותי החוסם התגובות המוסקריניות.
- חוסם דחפים ווגאליים ומגדיל קצב SA node
 - משפר הולכה ב-AV node ומגדיל תפוקת לב
 - יעיל בטיפול בהרעלת גז עצבים

אטומידאט (Etomidate)

למה מיועד:

השריית סדציה למטופל הזקוק לפרוצדורה (כגון אינטובציה או היפוך חשמלי)

כללים במתן התרופה:

- אין השפעה על מדדים קרדיווסקולריים ונשימתיים
- גורם לירידה קלה בלחץ תוך-גולגולתי (ICP)
- אידיאלי לנפגעים לא יציבים המודינמית

חשוב: אטומידאט אינו משכך כאב

- להימנע מהזרקה מהירה - עלול לגרום לטריזמוס

מינון: 0.2-0.3 מ"ג/ק"ג מנה חד-פעמית

קטמין (Ketamine)

למה מיועד:

- הרדמה
- טיפול בכאב
- הרחבת דרכי נשימה

כללים במתן התרופה:

- משמש להרדמה כללית קצרה
- **בניגוד לאטומידאט - קטמין גם משכך כאב**
- גורם להזיות וחוויות חוץ-גופיות
- מעלה לחץ דם וקצב לב

מינונים:

- סדציה IV: 2-3 מ"ג/ק"ג
- סדציה IM: 5-6 מ"ג/ק"ג
- שיכון כאב עם אופיאט IV: 0.2 מ"ג/ק"ג
- שיכון כאב בודד IV: 0.3-0.5 מ"ג/ק"ג
- שיכון כאב IM: 0.5-1 מ"ג/ק"ג

השוואה: תוך-לשדי (IO) לעומת תוך-ורידי (IV)

IO = Intraosseous (תוך-לשדי)

IV = Intravenous (תוך-ורידי)

זמן ספיגה:

- ספיגה מהירה למחזור הדם - IV-זהה ל IO
- שתי הדרכים מתאימות למצבי חירום

מינון:

המינונים זהים ל-IO ול-IV

- משמש כאשר אין גישה ורידית IO
- מועדף בהחייאה, דום לב, הלם IO

יתרונות IO:

- קל להשגה במצבי חירום
- אמין במטופלים עם קריסה וסקולרית
- מהירות הזרמה דומה ל-IV

אספירין (Acetylsalicylic acid)

התוויות:

- כאבים בחזה ממקור לבבי
- שיכוך כאב
- הורדת חום

התוויות נגד:

- אלרגיה, כיב פפטי, דמם מדרכי העיכול
- זהירות באסתמה רגישה לאספירין או NSAIDs

אסור בילדים - סיכון לתסמונת ריי (Reye)

מנגנון פעולה:

- מעכב COX לצמיתות
- מונע ייצור פרוסטגלנדינים ותרומבוקסנים
- מונע אגרגציה של טסיות ויצירת קריש

מינון: 160-325 מ"ג בלעיסה

נרקן (Naloxone)

ייעוד:

מינון יתר של אופיאטים

מנגנון פעולה:

- אנטגוניסט תחרותי לרצפטורים אופיאטים
- מתחרה עם האופיאט ומונע פעולתו
- מסונתז מ-Thebaine (דומה למורפין)

דרכי מתן:

- תוך-וריד (IV)
- תוך-אפי (IN)

מינונים:

מבוגרים:

- מ"ג מהול ב-10 סמ"ק סליין 0.4-2 IV:
- מ"ג 2 IN:

ילדים:

- מתחת ל-20 ק"ג: 0.1 מ"ג/ק"ג (מקסימום 2 מ"ג)
- מעל 20 ק"ג: 2 מ"ג למנה
- נותנים בהזלפה איטית
- מנה שנייה לאחר 5 דקות אם אין תגובה

כללים חשובים:

משך השפעת נרקן (20 דקות) קצר מהאופיאטים!

- לנטר את המטופל לאורך זמן
- מנה נוספת ניתנת לאחר 5-10 דקות