קוגניציה תפקודית – מאמר חלק 1

איך מעריכים קוגניציה תפקודית?

אם קוגניציה תפקודית מתרחשת בתוך ביצוע , הרי שהערכה של תפקודים קוגניטיביים מבודדים אינה מספיקה כדי להבין אותה.

Fogel, Y., Josman, N., Cohen Elimelech, O., & Zlotnik, S. (2025). Can functional cognitive assessments for children/adolescents be transformed into digital platforms? A conceptual review. *Children, 12*(10), 1384. https://doi.org/10.3390/children12101384


המאמר התיאורטי שכתבתי ביחד עם פרופ' נעמי יוסמן, ד"ר שרון זלוטניק וד"ר אורטל כהן אלימלך, מבחין בין הערכות קוגניטיביות מסורתיות שבדרך כלל בודקות יכולות מוגדרות בתנאים מובנים ומבוקרים לבין הערכות מבוססות ביצוע שבהן אנו מתבוננים באדם בזמן שהוא מבצע פעולה ממשית או מדומה.

אחד השיקולים המרכזיים בבחירת הערכה של קוגניציה תפקודית הוא **עד כמה מה שאנחנו רואות שהאבחון מספר לנו משהו על החיים האמיתיים.**

בהערכה מבוססת ביצוע אנחנו יכולות לראות:
איך האדם ניגש לפעילות, באילו אסטרטגיות הוא משתמש, אילו טעויות מתרחשות, כיצד הוא מתארגן, איזו תמיכה הוא צריך, ומהי השפעת דרישות המטלה והסביבה על הביצוע .

במקום להעריך בנפרד קשב, זיכרון או תפקודים ניהוליים, אנחנו מתבוננות באדם תוך כדי ביצוע פעילות . כך אפשר לקבל מידע לא רק על התוצאה הסופית, אלא גם על דפוסי הביצוע, שימוש באסטרטגיות, הרגלים ושגרות, השפעת הסביבה והתמיכות שהאדם נעזר בהן .

המאמר מתייחס ל- Ecological Validity תוקף אקולוגי, ומבחין בין שני מרכיבים מרכזיים:



המאמר ממפה מגוון כלי הערכה לאורך רצף של תוקף אקולוגי. בקצה הגבוה נמצאות מטלות המדמות תפקוד יומיומי, כגון WCPA, Do-Eat, Children's Cooking Task, Birthday Task ו־ PETA. לעומתן, מטלות מעבדתיות ומופשטות יותר, כגון Tower of London ו־ WCST, ממוקמות נמוך יותר מבחינת הדמיון לתפקוד היומיומי.

במאמר יש טבלה שמפרטת עבור כל אחד מהאבחונים את המטרה שלו, תיאור הכלי, למי מיועד, איך מקודד, מדדים פסיכומטריים והאם יש לכלי פלטפורמה דיגיטלית.




Figure 2. Conceptual map of functional cognitive assessments.

ככל שאנחנו רוצות להבין תפקוד - לא מספיק למדוד יכולת. צריך לראות אותה בפעולה.

אז מה אני לוקחת לקליניקה?

1. *לא להסתפק בציון הסופי של כלי הערכה* – לשים לב לאופן הביצוע, לתכנון, מתי נתקע, איזה טעויות עושה, האם זיהה את הטעויות ואילו אסטרטגיות הפעיל.
2. *לשאול האם המטלה באמת דומה לחיים שלו*. ילד יכול להצליח במטלה מובנית בחדר הטיפולים ועדיין להתקשות בהתארגנות בוקר, בהכנת תיק או בביצוע רצף פעולות בבית.
3. *כשיש פער בין האבחון לדיווח בבית* – זה הגיוני – הסביבה, דרישות המטלה, רמות התמיכה שונות ולכן גם הביצוע שונה.
4. *להוסיף לתהליך הערכה לפחות עוד מקור אחד מהחיים עצמם*. שיחה עם הורים, גננת, מורה, מעסיק, מטפל עיקרי, סרטון, תצפית או לתת משימה המדמה פעילות יום יומית או הערכה מבוססת ביצוע.
5. *לשנות את דרישות הפעילות בתוך חדר הטיפולים* – להפחית רמזים, להגביל זמן, להוסיף שלב, לשנות סדר, להכניס מסיח. השינוי עשוי לחשוף קושי תפקודי שיפגוש את הילד/האדם בחיי היום יום.