

הוראות לצום יום הכיפורים לחולי קורונה

חולי הקורונה שלצערנו רבים חלו בו בחודשים האחרונים, הוא חולי שגם חכמי הרפואה עדיין אינם יודעים אודותיו ידיעות ברורות, אמנם בהתייעצות עם רופאים מומחים נתברר שבמצבים מסויימים יש מקום לחשוש שהצום עלול להיות כרוך בהחמרה בחולי העלולה להביא לידי חשש סכנה [מחמת קרישות יתר של הדם ועוד תופעות בריאותיות אחרות].

ויש להבחין בכל זה בין חולים עם תסמינים פעילים, לבין חולים מאומתים אשר אין להם תסמינים כלל. כמו כן מי שעבר כבר את החולי ונרפא ת"ל, פעמים שעדיין חש תסמינים שעלולים להחמיר בעקבות הצום ואף להגיע לכלל חשש סכנה. ולכן יש לכל חולי הקורונה ואף למי שכבר נרפא להרבות בשתייה לפני הצום.

ככלל גם מי שמוגדר כחולה שהצום עלול להזיק לו, לדעת הרופאים אין לו צורך באכילה ומספיקה לו שתייה לשיעורין, כמולא לוגמיו [והוא באדם בינוני 37 סמ"ק] כל תשע דקות, ויכול לשתות שתייה מתוקה שיש בה גם תועלת להזין את הגוף.

א. מאומת קורונה ללא סימפטומים כלל ומרגיש כבריא אולם, אם הוא בתוך שלושת הימים הראשונים של החולי [ימים אלו נמנים מאז שהרגיש צורך להיבדק] עליו להתייעץ עם רופא שמכיר את מצבו הכללי. ואם הוא לאחר שלושת הימים הנ"ל יצום, אמנם אם במשך הצום מרגיש חולשה [יותר מהרגילות בצום] ישתה לשיעורין [בכמות של חצי ליטר במשך הצום]. אדם מבוגר מאוד או אדם עם משקל גבוה יש לו לחוש יותר, ובכל הרגשה של קצת חולי ישתה לשיעורין.

ב. מאומת קורונה עם סימפטומים הכוללים שיעול, קוצר נשימה חולשה או חום, ישתה שתייה לשיעורין [בכמות של חצי ליטר במשך הצום]. הנחיה זו כוללת גם אנשים שקיבלו את כל שלשת החיסונים.

ג. מי שיש לו סימפטומים אך לא נבדק דינו כחולה קורונה וישתה לשיעורין.

ד. מי שהחלו לו סימפטומים במהלך יום הכיפורים, ספק נפשות להחמיר, ודינו כחולה קורונה וישתה לשיעורין.

ה. חולה קורונה עם קוצר נשימה מורגש [ירידה בסטורציה אל מתחת ל – 93%], חייב לשתות לפחות 1 ליטר של נוזלים, וישתה אותם לשיעורין.

ו. מאומת קורונה שהיו לו סימפטומים וחלפו תוך פחות מ-72 שעות, וכעת חש בטוב לחלוטין, יכול לצום. אמנם אם במשך הצום מרגיש חולשה [יותר מהרגילות בכל צום] ישתה לשיעורין.

ז. מאומת קורונה שהסימפטומים נמשכו אצלו יותר מאשר 72 שעות, מוגדר כחולה למשך שבוע לאחר שהחלים לחלוטין, ולכן ישתה חצי ליטר לשיעורין.

ח. מחלים שחלה שנית – יש צד שהחולי אצלו קל יותר ועליו להתייעץ עם רופא המכיר את מצבו הכללי.

ט. מי שעבר את חולי הקורונה באופן משמעותי ביותר [נצרך לחמצן, אשפוז, סימפטומים שנמשכו יותר משבוע], אם עברו חודשיים שלשה מאז תום הסימפטומים, וכעת הוא חש בטוב וחזר לאיתנו המלא, יצום. אך אם לא עברו עדיין חודשיים שלשה, או שעדיין חש בחולשה [לא חזר לאיתנו המלא] או סימפטומים אחרים [למעט איבוד הריח] ישתה חצי ליטר לשיעורין.

י. מעוברת – מאומתת קורונה בלי שום סימפטומים כלל אינה נחשבת לחולה, אמנם אם יש לה סימפטומים אפילו קלים [אפילו איבוד חוש טעם וריח] תשתה לשיעורין.

יא. השמנה יתרה היא גורם סיכון מאוד משמעותי בחולי הקורונה [BMI – 30], והיא מהווה עוד צד בפסיקת השאלה לגבי הצום.

הוראות אלו אינן משמשות תחליף להוראות הניתנות לחולה על ידי רופא שמכיר את החולה ואת מצבו הכללי.

אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך

ישראל רוזנברג
יצחק מרדכי הכהן רובין
יהודה סילמן
מנחם מנדל לובין